

## LES ANGLES

### I. SOMME DES ANGLES D'UN TRIANGLE :

**Propriété :** La somme des trois mesures des angles d'un triangle vaut  $180^\circ$ .

#### DEMONSTRATION

Traçons une droite (MN) parallèle à [BC] passant par le point A.

Considérons le point I milieu du segment [AB].

La symétrie centrale conserve les angles,

→ donc l'angle  $\widehat{BAM}$  est égal à l'angle  $\widehat{ABC}$ .

De même en considérant le point J milieu du segment [AC] :


→ l'angle  $\widehat{CAN}$  est égal à l'angle  $\widehat{ACB}$ .

Les points M, A, N sont alignés donc  $\widehat{MAN} = 180^\circ$ .

Ainsi :  $\widehat{MAB} + \widehat{BAC} + \widehat{CAN} = 180^\circ$ .

Or :  $\widehat{MAB} = \widehat{ABC}$  et  $\widehat{CAN} = \widehat{ACB}$ .

Donc :  $\widehat{ABC} + \widehat{BAC} + \widehat{ACB} = 180^\circ$  : la somme des angles du triangle ABC vaut  $180^\circ$ .



### II. TRIANGLES PARTICULIERS

#### 1/ TRIANGLE RECTANGLE

**Propriété :** Si un triangle est rectangle, alors les deux angles adjacents à son hypoténuse sont complémentaires (leur somme vaut  $90^\circ$ ).

**Propriété :** Si la somme de deux angles d'un triangle vaut  $90^\circ$ , alors ce triangle est rectangle.

#### 2/ TRIANGLE ISOCÈLE


**Définition :** Un triangle est dit isocèle lorsqu'il possède deux côtés de même longueur. Le côté opposé à son sommet principal est appelé sa base.

**Propriété :** Si un triangle est isocèle, alors les deux angles adjacents à sa base ont même mesure.

**Propriété :** Si deux angles d'un triangle sont de même mesure, ce triangle est isocèle.

→ si on connaît la mesure d'un angle d'un triangle isocèle, on peut calculer tous ses angles.

**Propriété :** Si un triangle est isocèle, alors les trois droites remarquables issues de son sommet principal et la médiatrice de la base sont confondues (elles forment l'axe de symétrie de ce triangle).




#### 3/ TRIANGLE ÉQUILATÉRAL

**Définition :** Un triangle est dit équilatéral lorsqu'il possède trois côtés de même longueur.

**Propriété :** Si un triangle est équilatéral, alors ses trois angles ont une mesure de  $60^\circ$ .

**Propriété :** Si les trois angles d'un triangle mesurent  $60^\circ$ , alors ce triangle est équilatéral.




**Propriété :** Si un triangle est équilatéral, alors **les trois droites remarquables issues de chaque sommet et la médiatrice du côté opposé sont confondues** (elles forment les trois axes de symétrie de ce triangle).

### III. VOCABULAIRE DES ANGLES

#### 1) Angles adjacents.

**Définition :** Deux angles sont **adjacents** lorsque :


- ils ont le même sommet ;
- ils ont un côté commun ;
- ils sont de part et d'autre de ce côté.



**Propriété :** Si deux angles  $\widehat{xOy}$  et  $\widehat{yOz}$  sont adjacents, alors  $\widehat{xOz} = \widehat{xOy} + \widehat{yOz}$ .

**Exemple :** On donne  $\widehat{BAC} = 26^\circ$  et  $\widehat{CAD} = 17^\circ$ . Calculer  $\widehat{BAD}$ .

Les angles  $\widehat{BAC}$  et  $\widehat{CAD}$  sont adjacents, donc :  $\widehat{BAD} = \widehat{BAC} + \widehat{CAD}$   
soit :  $\widehat{BAD} = 26 + 17 = 43^\circ$



#### 2) Angles complémentaires, angles supplémentaires

Deux angles sont **complémentaires** lorsque la somme de leurs mesures est égale à  $90^\circ$ .


Deux angles sont **supplémentaires** lorsque la somme de leurs mesures est égale à  $180^\circ$ .

#### 3) Angles alternes-internes, angles correspondants

Deux droites coupées par une sécante forment avec cette sécante deux paires d'angles **alternes-internes** et quatre paires d'angles **correspondants**.


Deux angles sont **alternes-internes** lorsqu'ils sont situés :

- de part et d'autre de la droite  $\Delta$  ;
- entre les droites  $d$  et  $d'$ .



Deux angles sont **correspondants** lorsqu'ils sont situés :


- d'un même côté de la droite  $\Delta$  ;
- l'un entre les droites  $d$  et  $d'$ , l'autre pas.



#### 4) Angles opposés par le sommet.

Deux angles **opposés par le sommet** sont deux angles :


- qui ont le même sommet ;
- dont les côtés sont dans le prolongement l'un de l'autre.



#### IV. PROPRIÉTÉS

##### 1) Angles opposés par le sommet.


**Propriété :** Les angles opposés par le sommet sont égaux.



##### 2) Angles alternés-internes.

###### Propriété

Si deux droites parallèles sont coupées par une sécante alors les angles alternés-internes d'une même paire sont égaux.




###### Propriété

Si deux droites coupées par une sécante font apparaître des angles alternés-internes égaux, alors ces deux droites sont parallèles.

##### 3) Angles correspondants.

###### Propriété

Si deux droites parallèles sont coupées par une sécante alors les angles correspondants d'une même paire sont égaux.



###### Propriété

Si deux droites coupées par une sécante font apparaître des angles correspondants égaux, alors ces droites sont parallèles.

*Cas particulier :* Angles droits

###### Propriété

Si deux droites sont parallèles, alors toute droite perpendiculaire à l'une est aussi perpendiculaire à l'autre.

###### Propriété

Si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième, alors elles sont parallèles.

