

## الدرس : التماثل المحوري

المكتسبات القبلية	القدرات المستهدفة	الامتدادات
- التوازي و التعامد و واسط قطعة. - المسافة بين نقطتين - الدائرة - الزوايا	- إنشاء مماثلة نقطة وقطعة ومستقيم ونصف مستقيم وزاوية ودائرة بالنسبة لمستقيم . - استعمال التماثل المحوري في إنجاز براهين .	- اتقان البرهان. - تحديد محاور تماثل بعض العديد من الأشكال الهندسية. - استعمال خاصيات التماثل المحوري لحل مسائل هندسية. - استعمال التماثل المحوري في الفضاء

### مضامين الدرس وهيكله

1- مماثلة نقطة

2- مماثلة قطعة




3- مماثل مستقيم – مماثل نصف مستقيم

4- مماثلة زاوية





5- مماثلة دائرة

الوسائل اليداكتيكية : الكتاب المدرسي – السبورة – الطباشير -

المسطرة – البركار – الكوس - المنقلة

الملاحظات	المحتوى	المراحل
المدة: 10 دقائق	<p><b>نشاط</b></p>  <p>أرسم مستقيما (L) يمر من E وعمودي على المستقيم (D) في النقطة C</p>	<p><b>أنشطة</b> <b>تشخيصية</b></p>
المدة: 20 دقائق	<p><b>نشاط</b></p>  <p>أراد سكان القريتين (قرية أولاد موسى و قرية أولاد أحمد) بناء صهريج على ضفة النهر لتزويد القريتين بالماء وربطه بهما بأقل تكلفة وذلك عبر أنابيب . حدد موقع الصهريج على ضفة النهر ؟</p>	<p><b>أنشطة</b> <b>بنائية</b></p>
المدة: 10 دقائق	<p><b>1- مماثلة نقطة</b> <b>تعريف</b></p> <p>النقطتان M و M' متماثلتان بالنسبة لمستقيم (D) يعني أن المستقيم (D) هو واسط القطعة [ M'M ]</p> <p><b>مثال</b></p>  <p>M' هي مماثلة M بالنسبة لمستقيم (D)</p>	<p><b>ملخص</b> <b>الدروس</b></p>
المدة: 15 دقائق	<p><b>تمرين تطبيقي</b></p> <p>ABC مثلث قائم الزاوية في النقطة A بحيث : <math>AB = 6\text{cm}</math> و <math>AC = 8\text{cm}</math> E هي مماثلة النقطة B بالنسبة للنقطة A بين أن E هي مماثلة النقطة B بالنسبة للمستقيم (AC)</p>	<p><b>أنشطة</b> <b>تقويمية</b></p>

الملاحظات	المحتوى	المراحل
المدة: 10 دقائق	<p><b>نشاط</b> أكمل ما يلي : النقطة M هي مماثلة النقطة N بالنسبة للمستقيم (D) يعني أن .....</p>	<p><b>أنشطة تشخيصية</b></p>
المدة: 20 دقائق	<p><b>نشاط</b></p> <p>1- أنشئ H مماثلة A بالنسبة ل(Δ) 2- أنشئ G مماثلة A بالنسبة ل(Δ) 3- قارن AB و HG</p>	<p><b>أنشطة بنائية</b></p>
المدة: 10 دقائق	<p><b>2- مماثلة قطعة خاصية</b></p> <p>مماثلة قطعة بالنسبة لمستقيم هي قطعة تقايسها</p>	<p><b>ملخص الدروس</b></p>
	<p><b>مثال</b></p> <p>مماثلة القطعة [AB] هي [A'B'] بالنسبة للمستقيم (D) حيث B' و A' مماثلتي A و B بالنسبة للمستقيم (D) على التوالي</p>	
	<p><b>خاصية</b></p> <p>التماثل المحوري يحافظ على المسافة بين نقطتين</p>	
	<p><b>مثال</b></p> <p>في المثال السابق لدينا <math>AB = A'B'</math></p>	
المدة: 15 دقائق	<p><b>تمرين تطبيقي</b></p> <p>ABC مثلث قائم الزاوية في A بحيث <math>AB=5cm</math> 1- أنشئ M مماثلة A بالنسبة للمستقيم (BC) 2- احسب BM</p>	<p><b>أنشطة تقويمية</b></p>


الملاحظات	المحتوى	المراحل
المدة: 10 دقائق	<p><b>نشاط</b> [AB] قطعة بحيث : <math>AB=3cm</math></p>  <p>1- أنشئ M و N مماثلتي A و B بالنسبة ل(Δ) على التوالي 2- احسب MN</p>	<p><b>أنشطة</b> <b>تشخيصية</b></p>
المدة: 20 دقائق	<p><b>نشاط</b> -1</p>  <p>أ- أنشئ P و R مماثلتي A و B بالنسبة ل(Δ) على التوالي ب- أنشئ M و N مماثلتي C و D بالنسبة ل(Δ) على التوالي ج- ما هو مماثل المستقيم (AB) بالنسبة ل(Δ) د- ما هو مماثل المستقيم (CD) بالنسبة ل(Δ)</p> <p>-2</p>  <p>أ- أنشئ P و R مماثلتي A و B بالنسبة ل(Δ) على التوالي ب- أنشئ M و N مماثلتي C و D بالنسبة ل(Δ) على التوالي ج- ما هو مماثل نصف المستقيم [AB] بالنسبة ل(Δ) د- ما هو مماثل نصف المستقيم [CD] بالنسبة ل(Δ)</p> <p>-3</p>  <p>أ- أنشئ C' و B' و A' مماثلات C و B و A بالنسبة ل(Δ) على التوالي ب- ماذا تلاحظ</p>	<p><b>أنشطة</b> <b>بنائية</b></p>

ملخص  
الدروس

3-مماثل مستقيم-مماثل نصف مستقيم  
خاصية 1

مماثل المستقيم (AB) بالنسبة لمستقيم  $(\Delta)$  هو المستقيم  $(A'B')$  حيث  $A'$  و  $B'$  مماثلتي A و B بالنسبة ل  $(\Delta)$  على التوالي


مثال



خاصية 2

مماثل نصف مستقيم  $[AB]$  بالنسبة لمستقيم  $(\Delta)$  هو نصف المستقيم  $[A'B']$  حيث  $A'$  و  $B'$  مماثلتي A و B بالنسبة ل  $(\Delta)$  على التوالي


مثال



خاصية 3

التماثل المحوري يحافظ على استقامية النقط

مثال



النقط  $A'$  و  $B'$  و  $C'$  هي مماثلات النقط A و B و C بالنسبة ل  $(\Delta)$  على التوالي

أنشطة  
تقويمية

تمرين تطبيقي




$(\Delta)$  مستقيم و N و M نقطتان لا تنتميان إلى هذا المستقيم  
 $N'$  و  $M'$  هما مماثلتا N و M بالنسبة للمستقيم  $(\Delta)$  على التوالي




1- أنشئ الشكل

(2) - برهن أن :  $(MM') // (NN')$

المدة: 10 دقائق

المدة: 15 دقائق

الملاحظات	المحتوى	المراحل
المدة: 10 دقائق	<p><b>نشاط</b></p>  <p>أحسب <math>\hat{A}OB</math></p>	<p><b>أنشطة</b> <b>تشخيصية</b></p>
المدة: 20 دقائق	<p><b>نشاط</b></p>  <p>1 - أنشئ P و R مماثلتي A و B بالنسبة لـ <math>(\Delta)</math> على التوالي 2 - أنشئ M و N مماثلتي C و D بالنسبة لـ <math>(\Delta)</math> على التوالي 3 - قارن <math>\hat{A}BC</math> و <math>\hat{P}RM</math> 4 - قارن <math>\hat{B}CD</math> و <math>\hat{R}MN</math></p>	<p><b>أنشطة</b> <b>بنائية</b></p>
المدة: 10 دقائق	<p><b>4- مماتلة زاوية</b> <b>خاصية</b></p> <p>مماتلة زاوية بتماتل محوري هي زاوية تقايسها .</p>	<p><b>ملخص الدروس</b></p>
	<p><b>مثال</b></p>  <p>O' و B' و A' مماتلات O و B و A بالنسبة لمستقيم (D) على التوالي</p>	
المدة: 15 دقائق	<p><b>تمرين تطبيقي</b></p> <p>EFG مثلث متساوي الساقين في النقطة E بحيث: <math>\hat{E} = 50^\circ</math> 1 - أنشئ E' مماتلة E على التوالي بالنسبة للمستقيم (FG) 2 - احسب <math>\hat{F}E'G</math></p>	<p><b>أنشطة</b> <b>تقويمية</b></p>

الملاحظات	المحتوى	المراحل
المدة: 10 دقائق	<p><u>نشاط</u></p> <p>[AB] قطعة و المستقيم <math>(\Delta)</math> يقطع [AB] في النقطة M 1- أنشئ <math>A'</math> و <math>B'</math> مماثلتي B و A على التوالي بالنسبة ل <math>(\Delta)</math> 2- بين أن <math>AB = A'B'</math></p>	<u>أنشطة تشخيصية</u>
المدة: 20 دقائق	<p><u>نشاط</u></p>  <p>1- أنشئ P و R مماثلتي A و I بالنسبة ل <math>(\Delta)</math> على التوالي 2- بين أن <math>RP = IA</math> 3- أنشئ الدائرة التي مركزها R و تمر من النقطة P</p>	<u>أنشطة بنائية</u>
	<p><u>5-مماثلة دائرة</u> <u>خاصية</u></p> <p>مماثلة دائرة C مركزها O وشعاعها r بالنسبة ل <math>(D)</math> هي الدائرة <math>C'</math> التي مركزها <math>O'</math> وشعاعها r حيث <math>O'</math> مماثلة O بالنسبة ل <math>(D)</math></p>	
المدة: 10 دقائق	<p><u>مثال</u></p>  <p>- <math>O'</math> و <math>A'</math> مماثلتي O و A بالنسبة ل <math>(D)</math> على التوالي - الدائرة <math>(C')</math> هي مماثلة الدائرة <math>(C)</math> بالنسبة ل <math>(D)</math></p>	<u>ملخص الدروس</u>
المدة: 15 دقائق	<p><u>تمرين تطبيقي</u></p>  <p>1- أنشئ <math>(C')</math> مماثلة الدائرة <math>(C)</math> بالنسبة ل <math>(D)</math> 2- ما هو شعاع الدائرة <math>(C')</math></p>	<u>أنشطة تقويمية</u>