


### 1 - الدالة الخطية :



تعريف :

العلاقة  $f$  التي تربط كل عدد حقيقي  $x$  بالعدد الحقيقي  $ax$  تسمى دالة خطية  
العدد  $ax$  يسمى صورة العدد  $x$  بالدالة  $f$  ونكتب :  $f(x)$   
العدد  $a$  يسمى معامل الدالة الخطية  $f$ .  
ولدينا :  $f(x) = ax$  أو  $f: x \mapsto ax$

مثال : مساحة مستطيل طوله  $4cm$  و عرضه  $x$   
لدينا : لدينا علاقة بين المساحة و عرض المستطيل :  $S = 4x$   
هذه العلاقة تسمى دالة خطية يرمز لها غالبا ب :  $f$  أو  $g \dots$

ونكتب :  $f(x) = 4x$   
حيث  $x$  عرض المستطيل و  $f(x)$  مساحته .

تمرين : لتكن  $f$  الدالة الخطية حيث :  $f(x) = 3x$

1 - أحسب  $f(2)$  و  $f(-1)$  و  $f(0)$

2 - أنشئ في معلم متعامد النقط التالية :

$O(0, f(0))$  و  $A(2, f(2))$  و  $B(-1, f(-1))$


3 - حدد صورة 1 بالدالة  $f$  مبيانيا .

4- حدد العدد الذي صورته بالدالة  $f$  هو 6 مبيانيا أو جبريا .

نقط المستوى  $M(x, f(x))$  تكون مستقيما معادلته :  $y = 3x$   
يمر من أصل المعلم .

يسمى التمثيل المبياني للدالة  $f$  .

### 2 - الدالة التآلفية :



تعريف :

العلاقة  $f$  التي تربط كل عدد حقيقي  $x$  بالعدد الحقيقي  $ax + b$  تسمى دالة تآلفية

العدد  $ax + b$  يسمى صورة العدد  $x$  بالدالة  $f$  ونكتب :  $f(x)$   
العدد  $a$  يسمى معامل الدالة التآلفية  $f$  .

ولدينا :  $f(x) = ax + b$  أو  $f: x \mapsto ax + b$

مثال : محيط مستطيل طوله  $4cm$  و عرضه  $x$   
لدينا : لدينا علاقة بين المحيط و عرض المستطيل :  $P = 2x + 8$   
هذه العلاقة تسمى دالة خطية يرمز لها غالبا ب :  $f$  أو  $g \dots$

ونكتب :  $f(x) = 2x + 8$

حيث  $x$  عرض المستطيل و  $f(x)$  محيطه .

تمرين : لتكن  $f$  الدالة التآلفية حيث :  $f(x) = 2x + 3$

1 - أحسب  $f(2)$  و  $f(-1)$  و  $f(0)$

2 - أنشئ في معلم متعامد النقط التالية :


$O(0, f(0))$  و  $A(2, f(2))$  و  $B(-1, f(-1))$

3 - حدد صورة 1 بالدالة  $f$  مبيانيا .

4- حدد العدد الذي صورته بالدالة  $f$  هو 6 مبيانيا أو جبريا .

نقط المستوى  $M(x, f(x))$  تكون مستقيما معادلته :  $y = 3x$   
يمر من أصل المعلم .

يسمى التمثيل المبياني للدالة  $f$  .

<p>1- دالة خطية إذن <math>f(x) = ax</math> لدينا : <math>f(2) = -6</math> أي <math>a \times 2 = -6</math> ومنه : <math>a = -3</math>  <math>f(-1) = -3 \times (-1) = 3 - 2</math></p>	<p>تمرين 1 : دالة خطية بحيث : <math>f(2) = -6</math>                  1- حدد معامل هذه الدالة .                  2- أحسب <math>f(-1)</math></p>
<p>1- الدالة التآلفية <math>f</math> تكتب على شكل : <math>f(x) = ax + b</math>                  - معامل الدالة : <math>a = \frac{2-1}{3-1} = \frac{3}{2}</math>                  - الأرتوب عند الأصل : <math>b = 2 - \frac{3}{2} \times 3 = \frac{-5}{2}</math>                  إذن الصيغة المختصرة : <math>f(x) = \frac{3}{2}x - \frac{5}{2}</math>  <math>f(5) = \frac{3}{2} \times 5 - \frac{5}{2} = \frac{10}{2} = 5 - 2</math></p>	<p>تمرين 2 : دالة تآلفية بحيث : <math>f(1) = -1</math> و <math>f(3) = 2</math>                  1- حدد صيغة الدالة <math>f</math> .                  2- أحسب <math>f(5)</math></p>
<p>1- <math>f(0) = -2 \times 0 + 5 = 5</math>  <math>f(1) = -2 \times 1 + 5 = -2 + 5 = 3</math>                  2- العدد الذي صورته 0 بالدالة <math>f</math> هو 0  <math>f(x) = x - 3</math> ومنه : <math>-2x + 5 = x</math> أي : <math>x = \frac{5}{3}</math></p>	<p>تمرين 3 : لتكن الدالة التآلفية المعرفة كمايلي :  <math>f(x) = -2x + 5</math>                  1- أحسب <math>f(0)</math> و <math>f(1)</math>                  2- حدد العدد الذي صورته 0 بالدالة .                  3- حدد العدد الذي صورته بالدالة <math>f</math> هو نفسه .</p>
<p>1- دالة خطية تكتب على شكل : <math>g(x) = ax</math>  <math>a = \frac{7}{5}</math> ومنه : <math>3a + 2a = 7</math>                  إذن : <math>g(x) = \frac{7}{5}x</math></p>	<p>تمرين 4 : لتكن الدالة الخطية <math>g</math> المعرفة كمايلي :  <math>g(3) + g(2) = 7</math>                  1- حدد الدالة <math>g</math> .</p>
<p>لدينا : <math>\frac{h(9)-h(5)}{9-5} = \frac{h(3)-h(5)}{3-5} = \frac{4}{-2}</math>                  ومنه : <math>h(9) - h(5) = -8</math></p>	<p>تمرين 5 : دالة تآلفية بحيث : <math>h(3) - h(5) = 4</math>                  1- أحسب <math>h(9) - h(5)</math></p>
<p>1- لدينا : <math>-3 \times 3m + 2 + 4m = -3m + 6 + 2</math>                  ومنه : <math>-2m = 6</math> أي : <math>m = -3</math>                  2- <math>g(x) = -3(2x - 1) + 2 - 5</math>                  ومنه : <math>g(x) = -6x + 3 + 2 - 5</math>  <math>g(x) = -6x</math>                  دالة خطية معاملها يساوي -6</p>	<p>تمرين 6 : نعتبر <math>f</math> الدالة التآلفية : <math>f(x) = -3x + 2</math>                  1- حدد العدد <math>m</math> بحيث :  <math>f(3m) + 4m = f(m - 2)</math>                  2- لتكن الدالة <math>g</math> بحيث : <math>g(x) = f(2x - 1) - 5</math>                  بين أن دالة خطية محددًا معاملها .</p>
	<p>تمرين 7 : لتكن الدالة الخطية : <math>f(x) = 2x</math>                  والدالة التآلفية : <math>g(x) = -3x + 5</math>                  1- أحسب <math>f(1)</math> و <math>g(1)</math>                  2- حدد العدد <math>x</math> بحيث : <math>g(x) = x</math>                  3- أنشئ التمثيل المبياني لكل من الدالتين في م.م.م.                  4- حل مبيانيا المعادلة <math>f(x) = g(x)</math>                  5- حل مبيانيا المتراجحة <math>f(x) \leq g(x)</math></p>