تم تحميل هذا الملف من موقع تلاميذي www.talamidi.com

ثانوية سيدي بومدين الإعدادية نيابة لإقليم صفرو	الاختبار الموحد المحلي للسنة الثالثة إعدادي الأسدس الأول – مادة الرياضيات يناير 2015	حلول مقترحة أذ سمير لخريسي

تمرين 1 :

1

$A=\sqrt{\frac{1}{16}+\left(\frac{4}{3}\right)^{-1}}=\frac{1}{4}+\frac{3}{4}=\frac{4}{4}=1$ ، $B=\sqrt{8\times\sqrt{4}}-2=\sqrt{8\times2}-2=\sqrt{16}-2=4-2=2$

2

$C=\sqrt{50}-2\sqrt{18}+4\sqrt{2}$
$C=\sqrt{25\times2}-2\sqrt{9\times2}+4\sqrt{2}$
$C=5\sqrt{2}-6\sqrt{2}+4\sqrt{2}$
$C=3\sqrt{2}$

،

$D=\sqrt{2\sqrt{5}+2}\times\sqrt{2\sqrt{5}-2}$
$D=\sqrt{\left(2\sqrt{5}+2\right)\times\left(\left(2\sqrt{5}-2\right)\right)}$
$D=\sqrt{\left(2\sqrt{5}\right)^2-2^2}=\sqrt{4\times5-4}$
$D=\sqrt{20-4}=\sqrt{16}=4$

3

$E=4000\times10^6\times0{,}00015=4\times10^3\times10^6\times1{,}5\times10^{-4}=4\times1{,}5\times10^3\times10^6\times10^{-4}=6\times10^5$

4

أ) $M=(3x-1)^2-3(2x+1)=(3x)^2-2\times3x\times1+1^2-6x-3=9x^2-6x+1-6x-3=9x^2-12x-2$

ب) $N=5(x-4)+(x-4)^2=(x-4)[5+(x-4)]=(x-4)(x+1)$

تمرين 2 :

1 لدينا $\left(2\sqrt{6}\right)^2=4\times6=24$ و $5^2=25$ ، بما أن : $25>24$ فإن : $5>2\sqrt{6}$

2

لدينا : $\begin{cases}4\le a\le5\\-3\le b\le-2\end{cases}$
إذن : $(-2)+(-3)\le a+b\le5+(-4)$
بالتالي : $1\le a+b\le3$

لدينا : $\begin{cases}4\le a\le5\\-3\le b\le-2\end{cases}$
إذن : $\begin{cases}4\le a\le5\\2\le-b\le3\end{cases}$
إذن : $4+2\le a+(-b)\le5+3$
بالتالي : $6\le a-b\le8$

لدينا : $\begin{cases}4\le a\le5\\2\le-b\le3\end{cases}$
منه : $4\times2\le a\times(-b)\le5\times3$
أي : $8\le-ab\le15$
منه : $-15\le ab\le-8$
بالتالي : $-5\le ab+10\le2$

3 لدينا : $0\le\sqrt{2c-2}\le2$ منه : $0^2\le\left(\sqrt{2c-2}\right)^2\le2^2$ منه : $0\le2c-2\le4$ منه : $0+2\le2c-2+2\le4+2$
منه : $2\le2c\le6$ منه : $2\times\frac{1}{2}\le2c\times\frac{1}{2}\le6\times\frac{1}{2}$ بالتالي : $1\le c\le3$

تمرين 3 :

1 نعلم أن $(\cos x)^2+(\sin x)^2=1$ إذن : $(\cos x)^2+\left(\frac{2\sqrt{2}}{3}\right)^2=1$ منه : $(\cos x)^2+\frac{8}{9}=1$
منه : $(\cos x)^2=1-\frac{8}{9}$ منه : $(\cos x)^2=\frac{9}{9}-\frac{8}{9}=\frac{1}{9}$ منه : $\cos x=\sqrt{\frac{1}{9}}=\frac{1}{3}$
وبالتالي : $\tan x=\frac{\sin x}{\cos x}=\frac{\frac{2\sqrt{2}}{3}}{\frac{1}{3}}=\frac{2\sqrt{2}}{3}\times\frac{3}{1}=2\sqrt{2}$

2

أ) $m=\sin^2 75°+\sin^2 15°+\cos^2 65+\cos^2 25°=\sin^2 75°+\cos^2 75°+\cos^2 65+\sin^2 65°=1+1=2$

ب) $n=\sin x\times\tan x\times\cos x+\cos^2 x=\sin x\times\frac{\sin x}{\cos x}\times\cos x+\cos^2 x=\sin^2 x+\cos^2 x=1$

تمرين 4 :

1 لدينا : $AB^2=3^2=9$ و $AC^2=6^2=36$ و $BC^2=\left(3\sqrt{5}\right)^2=9\times5=45$
بما أن : $AC^2+AB^2=BC^2$ فإن : $9+36=45$
إذن حسب مبرهنة فيثاغورس العكسية نستنتج أن ABC مثلث قائم الزاوية في A

2 منه: $\cos\left(A\hat{B}C\right)=\frac{AB}{BC}=\frac{3}{3\sqrt{5}}=\frac{1}{\sqrt{5}}=\frac{\sqrt{5}}{5}$ و $\tan\left(A\hat{B}C\right)=\frac{AC}{AB}=\frac{6}{3}=2$

3 لدينا في المثلث ABC : $E\in(AB)$ و $F\in(AC)$ و $(EF)//(BC)$، إذن حسب مبرهنة طاليس المباشرة
نستنتج أن : $\frac{AE}{AB}=\frac{AF}{AC}=\frac{EF}{BC}$ منه : $\frac{2{,}5}{3}=\frac{AF}{6}$ منه: $AF=\frac{6\times2{,}5}{3}=5\ cm$

تمرين 5 :

1 لدينا $A\hat{E}F$ و $A\hat{M}F$ زاويتان محيطيتان تحصران نفس القوس، إذن : $A\hat{E}F=A\hat{M}F$ منه : $A\hat{E}F=54°$
لدينا $A\hat{O}F$ زاوية مركزية مرتبطة بالزاوية المحيطية $A\hat{M}F$ ، إذن: $A\hat{O}F=2\times A\hat{M}F=2\times54=108°$

2
لدينا : $IA=IF$ (1) (معطيات)
و $A\hat{I}E=F\hat{I}M$ (2) (زاويتان متقابلتان بالرأس)
و $A\hat{E}F=A\hat{M}F$ (3) (حسب السؤال السابق)
من (1) و (2) و (3) نستنتج أن : AIE و FIM متقايسان

3 بما أن AIE و FIM متقايسان فإن $IE=IM$ لأن الأضلاع المتناظرة لمثلثين متقايسين تكون متقايسة.

www.naja7math.com - رياضيات النجاح
رياضيات النجاح أذ سمير لخريسي
www.naja7math.com