

درس: الجهاز العصبي

تقديم اشكالي:

يستطيع الحاسوب أن يقوم بعدد هائل من العمليات في وقت جد وجيز يقدر ب 10.000 مليار عملية في الثانية، ويشمل ذلك كتابة نص أو تصفح الانترنت أو مشاهدة فيديو أو أي عملية أخرى، ولذلك يعتبر رمزا للتطور التكنولوجي في هذا العصر فهو يساعد في تسهيل حياة الناس ومساعدتهم. ولكنه رغم ذلك فهو لا يوازي قدرات الإنسان، فجسم الإنسان يستطيع التحكم بما يقارب 100.000 مليار عملية في كل ثانية، ويشمل ذلك كل ما نستقبله عبر حواسنا من أصوات وأضواء وكل ما نقوم به من حركات ومن أنشطة لأجهزة الجسم. والذي يتحكم في كل هذه الأنشطة هو الجهاز العصبي.

↔ كيف يتدخل الجهاز العصبي في إتقاط المعلومات من المحيط الخارجي؟

↔ ما العناصر المكونة للجهاز العصبي؟



I. أتعرف الحساسية الشعورية

1. أتعرف المستقبلات الحسية: حاسة اللمس

↔ معطيات:

يستعمل المكفوفون تقنية "برايل" لقراءة وكتابة النصوص اللغوية، وتعتمد هذه التقنية على حاسة اللمس باستعمال أصابع اليد وتحسس الحروف المضغوطة على الورقة.

للتعرف على العناصر الموجودة على مستوى الجلد والتي تتدخل في حاسة اللمس نلاحظ بواسطة المجهر عينة من الجلد البشري، ونقترح وثيقة بنية العصب:



المطلوب:

بالاعتماد على معطيات الوثيقتين:

a. أتعرف على المستقبلات الحسية على مستوى الجلد

يحتوي جلد الإنسان على عدة أنواع من المستقبلات الحسية تتموضع في نهاية الألياف العصبية من بينها الجسيمات اللمسية: جسيمات Meissner التي تستجيب للضغط الخفيف وجسيمات Pacini التي تستجيب للضغط القوي.

b. استخلص دور المستقبلات الحسية


على غرار حاسة اللمس، فإن باقي أعضاء الحواس الأخرى تحتوي على مستقبلات حسية نوعية تستقبل منبهات نوعية من الوسط الخارجي.

c. صف بنية العصب مع علاقتها بالألياف العصبية

من خلال وثيقة بنية العصب نلاحظ أن الألياف العصبية تغادر الجلد للتجمع مع ألياف عصبية أخرى على شكل حزم، يحيط بها نسيج ضام، ويشكل المجموع العصب.

2. أكشف كيفية نشوء وانتقال السيالة العصبية الحسية

معطيات:



للكشف عن دور المستقبلات الحسية، نقوم بعزل جسيم Pacini في المختبر ونربطه بمجسات مجهرية على مستوى طرف الليف العصبي لتسجيل أي نشاط عصبي. وعند اخضاعه لضغط قوي (إهاجة فعالة) تستقبل المجسات الموضوعة في الليف العصبي إشارات كهربائية يتم تسجيلها في شاشة الحاسوب كما هو مبين في الوثيقة جانبه.

المطلوب:

بالاعتماد على المعطيات السابقة والموضحة في الوثيقة المرفقة:

a. فسر النتائج المحصل عليها

عند تطبيق ضغط قوي على جسيم Pacini، يرسل هذا الأخير إشارات كهربائية عبارة عن رسالة عصبية تنتقل عبر الليف العصبي.

b. استخلص دور المستقبلات الحسية على مستوى أعضاء الحس




تستجيب المستقبلات النوعية لمنبهات نوعية فيتولد عن ذلك سيالة عصبية حسية تنتقل عبر الألياف الحسية. يتعلق الأمر برسالة تنتقل عبر الألياف العصبية. شدة الرسالة تختلف حسب شدة الإهاجة (شدة الضغط مثلا).

3. أكشف دور المخ في الحساسية الشعورية

أ. أتعرف بنية الدماغ

↪ معطيات:

للتعرف على بنية الدماغ ومكونات النسيج العصبي نستعين بالوثائق التالية:



صورة مجهرية لخلايا عصبية على مستوى المخ. X400

بينت التجارب أنه عند تخريب جسم خلوي أو أجسام خلوية على مستوى المادة الرمادية يتم انحلال ألياف عصبية على مستوى المادة البيضاء والعصب بنفس العدد.

↪ المطلوب:

بالاعتماد على المعطيات والوثائق المرفقة:

a. تعرف على العناصر المكونة للدماغ

b. صف بنية الدماغ

يتكون دماغ الإنسان من مخ ومخيخ وبصلة سيسائية، ويرتبط من الأسفل بالنخاع الشوكي. يمتاز دماغ الإنسان بمخ كبير، تلافيفه متعددة، يتشكل جزؤه السطحي من قشرة مخية مكونة من المادة الرمادية تمثل تقريبا 40% من كتلة المخ، تحيط بالمادة البيضاء. وينقسم المخ إلى نصفي كرة مخية يفصل بينهما شق.

c. تعرف على الوحدة التركيبية للنسيج العصبي على مستوى المخ


نلاحظ وجود أجسام خلوية على مستوى المادة الرمادية، ووجود ألياف عصبية على مستوى المادة البيضاء. وكل من الجسم الخلوي والليف العصبي يشكلان الخلية العصبية أو العصبون. وتشكل الخلية العصبية الوحدة البنوية والوظيفية للنسيج العصبي.

b. أكشف أن المخ هو مركز الحساسية الشعورية

معطيات:

للكشف عن دور المخ في الحساسية الشعورية، يتم استعمال تقنية قياس صبيب الدم والتي تستشعر نشاط المخ أثناء القيام بأنشطة عصبية مرتبطة بالحساسية الشعورية، وذلك بالإعتماد على كمية الدم التي تعبر القشرة المخية.

المعلومات المحصل عليها تبعث إلى حاسوب يعالجها ويعرضها الشاشة كما تبين الوثيقة التالية:



المطلوب:

بالاعتماد على النتائج المحصل عليها:





a. تعرف على الباحات الحسية

b. استخلص دور هذه الباحات الحسية

نستنتج أن السيالة العصبية المتولدة على مستوى المستقبلات الحسية النوعية لأعضاء الحس تصل لمناطق متخصصة بالقشرة المخية تدعى الباحات الحسية حيث يتم تحليل السيالة العصبية الحسية وتحديد طبيعة الإحساس، وذلك بفضل الأجسام الخلوية الموجودة بالقشرة المخية على مستوى هذه الباحات.

الباحات الحسية على مستوى القشرة المخية

13.ت




4. حسيّة

يتمكن الإنسان من الإحساس بمختلف منبهات الوسط الخارجي بفضل:

- ❖ مستقبلات حسية: تستقبل الإهارة وتحولها إلى سيالة عصبية حسية؛
- ❖ موصلات حسية: وهي ألياف عصبية حسية توصل السيالة العصبية الحسية الى المراكز العصبية الحسية؛
- ❖ مراكز عصبية حسية: تسمى بالباحت الحسية وهي تعمل على تحليل السيالة العصبية الحسية وتحدد طبيعة الإحساس.


مسار السيالة العصبية الحسية

ون 12



1- ضف مسار السيالة العصبية الحسية باللون الأزرق.

2- اتمم الخطاطة :




II. أتعرف التحركية الإرادية

1. أكشف أن المخ مصدر التحركية الإرادية

↩ معطيات:

يحتوي مخ الإنسان على باحات حسية تمكن من استقبال المعلومات وترجمتها إلى حساسية شعورية. فيقوم الجسم بردود أفعال مختلفة ضمنها حركات إرادية. بواسطة تقنية إستكشاف نشاط المخ، تم قياس صيبب الدم على مستوى القشرة المخية أثناء قيام شخص بحركات إرادية، وذلك للكشف عن دور المخ في التحركية الإرادية. والنتائج تظهرها الوثيقة التالية:



↩ المطلوب:

بالاعتماد على النتائج المحصل عليها:

a. تعرف على الباحة المتدخلة في التحركية الإرادية

توجد الباحة الحركية بالفص الجبهي أمام شق رولاندو.

b. حدد نصف الكرة المخية المسؤولة عن تحريك الجانب الأيمن من الجسم ثم الجانب الأيسر من الجسم

نلاحظ أن نصف الكرة المخية الأيسر يتحكم في تحريك الجانب الأيمن من الجسم، والعكس صحيح.

c. استخلص دور المخ في التحركية الإرادية

عند اتخاذ قرار تنشئ سيالة عصبية حركية على مستوى الباحة الحركية، تؤدي إلى تحريك عضو معين في الجهة المعاكسة من الجسم.

2. أتعرف مسير السيالة العصبية الحركية

↩ معطيات:

ملاحظات سريرية:

❖ الحالة الأولى: أصيب شخص برصاصة في نخاعه الشوكي، فأصبح عاجزا عن القيام بالحركات الإرادية للأعضاء الموجودة مباشرة أسفل الإصابة.

❖ الحالة الثانية: أدى حادث إلى قطع عصب على مستوى الفخذ، نتج عنه شلل الساق والقدم الموجودين في نفس الطرف.

↩ المطلوب:

بالاعتماد على المعطيات المقدمة:

a. حدد دور النخاع الشوكي والعصب في التحركية الإرادية

كل من النخاع الشوكي والألياف العصبية يوصل السيالة العصبية الحركية إلى المستجيب الحركي.


b. استخلص مسير السيالة العصبية الحسية

تتجه السيالة العصبية الحركية من المركز العصبي الحركي (الباحة الحركية) عبر النخاع الشوكي ثم الليف العصبي وصولا إلى العضلة، التي تستجيب لتأثير السيالة العصبية الحركية بالتقلص، لهذا تسمى مستجيب حركي. أما العصب الذي ينقل السيالة العصبية الحركية النابذة يسمى عصب حركي.

3. حصيلة:

يتطلب إنجاز كل نشاط إرادي تدخل:

- ❖ مركز عصبي حركي: تنشأ على مستواه السيالة العصبية الحركية عند اتخاذ القرار؛
- ❖ موصل حركي: كل من النخاع الشوكي والليف العصبي الحركي ينقل السيالة العصبية الحركية في اتجاه نابذ؛
- ❖ مستجيب حركي: وهو العضلة التي تتقلص استجابة للسيالة العصبية الحركية.



III. أتعرف التحركية الإرادية: الإنعكاس الشوكي



1. أكشف عن العناصر المتدخلة في الإنعكاس الشوكي

← معطيات:

عند الضغط عبر ضربة خفيفة بمطرقة أسفل الركبة (وتر الداغصة) تتحرك ساق الشخص للأمام بدون ارادته. فهي رد فعل لإرادي ينتج عن اهاجة مستقبلات حسية، إنه الانعكاس الشوكي


للكشف عن العناصر المتدخلة في الإنعكاس الشوكي نقوم بمجموعة من التجارب على ضفدعة شوكية وفق المراحل المبينة على البطاقة التقنية.

ملحوظة: الضفدعة الشوكية هي ضفدعة مخربة الدماغ

الإستنتاج	النتيجة	التجربة
نستنتج أن الدماغ لا يتدخل في الإنعكاس الشوكي.	نلاحظ أن الضفدعة الشوكية تسحب أطرافها الخلفية بعد تعريض هذه الأخيرة لإهاجة فعالة.	إهاجة الطرف الخلفي للضفدعة بإهاجة فعالة 
نستنتج أن العصب عنصر يتدخل في الإنعكاس الشوكي، وذلك بنقله للسيالة العصبية الحسية عند الإهاجة والسيالة العصبية الحركية لتنفيذ الحركة.	نلاحظ أن الضفدعة الشوكية لم تسحب طرفها الخلفي مقطوع العصب بعد تعريض هذا الأخير لإهاجة فعالة.	إهاجة الطرف الخلفي مقطوع العصب بإهاجة فعالة 
	نلاحظ أن الضفدعة مخربة الدماغ قامت بسحب طرفها الخلفي سليم العصب بعد تعريض هذا الأخير لإهاجة فعالة.	إهاجة الطرف الخلفي السليم

ضفدعة شوكية

19. بنية النخاع الشوكي



بينت التجارب أنه عند تخريب جسم خلوي أو أجسام خلوية على مستوى المادة الرمادية يتم انحلال ألياف عصبية على مستوى المادة البيضاء والعصب بنفس العدد.

المطلوب: ↩

a. تعرف على بنية النخاع الشوكي وذلك بملئ الوثيقة المرفقة

b. حدد مكونات المادة البيضاء والمادة الرمادية

نلاحظ بالمادة الرمادية وجود أجسام خلوية تمتد بألياف عصبية على مستوى المادة البيضاء.

c. صف بنية النخاع الشوكي

يتكون النخاع الشوكي من مادة بيضاء تضم أليافا عصبية تحيط بمادة رمادية تضم أجساما خلوية. يرتبط النخاع الشوكي بالعصب السيسائي من جانبيه عبر الجذر الأمامي والخلفي.

3. أحدد مسير السيالة العصبية على مستوى النخاع الشوكي: قوس الإنعكاس

معطيات: ↩

لتحديد مسير السيالة العصبية على مستوى النخاع الشوكي وللتعرف على دور العناصر المكونة له، قام العالم Magendie بسلسلة من التجارب على كلاب صغيرة كما توضح الوثيقة التالية:

الإستنتاجات	النتائج	التجارب
العصب السيسائي مسؤول عن نقل السيالة العصبية الحسية والسيالة العصبية الحركية.	شلل المنطقة المعصوبة بواسطة هذا العصب وفقدان كل حساسية بها.	 <p>قطع العصب السيسائي</p>
الجذر الأمامي مسؤول عن نقل السيالة العصبية الحركية فقط.	شلل العضلات المعصوبة بواسطة هذا العصب لكنها تحتفظ بحساسياتها. يؤدي تهيبج الجزء المحيطي إلى تقلص عضلي.	 <p>قطع الجذر الأمامي ثم تهيبج الجزء المحيطي</p>
الجذر الأمامي ينقل السيالة العصبية الحركية في الاتجاه النابذ.	لا تؤدي إهاجة الجزء المركزي إلى أية حركة.	 <p>قطع الجذر الأمامي ثم تهيبج الجزء المركزي</p>
الجذر الخلفي مسؤول عن نقل السيالة العصبية الحسية فقط.	لا تشل منطقة الجسم المعصوبة بهذا العصب، لكنها تفقد حساسيتها، وينتج عن إهاجة الجزء المركزي إحساس بالألم خفيف.	 <p>قطع الجذر الخلفي ثم تهيبج الجزء المركزي</p>
الجذر الخلفي ينقل السيالة العصبية الحسية في الاتجاه المركزي.	لا يؤدي تهيبج الجزء المحيطي إلى أي رد فعل.	 <p>قطع الجذر الخلفي ثم تهيبج الجزء المحيطي</p>

المطلوب: ⇐

بعد قراءتي لنتائج تجارب Magendie بتمعن:

a. قدم استنتاجا مناسباً لكل مرحلة على حدة

b. ماذا تستخلص بالنسبة لمسار السيالة العصبية على مستوى النخاع الشوكي

أثناء الحركة الإنعكاسية تنشئ السيالة العصبية الحسية على مستوى المستقبلات الحسية للجلد لتتنقل عبر الألياف العصبية الحسية في الإتجاه المركزي نحو النخاع الشوكي عبر الجذر الخلفي المرتبط به، وعلى مستوى المادة الرمادية يتم تأويلها وتحويلها إلى سيالة عصبية حركية التي تغادر النخاع الشوكي عبر الجذر الأمامي لتتنقل عبر الألياف العصبية الحركية في الاتجاه النابذ نحو المستجيب الحركي أي العضلات التي تتقلص استجابة لتأثير السيالة الحركية. يسمى هذا المسار بقوس الإنعكاس

c. املأ وثيقة الحصيلة التالية:

