






159



▲ كرية لمفاوية T معفنة تدور بدماء VIH




▲ حمّة نسبياً ملحوظة بواسطة المجهر الإلكتروني



▲ مراحل تحرير حمّة VIH جديد من طرف لمفاوية T معفنة

انجز رسمياً تخطيطياً لمراحل تحرير حمّة VIH من طرف لمفاوية T معفنة داخلياً داخل الإطار أسفله.

--	--	--	--




- وضح كيف يتتطور تركيز T4 و VIH بالجسم :

أ- خلال 9 أشهر الأولى :

ب- من 9 أشهر إلى 10 سنوات :

ت- ما بعد 10 سنوات :

### و.3 مراحل تطور داء فقدان المناعة المكتسبة



### ينتقل داء السيدا

- 1** عبر الإتصال الجنسي مع شريكه مصاب
- 2** بواسطة الأدوات الحادة والغير المعقمة أو الملوثة بالدم
- 3** من المرأة المصابة إلى جنينها خلال الحمل أو إلى طفليها أثناء الرضاعة

### تجنبوا

- 1** تعدد الشركاء الجنسيين
- 2** الحمل في حالة الإصابة بفيروس السيدا
- 3** تبادل الحقن

### تبنوا

- 1** الإخلاص في العلاقات الزوجية
- 2** استعمال العازل الطبي
- 3** استعمال الأدوات الحادة المعقمة أو ذات الاستعمال الوحيد
- 4** العلاج في حالة الإصابة بمرض منقول جنسيا

### و5. وقاية الجهاز التناسلي

طرق الوقاية	الأخطار التي تهدده	الجهاز
<ul style="list-style-type: none"> <li>- تجنب الاتصالات الجنسية غير المشروعة - استعمال العازل الطبي-</li> <li>- الخضوع للمراقبة الطبية باستمرار</li> <li>- إخبار الشريك الجنسي في حالة الإصابة - في حالة الإصابة بالمرض يجب الخضوع لفحوصات طبية دقيقة والعلاج بواسطة المضادات الحيوية وفقاً لوصفة الطبيب</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- السيدا - مرض السيلان - السيفيليس (الزهري)</li> <li>- الكباد 9 Hepatite (ويمكن لهذه الأمراض أن تُنقل عبر الاتصالات الجنسية)</li> </ul>	الجهاز التناسلي