

تحاقن الدم والمشاكل المناعية التي يطرحها

مقدمة:

تتطلب عمليات تحقين الدم شروطاً معينة لنجاحها، إذ في غياب هذه الشروط يمكن أن تظهر اضطرابات خطيرة قد تؤدي إلى الموت.

- * ما الشروط الضرورية لتحقيق الدم؟
- * ما المشاكل المناعية التي تطرحها هذه العملية؟

I. الكشف عن مشكل تحقين الدم:

(1) لمحّة تاريخية عن تحقين الدم: (أنظر و1 ص148)

في سنة 1668 أصدر البرلمان الفرنسي قراراً يمنع عملية تحقين دم الحيوان للإنسان لأنها أدت إلى نتائج عكسية من بينها وقوع وفيات.


في سنة 1873 بين الباحثان Landois و Muller أن خلط دم الإنسان بدم الحيوان يؤدي إلى تكون تكذبات تظهر بالعين المجردة أطلق عليها اسم اللكد.

وفي سنة 1901 أحد Landsteiner عينات من دم موظفي مختبره، ثم عزل المصل عن الكريات الدموية الحمراء بالنسبة لكل عينة. وعند خلط كل مصل على حدة بالكريات الحمراء المعزولة من دم كل موظف لاحظ حدوث اللكد في بعض الحالات فقط.


تبين هذه الوثيقة أن عملية تحقين الدم مررت من عدة مراحل تاريخية عرفت فيها عدة إخفاقات، إلى أن جاء العالم Landsteiner فارسي سنة 1901 قواعد تحقين الدم المعتمد بها حالياً.

• الوثيقة 1 لمحّة تاريخية عن تحقين الدم

(2) النتيجة الممكنة عند خلط دم شخصين: (أنظر و2 ص148)



(3) الملاحظة المجهرية للنتيجة الممكنة إثر خلط دم شخصين: (أنظر و3 ص148)



أ- تبين الملاحظة المجهرية أن الكريات الحمراء منعزل بعضها عن بعض في حالة عدم حدوث اللكد.

ب- تبين الملاحظة المجهرية أن الكريات الحمراء متتصق بعضها البعض في حالة حدوث اللكد.

II. التعرف عن كيفية تحديد الفصائل الدموية:

(1) مميزات الفصائل الدموية: (أنظر و 4 ص 149)


O	AB	B	A	الفصائل الدموية
				الكريات الحمراء مولد المضاد A مولد المضاد B
				المصل مضادات الأجسام مضاد A: B- مضاد B: A-

تنتمي الفصائل الدموية الأربع، A، B، AB، O:

* بوجود أو غياب مولدات المضاد (A أو B أو هما معاً) على مستوى غشاء الكريات الدموية الحمراء. (مولد المضاد = مولد اللكتين).

* بوجود أو غياب مضادات الأجسام (مضاد أجسام مضاد A أو مضاد B أو هما معاً) في المصل. (مضاد أجسام = لكتين).

(2) آلية حدوث اللكت عند خلط قطرتي دم غير مترافقين: (أنظر و 5 ص 149)



(3) طريقة تحديد الفصائل الدموية بواسطة أ Mitsuhama: (أنظر و 6 ص 149)

مولد المضاد الذي تحمله دم + مصل به مضاد A (اللكتين)	الأجسام مضاد B (اللكتين)	الكريات الحمراء (مولد اللكت)	الفصيلة الدموية
		A	A
		B	B
		B و A	AB
		غياب A و B	O

الآلية 6 طريقة تحديد الفصائل الدموية بواسطة أ Mitsuhama

يمكن تحديد الفصائل الدموية بواسطة أ Mitsuhama. ويوجد ثلاثة أنواع من أ Mitsuhama وهي:


* مصل اختبار مضاد A.

* مصل اختبار مضاد B.

* مصل اختبار مضاد A + مضاد B.

توضع ثلاث قطرات من الدم فوق صفيحة ثم يضاف إلى كل قطرة نوع من مصل الإختبار و يلاحظ مع أي مصل يحدث اللكت ثم يتم استنتاج الفصيلة الدموية لهذا الشخص.

(4) شروط تحчин الدم:



يؤدي حقن شخص بدم يحتوي على مولد اللكت غير موجود في دمه إلى استجابة مناعية ينتج عنها تلكلد كريات دم المحققون. وعليه لابد من التقيد بقواعد التلاطم المبينة في الخطاطلة التالية:

ملحوظة:

- * يمكن العمل بهذه الخطاطة إذا تعلق الأمر بحقن الدم لأول مرة أو بكمية قليلة. أما عند حقن كمية كبيرة من الدم، فإنه يستلزم أخذ الدم من نفس فصيلة الشخص المتلقى.
- * يحدث اللدغ بين الكريات الحمراء للمعطرى ومصل الأخذ

(5) عامل الريزوس:

أ- لحمة تاريخية: (أنظر و 7 ص 149)



ب- عاقب عدم مراعاة عامل ريزوس:

بالإضافة إلى الفصائل الدموية الأربع، هناك عامل الريزوس (Rh) الذي ينبغيأخذه بعين الإعتبار أثناء التحقيق.

❖ المثال الأول:

إذا حقن شخص Rh- بدم شخص +Rh، يؤدي ذلك إلى تكون مضادات Rh في دم الشخص -Rh، لأن جهاز المناعي اعتبر Rh+ عنصراً أجنبياً (مولد مضاد) أي غير ذاتي. إذا ما تكررت عملية التحقيق هذه، فإن مضاد Rh الذي تكون على إثر التحقيق الأول عند الشخص -Rh يل ked كريات المعطرى، الشيء الذي يؤدي إلى اضطرابات خطيرة عند الشخص المحققون.

❖ المثال الثاني:

في حالة لا تواافق عامل Rh عند الزوجين (الزوج +Rh والزوجة -Rh)، ينبغي مراقبة الحمل؛ ذلك أنه على إثر تسرب دم الحميل عبر المشيمة إلى دم الأم، يتشكل في بلازما هذه الأخيرة مضاد Rh القادر فيما بعد (الحمل الثاني) على ل ked الكريات الدموية الحمراء +Rh للحميل، مما يتسبب في هلاكه.

ملحوظة: أثناء تناول الدم، يجب مراعاة تلاؤم الفصائل الدموية و عامل الريزوس.

ج- التحقيقات الممكنة مع مراعاة عامل الريزوس Rh:

معطرى								
	O-	O+	B-	B+	A-	A+	AB-	AB+
AB+	●	●	●	●	●	●	●	●
AB-	●		●		●		●	
A+	●				●			
A-	●				●			
B+	●		●	●	●			
B-	●			●				
O+	●		●					
O-	●							