

ملخصي وقواعدي في الرياضيات لمستوى الأولى باك علوم تجريبية

من إنجاز : الأستاذ نجيب عثمانى أستاذ مادة الرياضيات في الثانوى تأهيلى

ملخص درس الاشتقاق

3. هل الدالة f قابلة للاشتقاق عند $x_0 = 0$?
 4. حدد معادلة لنصف مماس المنحنى الممثل للدالة f على اليمين عند $x_0 = 0$.

5. حدد معادلة لنصف مماس المنحنى الممثل للدالة f على اليسار عند $x_0 = 0$.

6. كيف نسمى النقطة $A(0, f(0))$ ؟

$$f(0) = 0^3 + |0| = 0 \quad \begin{cases} f(x) = x^3 + x; x \geq 0 \\ f(x) = x^3 - x; x \leq 0 \end{cases}$$

الجواب :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^3 + x - 0}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x(x^2 + 1)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 + 1 = 1 \quad (1)$$

ومنه f قابلة للاشتقاق على اليمين عند $x_0 = 0$ و

وهو العدد المشتق على اليمين عند $x_0 = 0$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x^3 - x - 0}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x(x^2 - 1)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} x^2 - 1 = -1 \quad (2)$$

ومنه f قابلة للاشتقاق على اليسار عند $x_0 = 0$ و

وهو العدد المشتق على اليسار عند $x_0 = 0$

(3) f قابلة للاشتقاق على اليمين وعلى اليسار عند $x_0 = 0$

ولكن : $f'_d(0) \neq f'_g(0)$

ومنه : f غير قابلة للاشتقاق عند $x_0 = 0$

4. معادلة لنصف مماس منحنى الدالة f على اليمين عند $x_0 = 0$.

$$y = f(x_0) + f'_d(x_0)(x - x_0)$$

$$(\Delta_d) : y = x \Leftrightarrow y = 0 + 1(x - 0) \Leftrightarrow y = f(0) + f'_d(0)(x - 0)$$

5. معادلة لنصف مماس منحنى الدالة f على اليسار عند $x_0 = 0$.

$$y = f(x_0) + f'_g(x_0)(x - x_0)$$

$$(\Delta_g) : y = -x \Leftrightarrow y = 0 - 1(x - 0) \Leftrightarrow y = f(0) + f'_g(0)(x - 0)$$

6. لدينا $f'_d(0) \neq f'_g(0)$ النقطة $A(0, f(0))$ تسمى نقطة مزواة

خاصية: لتكن f دالة عددية معرفة

على مجال مفتوح I و a عنصراً من I

f قابلة للاشتقاق على النقطة a تكافئ f قابلة

للاشتقاق على اليمين في النقطة a و f قابلة للاشتقاق على اليسار في

$$f'_g(a) = f'_d(a)$$

III. الدالة المشقة لدالة عدديّة

1. الاشتقاق على مجال

تعريف: f دالة عدديّة معرفة على مجال مفتوح I نقول إن الدالة f

قابلة للاشتقاق على المجال I إذا كانت f قابلة للاشتقاق في كل

نقطة من I

2. الدالة المشقة

لتكن f دالة عدديّة معرفة على مجال I الدالة المشقة للدالة f

هي الدالة التي نرمز لها بالرمز $(x)f'$ و المعرفة كما يلي :

$$f': I \rightarrow \mathbb{R} : x \rightarrow f'(x)$$

I. قابلية اشتقاق دالة عدديّة في نقطة

تعريف: لتكن f دالة عدديّة معرفة على مجال مفتوح I

و a عنصراً من I

نقول إن الدالة f قابلة للاشتقاق في النقطة a إذا وجد عدد حقيقي l

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = l$$

حيث : $f'(a)$ يسمى العدد المشتق للدالة في النقطة a و نرمز له بالرمز :


$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(a)$$

ملاحظة: الكتابة $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(a)$ تكافى الكتابة $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = f'(a)$

2) التأويل الهندسي للعدد المشتق – معادلة مماس لمنحنى دالة في نقطة

لتكن f دالة قابلة للاشتقاق في نقطة a و (C_f) منحناها في معلم منظم

$(O; \vec{i}, \vec{j})$.



المستقيم $M(a; f(a))$ المار من النقطة

و الذي معامله الموجه هو $f'(a)$ يسمى المماس لمنحنى

M في النقطة (C_f)

خاصية: لتكن f دالة قابلة للاشتقاق في نقطة

معادلة المماس (Δ) لمنحنى (C_f) في النقطة $M(a; f(a))$ هي :

$$(\Delta) : y = f(a) + f'(a)(x - a)$$

مثال: نعتبر الدالة f المعرفة كالتالي :

1. باستعمال التعريف بين أن الدالة f قابلة للاشتقاق عند $x_0 = 2$.

2. حدد معادلة المماس لمنحنى الممثل للدالة f عند $x_0 = 2$.

الجواب: $f(2) = 2^2 - 2 \times 2 + 1 = 1$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 2x + 1 - 1}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 2x}{x - 2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x(x-2)}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} x = 2$$

وهو العدد المشتق عند $x_0 = 2 = f'(2)$

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) \quad (2)$$

$$y = 2x - 3 \Leftrightarrow y = 1 + 2(x - 2) \Leftrightarrow y = f(2) + f'(2)(x - 2)$$

II. الاشتقاق على اليمين – الاشتقاق على اليسار

مثال: نعتبر الدالة f المعرفة كالتالي :

$$f(x) = x^3 + |x|$$

1. أحسب $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$ (قابلية اشتقاق الدالة f على اليمين عند $x_0 = 0$)

2. أحسب $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$ (قابلية اشتقاق الدالة f على اليسار عند $x_0 = 0$)

V. الدالة المشتقه الثانية-المشتقات المتتالية
 مثال: تعتبر الدالة f المعرفة كالتالي: $f(x) = x^3 - 5x^2 + 4x - 2$
 أحسب المشتقه الأولى و الثانية و الثالثة
الجواب:

$$f'(x) = (x^3 - 5x^2 + 4x - 2)' = 3x^2 - 5 \times 2x^1 + 4 - 0 = 3x^2 - 10x + 4$$

$$f'''(x) = (6x - 10)' = 6 \quad \text{و} \quad f''(x) = (3x^2 - 10x + 4)' = 6x - 10$$

VI. تطبيقات الدالة المشتقه:
 1. رتابه دالة وإشارة مشتقاتها

خاصية: لكن f دالة عدديه قابلة للاشتقاق على مجال I

• f تزايديه على مجال I يعني $f'(x) \geq 0 \forall x \in I$

• f تناظريه على مجال I يعني $f'(x) \leq 0 \forall x \in I$

• f ثابتة على مجال I يعني $f'(x) = 0 \forall x \in I$

2. مطرار يف دالة قابلة للاشتقاق

خاصية 1: لكن f دالة قابلة للاشتقاق على مجال مفتوح I
 و a عنصرا من I

إذا كانت f دالة قابلة للاشتقاق في النقطة a وتقبل مطرا فا

في النقطة a فان $f'(a) = 0$

خاصية 2: لكن f دالة قابلة للاشتقاق على مجال مفتوح I و a عنصرا من I

إذا كانت f' تتعدم في النقطة a تتغير إشارتها

فإن $f(a)$ مطرا فا للدالة f

3. حل معادلة تفاضلية

تعريف: ليكن ω عددا حقيقيا غير منعدم.

المعادلة $y'' + \omega^2 y = 0$ ذات المجهول الدالة y حيث y'' مشتقها الثانية تسمى معادلة تفاضلية.

كل دالة f قابلة للاشتقاق مررتين على \mathbb{R}

وتحقق المتساوية: $f''(x) + \omega^2 f(x) = 0$ لكل x من \mathbb{R}
 تسمى حلا للمعادلة التفاضلية $y'' + \omega^2 y = 0$.

خاصية: ليكن ω عددا حقيقيا غير منعدم.

الحل العام للمعادلة التفاضلية $y'' + \omega^2 y = 0$ هو مجموعة

$y: x \rightarrow \alpha \cos \omega x + \beta \sin \omega x$ كما يلي: $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ و $\omega \in \mathbb{R}$

ملحوظة: حل المعادلة التفاضلية: $y'' + \omega^2 y = 0$

يعني تحديد الحل العام للمعادلة.

مثال: حل المعادلة التفاضلية التالية: $y'' + 16y = 0$

الجواب: $y'' + 4^2 y = 0 \Leftrightarrow y'' + 16y = 0$

ومنه الحل العام للمعادلة التفاضلية $y'' + 16y = 0$

هو مجموعة الدوال y المعرفة كما يلي: $y: x \rightarrow \alpha \cos 4x + \beta \sin 4x$

حيث $\beta \in \mathbb{R}$ و $\alpha \in \mathbb{R}$

IV. جدول للدوال المشتقه لدوال اعتيادية و العمليات حول الدوال المشتقه

الدالة	الدالة المشتقه
$f(x) = k$	$f'(x) = 0$
$f(x) = x$	$f'(x) = 1$
$f(x) = ax$	$f'(x) = a$
$f(x) = ax + b$	$f'(x) = a$
$f(x) = x^n$	$f'(x) = nx^{n-1} \quad n \in \mathbb{Z}^*$
$f(x) = \frac{1}{x}$	$f'(x) = -\frac{1}{x^2}$
$f(x) = \sqrt{x}$	$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$
$f(x) = \cos x$	$f'(x) = -\sin x$
$f(x) = \sin x$	$f'(x) = \cos x$
$f(x) = \cos(ax+b)$	$f'(x) = -a \sin(ax+b)$
$f(x) = \sin(ax+b)$	$f'(x) = a \cos(ax+b)$
$f(x) = \tan x$	$f'(x) = \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$

الدالة	الدالة المشتقه
$f(x) = \tan x$	$f'(x) = \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$
$f(x) = u + v$	$f'(x) = u' + v'$
$f(x) = u - v$	$f'(x) = u' - v'$
$f(x) = k.u$	$f'(x) = k.u'$
$f(x) = u \times v$	$f'(x) = u' \times v + u \times v'$
$f(x) = u^n$	$f'(x) = n u^n \times u'$
$f(x) = \frac{1}{u}$	$f'(x) = -\frac{u'}{u^2}$
$f(x) = \frac{u}{v}$	$f'(x) = \frac{u' \times v - u \times v'}{v^2}$
$f(x) = \sqrt{u}$	$f'(x) = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$