

$$(A \Leftrightarrow B) \Leftrightarrow (A \Rightarrow B \text{ et } B \Rightarrow A) \quad (4)$$

$$(A \text{ et } B) \Leftrightarrow (B \text{ et } A) \quad (5)$$

$$(A \text{ ou } B) \Leftrightarrow (B \text{ ou } A) \quad (6)$$

$$[(A \text{ et } B) \text{ et } C] \Leftrightarrow [A \text{ et } (B \text{ et } C)] \quad (7)$$

$$[A \text{ ou } (B \text{ ou } C)] \Leftrightarrow [(A \text{ ou } B) \text{ ou } C] \quad (8)$$

$$[A \Rightarrow B \text{ et } B \Rightarrow C] \Rightarrow (A \Rightarrow C) \quad (9)$$

قانون التكافؤات المتتالية

$$(A \Leftrightarrow B \text{ et } B \Leftrightarrow C) \Rightarrow A \Leftrightarrow C$$

$$[A \text{ et } (B \text{ ou } C)] \Leftrightarrow [(A \text{ et } B) \text{ ou } (A \text{ et } C)] \quad (11)$$

$$[A \text{ ou } (B \text{ et } C)] \Leftrightarrow [(A \text{ ou } B) \text{ et } (A \text{ ou } C)] \quad (12)$$

قانوني موركان.

$$7(A \text{ et } B) \Leftrightarrow (7A \text{ ou } 7B) \quad (*)$$

$$7(A \text{ ou } B) \Leftrightarrow (7A \text{ et } 7B) \quad (*)$$

قانون الاستلزم المضاد للعكس

$$(A \Rightarrow B) \Leftrightarrow (7B \Rightarrow 7A)$$

$$7(A \Rightarrow B) \Leftrightarrow (7A \text{ et } 7B) \quad (16)$$

قانون الخلف

$$((7A \Rightarrow 7B) \text{ et } B) \Rightarrow A$$

قانون فصل الحالات

$$(A \Rightarrow C \text{ et } B \Rightarrow C) \Rightarrow [(A \text{ ou } B) \Rightarrow C]$$

بعض الاستدلالات.

1 الاستدلال بالكافؤات المتتالية:

لكي نبين أن العبارة A صحيحة يكفي أن نبين أن $A \Leftrightarrow B$ و B صحيحة.

2 الاستدلال بالاستلزم المضاد للعكس:

لكي نبين أن $A \Rightarrow B$ يكفي أن نبين $7B \Rightarrow 7A$.

3 الاستدلال بالخلف:

لكي نبين أن العبارة A صحيحة نفترض العكس ونصل إلى تناقض مع المعطيات.

4 الاستدلال بفصل الحالات:

لتكن $E = E_1 \cup E_2$ لكي نبين أن $(\forall x \in E) : A(x)$ يكفي أن

نبين ما يلي: * إذا كان $x \in E_1$ فان $A(x)$ صحيحة.

* إذا كان $x \in E_2$ فان $A(x)$ صحيحة.

5 الاستدلال بالترجع:

لكي نبين أن العبارة $P_{(n)}$ صحيحة لكل عدد طبيعي $n \geq n_0$ نبين ما يلي:

* نبين أن العبارة صحيحة من أجل $n = n_0$

* نفترض العبارة P صحيحة من أجل n .

* نبين أن العبارة P صحيحة من أجل $n+1$.

I) العبارة - الدالة العبارية

1) نسمى عبارة كل جملة مفيدة ويمكن الحكم على المعنى الذي تحمله بالصحة أو الخطأ.

2) نسمى دالة عبارية كل نص يحتوي على متغير x من مجموعة E ويصبح عبارة كلما عوضنا x بعنصر محدد من E .

II) المكممات

لتكن $A(x)$ دالة عبارية معرفة على مجموعة E .

1) العبارة: $(\exists x \in E) : A(x)$ تقرأ " يوجد على الأقل x من E بحيث $A(x)$ " وتعني يوجد على الأقل عنصر x من E يحقق $A(x)$.

2) العبارة: $(\forall x \in E) : A(x)$ تقرأ " مهما كان x من E لدينا $A(x)$ " وتعني أن جميع عناصر E تحقق $A(x)$.

الرمز \forall يسمى المكمم الكوني.

III) العمليات المنطقية.

1 النفي

a) نفي العبارة A هي العبارة التي نرمز لها ب $\neg A$ والتي تكون صحيحة إذا كانت A خاطئة وتكون خاطئة إذا كانت A صحيحة.

ملاحظة: $\neg A$ هي عكس العبارة A .

b) نفي العبارة $"(\exists x \in E) : A(x)"$ هي العبارة $"(\forall x \in E) : \neg A(x)"$.

c) نفي العبارة $"(\forall x \in E) : A(x)"$ هي العبارة $"(\exists x \in E) : \neg A(x)"$.

2 العطف

عطف العبارتين A و B هي العبارة التي نرمز لها ب $(A \text{ et } B)$ والتي تكون صحيحة فقط إذا كانت A صحيحة و B صحيحة.

3 الفصل

فصل العبارتين A و B هي العبارة التي نرمز لها ب $(A \text{ ou } B)$ والتي تكون صحيحة إذا كانت إحدى العبارتين على الأقل صحيحة.

4 الاستلزم

استلزم العبارتين A و B هي العبارة التي نرمز لها ب $(A \Rightarrow B)$ والتي تكون خاطئة فقط إذا كانت A صحيحة و B خاطئة.

(ونقرأ A تستلزم B).

5 التكافي

تكافيء العبارتين A و B هي العبارة التي نرمز لها ب $(A \Leftrightarrow B)$ والتي تكون صحيحة فقط إذا كانت A و B نفس قيمة الحقيقة.

(ونقرأ A تكافئ B).

IV) القوانيين المنطقية.

1 تعريف:

نسمى قانوناً منطقياً كل عبارة مكونة من عدة عبارات مرتبطة بالروابط المنطقية وتكون صحيحة مهما كانت قيمة حقيقة هذه العبارات.

2 جرد لأهم القوانيين المنطقية.

$$(A \Rightarrow B) \Leftrightarrow (7A \text{ ou } B) \quad (2) \quad 7(7A) \Leftrightarrow A \quad (1)$$

$$(A \Leftrightarrow B) \Leftrightarrow (7A \Leftrightarrow 7B) \quad (3)$$