

اختبار المعارف : (5ن)

A/ حدد الإقتراحات الصحيحة و صحح الإقتراحات الخاطئة: (2ن)

- أ - يؤدي تفاعل كليوجينوجينيز إلى الرفع من تحلون الدم.  
ب - تستطيع العضلة تحرير الكليكوز في الدم انطلاق من الكليوجين المخزن فيها .  
ج - الأنسولين والكليكاكون هرمونان يفرزان من طرف الكبد على إثر تغيرات في تحلون الدم.  
د - يرتفع التركيز الدموي للكليكاكون في حالة فرط السكر الناتج عن تناول وجبة غنية بالسكريات.  
B/ أجب بواسطة جمل قصيرة على الأسئلة التالية: (2ن)


السؤال 1 : - ماهي القيمة العادية لتحلون الدم؟

السؤال 2: - متى يكون تفاعل كليوجينوليز أكثر اهمية . هل في حالة صيام أم بعد وجبة ؟

السؤال 3 : - ماهو تأثير الأنسولين على تحلون الدم ؟

السؤال 4 : - ماهو تأثير فرط السكر على إفراز الأنسولين ؟

C/ اعط الأسماء المناسبة لأرقام الشكل أسفله: (1ن)





الإستدلال العلمي و التواصل الكتابي والبياني (15ن)

A/ يعتبر الكليكوز المصدر الرئيسي لطاقة الخلايا. تركيزه الدموي لا يتغير كثيرا بحيث يبقى قريبا من قيمة 1g/l

- نخضع كلبا لحالة فرط السكر بإعطائه وجبة غنية بالسكريات. نلاحظ إن قيمة تحلون دمه ترتفع قليلا , ثم تعود إلى قيمتها العادية بعد ثلاث ساعات تقريبا.

لتفسير ذلك نقترح الفرضيتين التاليتين :

- فرضية 1: الفائض من الكليكوز يطرح في البول .
  - فرضية 2: الفائض من الكليكوز يخزن من طرف الجسم .
- للتحقق من هذه الفرضيات , نعلم على نتائج التجربتين الممثلتين في الوشقتين 1 و 2



تحلون الدم بعد ساعة من وجبة سكرية (9/2)	
على مستوى الوريد البابي	على مستوى الأوردة فوق كبدية
1,3	≈ 1

## الوثيقة 2


1/ باستغلال الوثيقتين 1 و 2 حدد الفرضية الصحيحة. (2 ن)

- نعرض الكبد لغسل بحيث أن سائل الغسل يدخل من الوريد البابي و يخرج من الوريد فوق كبدية . نلاحظ أن سائل الغسل الخارج من الكبد يحتوي على الكلوكوز , نواصل الغسل إلى أن يختفي الكلوكوز من سائل الغسل .
- نضع هذا الكبد في درجة حرارة 38°C لبضع ساعات , ثم نعيد عملية الغسل فنلاحظ أن سائل الغسل يحتوي من جديد على الكلوكوز .

2/ كيف تمكنك هذه التجربة من تدقيق جوابك على السؤال السابق؟ (2 ن)

B/ لدراسة مفعول بعض الهرمونات على تحلون الدم قام العالم Madison بالتقنية التالية:

- ربط الوريد البابي بالوريد أجوف سفلي , وبالتالي يدخل الدم إلى الكبد فقط عبر الشريان الكبدي ويخرج منه عبر الأوردة فوق كبدية. (أنظر تعرق الكبد في الوثيقة 2)
  - أخذ عينات دم من الشريان الكبدي والأوردة فوق كبدية قصد تحديد قيمة تحلون الدم على مستواها.
- تمت التجربة على كلب عادي قبل وبعد حقنه بالأنسولين . النتائج ممثلة في الوثيقة 3.



13/ باستغلال الوثيقة 3, ماهي المعلومات التي توصلت إليها بخصوص دور الأنسولين؟ (2ن)

ندرس الآن تأثير هرموني الأنسولين و الكليكاكون على كبد فران تم استئصالها وحقنها بسائل فيزيولوجي غير سكري. نضيف إلى هذا السائل أحد الهرمونين أو كلاهما .

قياس قيمة تحلون الدم في الدم الداخل إلى الكبد وفي الدم الخارج من الكبد من تتبع تغيرات الحصيلة الكبدية (الفرق بين كمية الكليكور الخارج من الكبد وكمية الكليكور التي تدخل إلى الكبد) النتائج ممثلة في الوثيقة 4.

تركيز الهرمونين		تغيرات الحصيلة الكبدية (ومن الكبد /min/mg)
الثلثكاون (mg)	الانسولين (U.A)	
0	0	0
0	0,03	0
0	0,30	0
0,03	0	+ 0,25
0,10	0	+ 0,36
0,10	0,03	+ 0,32
0,10	0,10	+ 0,28
0,10	0,30	+ 0,12
0,30	0	+ 0,51
0,30	0,03	+ 0,46

الورثيقة 4

4/ بالإعتماد على الوثيقة 4, حدد معلا جوابك, دور الكليكاكون. (2ن)

15/ باختيارك لتوليفتين من الهرمونين , ماهي الخلاصات التي توصلت إليها فيما يخص تأثير الهرمونين على الحصيلة الكبدية؟ (3ن)

16/ بالإعتماد على ماسبق و مكتسباتك , انجز خطاطين توضح بهما آليات تنظيم تحلون الدم . (4ن)