

6

تصحيح من طرف التلميذ : بنموسى محمد ثانوية : عمر بن عبد العزيز

سلسلة رقم

تمارين : الحساب المثلثي



الصفحة

.01

$$\text{نقطة 1: } \frac{\sin 3x}{\sin x} - \frac{\cos 3x}{\cos x}$$

$$\cdot \frac{\sin 3x}{\sin x} - \frac{\cos 3x}{\cos x} = \frac{\sin 3x \cos x - \cos 3x \sin x}{\sin x \cos x} = \frac{\sin(3x-x)}{\frac{1}{2} \sin 2x} = \frac{\sin 2x}{\frac{1}{2} \sin 2x} = 2 \quad \text{لدينا:}$$

$$\text{خلاصة: } \frac{\sin 3x}{\sin x} - \frac{\cos 3x}{\cos x} = 2$$

$$\text{نقطة 2: } \frac{\sin 2x + \sin 4x + \sin 6x}{1 + \cos 2x + \cos 4x} = 2 \sin 2x$$

لدينا:

$$\begin{aligned} \frac{\sin 2x + \sin 4x + \sin 6x}{1 + \cos 2x + \cos 4x} &= \frac{\sin 2x + \sin 6x + \sin 4x}{1 + \cos(2(2x)) + \cos 2x} = \frac{2 \sin\left(\frac{2x+6x}{2}\right) \cos\left(\frac{2x-6x}{2}\right) + \sin 4x}{1 + 2 \cos^2(2x) - 1 + \cos 2x} \\ &= \frac{2 \sin(4x) \cos(-2x) + \sin 4x}{2 \cos^2(2x) + \cos 2x} = \frac{\sin(4x) [2 \cos(-2x) + 1]}{\cos 2x [2 \cos(-2x) + 1]} = \frac{\sin(4x)}{\cos 2x} = \frac{2 \sin(2x) \cos(2x)}{\cos 2x} = 2 \sin(2x) \end{aligned}$$

$$\text{خلاصة: } \frac{\sin 2x + \sin 4x + \sin 6x}{1 + \cos 2x + \cos 4x} = 2 \sin 2x$$

.02

$$\text{نقطة 1: حل المعادلة } \cdot \cos\left(x + \frac{\pi}{6}\right) \cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$$

لدينا:

$$\begin{aligned} \cos\left(x + \frac{\pi}{6}\right) \cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2} &\Leftrightarrow \frac{1}{2} \left[\cos\left(\left(x + \frac{\pi}{6}\right) - \left(x - \frac{\pi}{6}\right)\right) + \cos\left(\left(x + \frac{\pi}{6}\right) - \left(x - \frac{\pi}{6}\right)\right) \right] = \frac{1}{2} \\ &\Leftrightarrow \frac{1}{2} \left[\cos(2x) + \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) \right] = \frac{1}{2} \\ &\Leftrightarrow \cos(2x) = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \cos(2x) = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi \\ 2x = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi \end{cases}; \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{6} + k\pi \\ x = -\frac{\pi}{6} + k\pi \end{cases}; \quad k \in \mathbb{Z}$$

6

تصحيح من طرف التلميذ : بنموسى محمد ثانوية : عمر بن عبد العزيز

سلسلة رقم

تمارين : الحساب المثلثي



الصفحة

خلاصة : مجموعة حلول المعادلة هي : $S = \left\{ x = \frac{\pi}{6} + k\pi, x = \frac{\pi}{6} - k\pi / k \in \mathbb{Z} \right\}$

.03

. 1 أوجد قيمة $\sin 2\alpha$ ثم استنتج قيمة α .

$$\sin 2\alpha = 2\sin \alpha \cos \alpha = 2 \times \frac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{2}} \times \frac{\sqrt{3}+1}{2\sqrt{2}} = \frac{3-1}{4} = \frac{1}{2}$$

لدينا : $\sin 2\alpha = \frac{1}{2}$

خلاصة : $\sin 2\alpha = \frac{1}{2}$

نستنتج قيمة α :

$$\therefore \sin 2\alpha = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \sin 2\alpha = \sin \frac{\pi}{6} \Leftrightarrow \begin{cases} 2\alpha = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \\ 2\alpha = \pi - \frac{\pi}{6} + 2k\pi \end{cases}; k \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = \frac{\pi}{12} + k\pi \\ \alpha = \frac{5\pi}{12} + k\pi \end{cases}$$

لدينا : $\alpha = \frac{\pi}{12} + k\pi$

$$\alpha = \frac{\pi}{12} \text{ إذن : } \alpha \in \left[0, \frac{\pi}{4} \right] \text{ و } \begin{cases} \alpha = \frac{\pi}{12} + k\pi \\ \alpha = \frac{5\pi}{12} + k\pi \end{cases}$$

لدينا : $\alpha = \frac{5\pi}{12} + k\pi$

خلاصة : $\alpha = \frac{\pi}{12}$

. 2 حل المعادلة : $(\sqrt{3}+1)\cos x + (\sqrt{3}-1)\sin x = 0$

لدينا :

$$(\sqrt{3}+1)\cos x + (\sqrt{3}-1)\sin x = 0 \Leftrightarrow 2\sqrt{2} \left[\frac{\sqrt{3}+1}{2\sqrt{2}} \cos x + \frac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{2}} \sin x \right] = 0$$

$$\Leftrightarrow 2\sqrt{2} \left[\cos \frac{\pi}{12} \cos x + \sin \frac{\pi}{12} \sin x \right] = 0$$

$$\Leftrightarrow 2\sqrt{2} \cos \left(x - \frac{\pi}{12} \right) = 0$$

$$\Leftrightarrow 2\sqrt{2} \cos \left(x - \frac{\pi}{12} \right) = 0$$

$$\Leftrightarrow \cos \left(x - \frac{\pi}{12} \right) = \cos \frac{\pi}{2}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x - \frac{\pi}{12} = \frac{\pi}{2} + 2k\pi \\ x - \frac{\pi}{12} = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi \end{cases}; k \in \mathbb{Z}$$

6

تصحيح من طرف التلميذ : بنموسى محمد ثانوية : عمر بن عبد العزيز

سلسلة رقم

تمارين : الحساب المثلثي



الصفحة

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{12} + 2k\pi \\ x = -\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{12} + 2k\pi \end{cases}; k \in \mathbb{Z}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{7\pi}{12} + 2k\pi \\ x = -\frac{5\pi}{12} + 2k\pi \end{cases}; k \in \mathbb{Z}$$

الحلول التي تنتهي ل $[0, 2\pi]$

. $x = \frac{7\pi}{12} + 2k\pi$ نضع $0 \leq x \leq 2\pi$ مع $k \in \mathbb{Z}$ نحصل بعد الحسابات 0 أما $k = 0$

. $x = \frac{19\pi}{12} + 2k\pi$ نضع $0 \leq x \leq 2\pi$ مع $k \in \mathbb{Z}$ نحصل بعد الحسابات 1 أما $k = 1$

خلاصة : مجموعة حلول المعادلة هي $\left\{ \frac{7\pi}{12}, \frac{19\pi}{12} \right\}$

.04

. 1. حدد D_f مجموعة تعريف الدالة f .

لدينا : الدالتين : $x \mapsto \sin x$ و $x \mapsto \cos x$ معرفتين على \mathbb{R} . إذن الدالة f معرفة على \mathbb{R} (مجموع وجاء دوال معرفة على \mathbb{R}).

خلاصة : مجموعة تعريف الدالة f هي $D_f = \mathbb{R}$

. 2. بين أن : f دورية ودورها $T = \pi$. ثم استنتج D_E مجموعة دراسة f .

- لدينا : لكل x من \mathbb{R} كذلك $x + \pi \in \mathbb{R}$ و $x \in \mathbb{R}$.

- ليكن x من \mathbb{R} .

- لدينا :

$$\begin{aligned} f(x + \pi) &= 4 \cos^2(x + \pi) + \sqrt{3} \sin(x + \pi) \cos(x + \pi) + 3 \sin^2(x + \pi) - 4 \\ &= 4(-\cos x)^2 + \sqrt{3}(-\sin x)(-\cos x) + 3(-\sin x)^2 - 4 \\ &= 4 \cos^2(x) + \sqrt{3} \sin x \cos x + 3 \sin^2(x) - 4 \\ &= f(x) \end{aligned}$$

ومنه : $f(x + \pi) = f(x)$

خلاصة : f دورية ودورها $T = \pi$

استنتاج : D_E مجموعة دراسة f .

بما أن : f دورية ودورها π إذن :

خلاصة : مجموعة دراس f هي $[0, \pi]$

. 3. نبين أن : $\forall x \in \mathbb{R} : f(x) = 2 \sin x \cos\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$

لدينا :

6

تصحيح من طرف التلميذ : بنموسى محمد ثانوية : عمر بن عبد العزيز

سلسلة رقم

تمارين : الحساب المثلثي



الصفحة

$$\begin{aligned}
 f(x) &= 4\cos^2(x) + \sqrt{3}\sin x \cos x + 3\sin^2(x) - 4 \Leftrightarrow f(x) = \underbrace{4\cos^2(x) + 4\sin^2(x)}_4 - \sin^2(x) + \sqrt{3}\sin x \cos x - 4 \\
 &\Leftrightarrow f(x) = 4 - \sin^2(x) + \sqrt{3}\sin x \cos x - 4 \\
 &\Leftrightarrow f(x) = \sin x \left[-\sin x + \sqrt{3}\cos x \right] \\
 &\Leftrightarrow f(x) = 2\sin x \left[-\frac{1}{2}\sin x + \frac{\sqrt{3}}{2}\cos x \right] \\
 &\Leftrightarrow f(x) = 2\sin x \left[-\sin \frac{\pi}{6} \sin x + \cos \frac{\pi}{6} \cos x \right] \\
 &\Leftrightarrow f(x) = 2\sin x \cos \left(x + \frac{\pi}{6} \right)
 \end{aligned}$$

ومنه : $f(x) = 2\sin x \cos \left(x + \frac{\pi}{6} \right)$ خلاصة : $f(x) = 2\sin x \cos \left(x + \frac{\pi}{6} \right)$ بـ حل المعادلة : $x \in \mathbb{R}$: $f(x) = 0$ ومثل حلولها على الدائرة المثلثية .

$$\begin{aligned}
 f(x) = 0 &\Leftrightarrow 2\sin x \cos \left(x + \frac{\pi}{6} \right) = 0 \quad \text{لدينا :} \\
 &\Leftrightarrow \sin x = 0 \quad \text{أو} \quad \cos \left(x + \frac{\pi}{6} \right) = 0
 \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow \sin x = \sin 0 \quad \text{أو} \quad \cos \left(x + \frac{\pi}{6} \right) = \cos \frac{\pi}{2}$$

$$\Leftrightarrow x = k\pi ; k \in \mathbb{Z} \quad \text{أو} \quad x + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2} + k\pi ; k \in \mathbb{Z}$$

$$\Leftrightarrow x = k\pi ; k \in \mathbb{Z} \quad \text{أو} \quad x + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2} + k\pi ; k \in \mathbb{Z}$$


$$\Leftrightarrow x = k\pi ; k \in \mathbb{Z} \quad \text{أو} \quad x = \frac{\pi}{3} + k\pi ; k \in \mathbb{Z}$$

خلاصة : مجموعة حلول المعادلة هي : $S = \left\{ x = k\pi , x = \frac{\pi}{3} + k\pi / k \in \mathbb{Z} \right\}$

نمثل الحلول على الدائرة المثلثية :

تـ حل المتراجحة : $x \in [0, \pi[: f(x) \leq 0$ حل المتراجحة : $x \in [0, \pi[: f(x) \leq 0$ 4

$$x \in [0, \pi[: f(x) \leq 0 \Leftrightarrow 2\sin x \cos \left(x + \frac{\pi}{6} \right) \leq 0 \quad \text{لدينا : } 0$$

بالنسبة ل $\sin x$ على المجال $[0, \pi[$ وتنعدم في $x = 0$: $\sin x > 0$ 

6

تصحيح من طرف التلميذ : بنموسى محمد ثانوية : عمر بن عبد العزيز

سلسلة رقم

تمارين : الحساب المثلثي



الصفحة

$$\cos\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$$

بالنسبة ل

$$x \in [0, \pi] \Leftrightarrow 0 \leq x < \pi \Leftrightarrow \frac{\pi}{6} \leq x + \frac{\pi}{6} < \frac{7\pi}{6}$$

لدينا :

$$\cos\left(x + \frac{\pi}{6}\right) > 0 \text{ : فإن } 0 \leq x < \frac{\pi}{3} \text{ أي } \frac{\pi}{6} \leq x + \frac{\pi}{6} < \frac{\pi}{2}$$

ومنه :

$$\cos\left(x + \frac{\pi}{6}\right) = 0 \text{ : فإن } x = \frac{\pi}{3} \text{ أي } x + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2}$$

$$\cos\left(x + \frac{\pi}{6}\right) < 0 \text{ : فإن } \frac{\pi}{3} < x < \pi \text{ أي } \frac{\pi}{2} < x + \frac{\pi}{6} < \frac{7\pi}{6}$$

نعتبر جدول الإشارة التالي :

| x | 0 | $\frac{\pi}{3}$ | π |
|---|---|-----------------|-------|
| $\sin x$ | + | | + |
| $\cos\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$ | + | ○ | - |
| $f(x) = 2\sin x \cos\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$ | + | ○ | - |

خلاصة : من خلال الجدول نستنتج أن مجموعة حلول المتراجحة :

.5

$$\forall x \in \mathbb{R} : f(x) = \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right) - \frac{1}{2}$$

أ- بين أن :

لدينا :

$$\begin{aligned}
 f(x) &= 2\sin x \cos\left(x + \frac{\pi}{6}\right) \\
 &= 2\sin x \left[\cos x \cos \frac{\pi}{6} - \sin x \sin \frac{\pi}{6} \right] \\
 &= \frac{\sqrt{3}}{2} \sin x \cos x - \sin^2 x \\
 &= \frac{\sqrt{3}}{2} \sin 2x + \frac{\cos 2x - 1}{2} ; \quad (\cos 2x = 1 - 2\sin^2 x) \\
 &= \frac{\sqrt{3}}{2} \sin 2x + \frac{1}{2} \cos 2x - \frac{1}{2} \\
 &= \cos \frac{\pi}{6} \sin 2x + \sin \frac{\pi}{6} \cos 2x - \frac{1}{2} \\
 &= \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right) - \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

خلاصة : $f(x) = \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right) - \frac{1}{2}$

6

تصحيح من طرف التلميذ : بنموسى محمد ثانوية: عمر بن عبد العزيز

سلسلة رقم

تمارين : الحساب المثلثي



الصفحة

بـ أحسب $\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)$ و $\sin\left(\frac{\pi}{12}\right)$ ثم استنتج قيمتي $f\left(\frac{\pi}{12}\right)$

$$(1) : f\left(\frac{\pi}{12}\right) = \sin\left(2 \times \frac{\pi}{12} + \frac{\pi}{6}\right) - \frac{1}{2} = \sin\frac{\pi}{3} - \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{3}-1}{2}$$

$$(2) : f\left(\frac{\pi}{12}\right) = 2 \sin\frac{\pi}{12} \cos\left(\frac{\pi}{12} + \frac{\pi}{6}\right) = 2 \sin\frac{\pi}{12} \cos\frac{\pi}{4} = \sqrt{2} \sin\frac{\pi}{12}$$

من خلال (1) و (2) نحصل على : $\sin\frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$

من جهة أخرى : $\cos^2\left(\frac{\pi}{12}\right) = 1 - \sin^2\frac{\pi}{12} = 1 - \left[\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}\right]^2 = \frac{2+\sqrt{3}}{4}$

($\cos\left(\frac{\pi}{12}\right) \geq 0$ إذن $\frac{\pi}{12} \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ لأن) $\cos\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{2+\sqrt{3}}}{2}$ ومنه :

خلاصة : $\cos\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{2+\sqrt{3}}}{2}$ و $\sin\frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$

.05

.**1** بين أن : إذا كانت A و B و C قياسات زوايا مثلث فإن $\tan A + \tan B + \tan C = \tan A \times \tan B \times \tan C$

لدينا : ABC مثلث إذن : مجموع قياسات زواياه هي π

$$\text{و منه : } A + B + C = \pi \text{ : } A + B = \pi - C \text{ : } \text{وبالتالي :}$$

$$\tan(A + B) = \tan(\pi - C) \Leftrightarrow \frac{\tan(A) + \tan(B)}{1 - \tan(A)\tan(B)} = -\tan(C); (\tan(\pi - C) = -\tan(C))$$

$$\Leftrightarrow \tan(A) + \tan(B) = -\tan(C)[1 - \tan(A)\tan(B)]$$

$$\Leftrightarrow \tan(A) + \tan(B) = -\tan(C) + \tan(A)\tan(B)\tan(C)$$

$$\Leftrightarrow \tan(A) + \tan(B) + \tan(C) = \tan(A)\tan(B)\tan(C)$$

و منه : $\tan(A) + \tan(B) + \tan(C) = \tan(A)\tan(B)\tan(C)$

خلاصة : $\tan(A) + \tan(B) + \tan(C) = \tan(A)\tan(B)\tan(C)$

تصحيح من طرف التلميذ : بنموسى محمد ثانوية: عمر بن عبد العزيز المستوى: **I** علوم رياضية