

~ الأولى علوم رياضية ~

سلسلة دراسة الدوال

التمرين 1

I. نعتبر الدالتين العدديتين f و g المعرفتين بما يلي : $g(x) = \frac{x-1}{x+1}$ و $f(x) = -x^2 + x$

- (1) ضع جدول تغيرات كل من f و g
- (2) حدد أفاصيل نقط تقاطع المنحني (C_f) و (C_g)
- (3) أنشئ في نفس المعلم المنحنين (C_f) و (C_g)
- (4) حل مبانيها في \mathbb{R} المتراجحة : $f(x) \geq g(x)$

II. نعتبر الدالة العددية h المعرفة بما يلي : $h(x) = \frac{1}{x+1} \sqrt{x^2 - 1}$

- (1) حدد D_h ، ثم أدرس إشارة $h(x)$ على كل مجال ضمن D_h
- (2) بين أن : $(\forall x \in D_h) [h(x)]^2 = g(x)$ ، ثم استنتج رتبة h على كل مجال ضمن D_h
- (3) بين أن : $h([1, +\infty[) \subset [0, 1[$
- (4) ليكن φ قصور الدالة h على المجال $[1, +\infty[$
بين أن φ تقابل من I نحو J ينبغي تحديده وأحسب $\varphi^{-1}(x)$ لكل x من J

التمرين 2

نعتبر f و g و h الدوال العددية للمتغير الحقيقي x المعرفة بما يلي :

$$h(x) = \sqrt{f(x)} \quad g(x) = \frac{\sqrt{x-2x}}{x\sqrt{x}} \quad f(x) = \left(\frac{x-1}{x+1}\right)^2$$

(1) حدد D_h و D_g و D_f

(2) أدرس تغيرات f على كل من المجالات $[1, +\infty[$ و $[1, 1]$ و $[-1, -1]$ (باستعمال مركب دالتين)

(3) أدرس تغيرات h على D_h

(4) أنشئ (C_h) منحنى الدالة h

(5) ليكن φ قصور الدالة h على $[1, +\infty[$

أ. حدد $\varphi([1, +\infty[)$

ب. بين أن φ تقابل من $[0, 1[$ نحو $[1, +\infty[$ و حدد تقابله العكسي

(6) ليكن m قصور الدالة g على $]0, +\infty[$

أ. بين أن $m(x) = p\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)$ حيث p دالة يتم تحديدها

ب. حل المعادلة $\frac{1}{\sqrt{x}} = 1$

ج. حدد تغيرات الدالة m على $[0, +\infty]$

つづく