


المتجهات في الفضاء

(I)-تساوي متجهتين - جمع المتجهات 1- عناصر متجهة

A و B نقطتين مختلفتين من الفضاء، إذا رمزاً للمتجهة \overrightarrow{AB} بالرمز \vec{u} فان :

- اتجاه \vec{u} هو اتجاه المستقيم (AB)
- منحى \vec{u} هو المنحى من A إلى B
- منظم \vec{u} هي المسافة AB و نكتب: $AB = \|\vec{u}\|$


ملاحظة: لكل نقطة A من الفضاء المتجهة \overrightarrow{AA} ليس لها اتجاه و منظمها منعدم، $\overrightarrow{AA} = \vec{0}$ تسمى المتجهة المنعدمة و نكتب



تكون متجهتان متساويتان اذا كان لهما نفس الاتجاه و نفس المنحى و نفس المنظم

2-تساوي متجهتين تعريف


لكل متجهة \vec{u} من الفضاء ولكل نقطة A في الفضاء $\vec{u} = \overrightarrow{AM}$ حيث M توجد نقطة وحيدة



رباعياً في الفضاء $ABCD$ متوازي الأضلاع إذا وفقط إذا كان $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$


خاصية

لتكن A و B و C و D أربع نقاط من الفضاء
إذا وفقط إذا كان $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BD}$ (تبديل الوسطين)
إذا وفقط إذا كان $\overrightarrow{DB} = \overrightarrow{CA}$ (تبديل الطرفين) $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$



3-مجموع متجهتين - علاقة شال

أ- \vec{u} و \vec{v} متجهتان في الفضاء
لتكن A نقطة من الفضاء،
توجد نقطة وحيدة B حيث $\overrightarrow{AB} = \vec{u}$.
توجد نقطة وحيدة C حيث $\overrightarrow{BC} = \vec{v}$.
النقطتان A و C تحددان متجهة
وحيدة $\vec{w} = \overrightarrow{AC}$



المتجهة \vec{w} هي مجموع المتجهتين \vec{u} و \vec{v}

نكتب $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$ $\vec{w} = \vec{u} + \vec{v}$


ب- علاقة شال

مهما كانت النقط A و B و C من الفضاء
 $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$

نتيجة

لتكن O و N و M و R أربع نقاط من الفضاء
إذا وفقط إذا كان $\overrightarrow{OM} + \overrightarrow{ON} = \overrightarrow{OR}$

ملاحظة: إذا كانت $\vec{u} = \overrightarrow{OM}$ و $\vec{v} = \overrightarrow{ON}$ فان $\vec{u} + \vec{v} = \overrightarrow{OR}$
حيث $\vec{u} + \vec{v} = \overrightarrow{OR}$ متوازي الأضلاع



ج- خصائص

- *- لكل متوجهين \vec{u} و \vec{v} $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$
- لكل ثلاث متوجهات \vec{u} و \vec{v} و \vec{w} $(\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w} = \vec{u} + (\vec{v} + \vec{w})$
- لكل متوجهة \vec{u} $\vec{u} + \vec{0} = \vec{0} + \vec{u} = \vec{u}$

مقابل متوجهة - فرق متوجهين
أ- مقابل متوجهة

لتكن \vec{u} متوجهة غير منعدمة في الفضاء مقابل المتوجهة \vec{u} هي المتوجهة التي لها نفس الاتجاه و نفس المنظم و منحها مضاد لمنحي المتوجهة \vec{u} نرمز لها بالرمز $\vec{-u}$


$$\vec{u} + (-\vec{u}) = (-\vec{u}) + \vec{u} = \vec{0} \quad : \quad \text{لكل متوجهة } \vec{u}$$

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{AA} = \vec{0} \quad * \quad \text{لكل نقطتين } A \text{ و } B \text{ من المستوى لدينا } \vec{AB} = -\overrightarrow{BA}$$

$$\overrightarrow{AB} = -\overrightarrow{BA} \quad \text{المتجهتان } \overrightarrow{AB} \text{ و } \overrightarrow{BA} \text{ متقابلان}$$

ب- فرق متوجهين
تعريف

$$\vec{u} - \vec{v} = \vec{u} + (-\vec{v}) \quad \text{لكل متوجهين } \vec{u} \text{ و } \vec{v}$$



$$\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} \quad \text{لكل ثلاث نقاط } A \text{ و } B \text{ و } C$$

ملاحظة

أمثلة

مكعب $ABCDEFGH$

$$\overrightarrow{ED} + \overrightarrow{EF} = \overrightarrow{EC} \quad \overrightarrow{BC} = -\overrightarrow{HE} \quad \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{HG}$$

4- منتصف قطعة

$$(\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0}) \quad \overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB} \quad [AB] \text{ منتصف } I \text{ إذا وفقط إذا كان }$$

II) الاستقامية- التعريف المتوجهي للمستقيم**1- ضرب متوجهة في عدد حقيقي****تعريف**


متوجهة غير منعدمة و k عدد حقيقي غير منعدم
جداً المتوجهة \vec{u} في العدد الحقيقي k هي المتوجهة $k\vec{u}$ حيث :

* \vec{u} و $k\vec{u}$ لهما نفس الاتجاه


$$\|k\vec{u}\| = |k| \times \|\vec{u}\| *$$

منحي \vec{u} إذا كان $k > 0$ * منحي $k\vec{u}$ هو

عكس منحي \vec{u} إذا كان $k < 0$



$$k < 0$$



$$k > 0$$

* لكل متوجهة \vec{u} ولكل عدد حقيقي k $k \cdot \vec{0} = \vec{0}$ و $0 \cdot \vec{u} = \vec{0}$:

2 - خصائص

مهما تكن المتجهتان \vec{u} و \vec{v} و مهما يكن العددان الحقيقيان α و β فان

$$(\alpha + \beta)\vec{u} = \alpha\vec{u} + \beta\vec{v}$$

$$\alpha(\vec{u} + \vec{v}) = \alpha\vec{u} + \alpha\vec{v}$$

$$(\alpha\beta)\vec{u} = \alpha(\beta\vec{u})$$

$$1 \cdot \vec{u} = \vec{u}$$


$$\vec{u} = \vec{0} \text{ إذا وفقط إذا كان } \alpha = 0 \quad \alpha\vec{u} = \vec{0}$$

3- الاستقامية

استقامة متوجهين

أ- تعريف

تكون متوجهان \vec{u} و \vec{v} مستقيميتين إذا و فقط كانت احداهما جداء الآخر في عدد حقيقي



ملاحظة

$\vec{0}$ مستقيمية مع أيه متوجهة

استقامة ثلاث نقط

تعريف

لتكن A و B و C نقاطا من الفضاء حيث $A \neq B$

تكون النقط A و B و C مستقيمية إذا وجد عدد حقيقي α حيث $\overrightarrow{AC} = \alpha \overrightarrow{AB}$

توازي مستقيمين

لتكن A و B و C و D نقاطا من الفضاء حيث $A \neq B$ و $C \neq D$

إذا و فقط إذا كان $\overrightarrow{AB} \parallel \overrightarrow{CD}$ مستقيميدين

التعريف المتوجهي لمستقيم في الفضاء

تعريف

لتكن A و B نقطتين مختلفتين من الفضاء

كل متوجهة \vec{u} غير منعدمة و مستقيمية مع المتوجهة \overrightarrow{AB}

تسمى متوجهة موجهة لمستقيم (AB)

خاصية

لتكن A نقطة من الفضاء و \vec{u} متوجهة غير منعدمة

مجموعه النقط M من الفضاء حيث $\overrightarrow{AM} = \alpha \vec{u}$ و $\alpha \in \mathbb{R}$

هي المستقيم المار من A و الموجه بـ \vec{u} . نرمز له بالرمز $D(A; \vec{u})$

$$D(A; \vec{u}) = \{M \in (E) / \overrightarrow{AM} = \alpha \vec{u} ; \alpha \in \mathbb{R}\}$$


تمرين

ليكن $\overrightarrow{AD} = \vec{i}$ $\overrightarrow{AB} = \vec{j}$ $\overrightarrow{AH} = \vec{k}$ مكعبا نضع $ABCDEFGH$

و $[HG] = \vec{i} + 2\vec{j} + 2\vec{k}$. نعتبر I منتصف $[HG]$

1- بين أن \vec{u} موجهة لمستقيم (AI)

2- ليكن المستقيم (Δ) المار من G و الموازي لمستقيم (AI) و M نقطة من الفضاء حيث



$$M \in (\Delta) \text{ . بين أن } \overrightarrow{BM} = \frac{1}{2} \overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{BG}$$

الجواب

1- نبين أن \vec{u} موجهة لمستقيم (AI)

أي نبين أن \overrightarrow{AI} و \vec{u} مستقيميدين

$$\overrightarrow{HI} = \frac{1}{2} \overrightarrow{HG} \text{ ومنه } [HG] \text{ منتصف } I \text{ لدينا}$$

$$\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{AE} + \overrightarrow{EH} + \overrightarrow{HI} = \overrightarrow{AE} + \overrightarrow{EH} + \frac{1}{2} \overrightarrow{HG}$$

بما أن $\overrightarrow{HG} = \overrightarrow{AB} = \vec{i}$ و $\overrightarrow{EH} = \overrightarrow{AD} = \vec{j}$ فان $\overrightarrow{AI} = \vec{k} + \vec{j} + \frac{1}{2} \vec{i} = \frac{1}{2}(\vec{i} + 2\vec{j} + 2\vec{k}) = \frac{1}{2} \vec{u}$

$$\text{و منه } \overrightarrow{AI} = \vec{k} + \vec{j} + \frac{1}{2} \vec{i} = \frac{1}{2}(\vec{i} + 2\vec{j} + 2\vec{k}) = \frac{1}{2} \vec{u}$$

إذن \overrightarrow{AI} و \vec{u} مستقيمييان و منه \vec{u} موجهة لمستقيم (AI)

2- نبين أن $M \in (\Delta)$

لدينا (Δ) المار من G و الموازي لمستقيم (AI) أي $(\Delta) = D(G; \vec{u})$

$$\overrightarrow{GM} = \overrightarrow{GF} + \overrightarrow{FB} + \overrightarrow{BM} = \overrightarrow{GF} + \overrightarrow{FB} + \frac{1}{2} \overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{BG} = \overrightarrow{GF} + \overrightarrow{FB} + \frac{1}{2} \overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{BC} + 2\overrightarrow{CG}$$


بما أن $ABCDEF$ مكعب فان $\overrightarrow{GF} = -\overrightarrow{AD} = -\vec{j}$ و $\overrightarrow{FB} = -\overrightarrow{AE} = -\vec{k}$ و $\overrightarrow{GF} = -\overrightarrow{AD} = -\vec{j}$

$$\overrightarrow{GM} = -\vec{j} - \vec{k} + \frac{1}{2}\vec{i} + 2\vec{j} + 2\vec{k} = \frac{1}{2}\vec{i} + \vec{j} + \vec{k} = \frac{1}{2}(\vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k}) = \frac{1}{2}\vec{u}$$

و بالتالي $M \in D(G; \vec{u})$ إذن $M \in D(G; \vec{u})$

(III) الاستوائية- التعريف المتجهي للمستوى

1- تعريف



ليكن (P) مستوى من الفضاء و A و B و C نقط غير مستقيمية من المستوى (P) نقول إن (P) هو المستوى المار من A و الموجه بالمتجهتين \overrightarrow{AC} و \overrightarrow{AB}

نتيجة

متجهتان \vec{u} و \vec{v} غير مستقيمييتين و نقطة من الفضاء تحدد مستوى وحيدا (P) هو المستوى المار من النقطة A و الموجه بالمتجهتين \vec{u} و \vec{v} نرمز له بالرمز $P(A; \vec{u}, \vec{v})$.

خاصية

لتكن \vec{u} و \vec{v} متجهتين غير مستقيمييتين و A نقطة من الفضاء. مجموعة النقط M من الفضاء حيث $\overrightarrow{AM} = x\vec{u} + y\vec{v}$ و $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ هي المستوى (P) المار من A و الموجه بالمتجهتين \vec{u} و \vec{v} و نكتب $(P) = P(A; \vec{u}, \vec{v})$

2- الاستوائية تعريف

لتكن \vec{u} و \vec{v} و \vec{w} ثلاث متجهات في الفضاء نقول إن المتجهات \vec{u} و \vec{v} و \vec{w} مستوائية اذا وفقط وجدت أربع نقاط مستوائية A و B و C و D حيث $\overrightarrow{AB} = \vec{u}$ و $\overrightarrow{AD} = \vec{w}$ و $\overrightarrow{AC} = \vec{v}$

أمثلة

لتكن $ABCDEF$ متوازي المستطيلات B و \overrightarrow{BH} و \overrightarrow{BC} و \overrightarrow{BE} مستوائية لأن النقط B و C و E و H مستوائية $[(BC) \parallel (EH)]$ و B و D و F و G مستوائيات $[(BD) \parallel (FG)]$ و B و D و H و E و B و E و H و D مستوائيات $[(BD) \parallel (EH)]$ و B و D و E و H و B و E و H و D غير مستوائيات لأن $BDEH$ رباعي الأوجه

خاصية

لتكن \vec{u} و \vec{v} متجهتين غير مستقيمييتين و \vec{w} متجهة في الفضاء المتجهات \vec{u} و \vec{v} و \vec{w} مستوائية إذا وفقط إذا وجد عددين حقيقيين x و y حيث $\vec{w} = x\vec{u} + y\vec{v}$

نتيجة

إذا وجد عددين حقيقيين x و y فان $\overrightarrow{AM} = x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AC}$ حيث M و C و B و A و M مستوائية

تمرين


هرم قاعدته المستطيل $EABCD$ ، I و J منتصفان $[AE]$ و $[BC]$ على التوالي.

بين أن المتجهات \overrightarrow{IJ} و \overrightarrow{AB} و \overrightarrow{EC} مستوائية

الحل

$$\overrightarrow{IJ} = \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BJ}$$

و حيث I و J منتصفان $[AE]$ و $[BC]$ فان :



$$\overrightarrow{BJ} = \frac{1}{2} \overrightarrow{BC} \text{ و } \overrightarrow{IA} = \frac{1}{2} \overrightarrow{EA}$$

و بالتالي $\overrightarrow{IJ} = \frac{1}{2} \overrightarrow{EA} + \overrightarrow{AB} + \frac{1}{2} \overrightarrow{BC}$

$$\text{ومنه } \overrightarrow{IJ} = \frac{1}{2} \overrightarrow{EC} + \frac{1}{2} \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB} + \frac{1}{2} \overrightarrow{BC}$$

$$\overrightarrow{IJ} = \frac{1}{2} \overrightarrow{EC} + \overrightarrow{AB} + \frac{1}{2} \overrightarrow{BA}$$

$$\text{ومنه } \overrightarrow{IJ} = \frac{1}{2} \overrightarrow{EC} + \frac{1}{2} \overrightarrow{AB}$$

إذن \overrightarrow{EC} و \overrightarrow{AB} و \overrightarrow{IJ} مستوائية