

Exercise 1

تمرين 1

بداية وبملاحظة أن 1 حل للمعادلة $x^3 - 3x^2 + (a+2)x - a = 0$ نستنتج أن الحدودية $x^3 - 3x^2 + (a+2)x - a = 0$ تقبل القسمة على $x-1$ ، بعد إجراء القسمة الأقلية نجد: $P(x) = (x-1)(x^2 - 2x + a)$

حسب المعطيات المعادلة $x^2 - 2x + a = 0$ ستقبل حلين r و s حيث $\{r, s\} \subset \{x_1, x_2, x_3\}$ و $r < s$


و نعلم أن: $r+s=2$ إذن $2r < r+s < 2s$ منه $r < 1 < s$

بال التالي: $x_3 = s$ و $x_2 = 1$ و $x_1 = r$

الآن نجيب عن السؤال: $4x_1 - x_1^2 + x_3^2 = 4r - r^2 + s^2 = 4r + (s+r)(s-r) = 4r + 2(s-r) = 2r + 2s = 4$

Exercise 2

تمرين 2



لدينا $CAB = BCP = CBP$ (عند وجود مماس يكمن هناك أيضاً زاوية محاطية تحصر قوساً) وبما أن $(CB) // (CP)$ و $(AB) // (CP)$ (قاطع لهما فإن: $CBA = BCP$)

منه: $CBP = CBA$ ، إذن المثلثان ABC و PCB متتشابهان

$$\boxed{BC = \sqrt{12}} \quad \text{منه: } BC^2 = 12 \quad \text{بالتالي: } \frac{4}{BC} = \frac{BC}{3} \quad \text{منه: } \frac{BP}{BC} = \frac{BC}{AB}$$

للمزيد عن الزوايا المحاطية تصفح الرابط: <http://goo.gl/qKYKIU>
 وللمثلث المتشابهة الرابط: <http://goo.gl/F7s8Ck>

Exercise 3

تمرين 3

$$\begin{aligned} |(a-b)(b-c)(c-d)(d-a)| \leq \frac{abcd}{4} &\Leftrightarrow \left| \left(\frac{a-b}{\sqrt{ab}} \right) \left(\frac{b-c}{\sqrt{bc}} \right) \left(\frac{c-d}{\sqrt{cd}} \right) \left(\frac{d-a}{\sqrt{ad}} \right) \right| \leq \frac{1}{4} \\ &\Leftrightarrow \left| \left(\sqrt{\frac{a}{b}} - \sqrt{\frac{b}{a}} \right) \left(\sqrt{\frac{b}{c}} - \sqrt{\frac{c}{b}} \right) \left(\sqrt{\frac{c}{d}} - \sqrt{\frac{d}{c}} \right) \left(\sqrt{\frac{d}{a}} - \sqrt{\frac{a}{d}} \right) \right| \leq \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^4 \end{aligned}$$

لدينا: $\forall (x, y) \in [1, 2]^2 \quad \left| \sqrt{\frac{x}{y}} - \sqrt{\frac{y}{x}} \right| \leq \frac{1}{\sqrt{2}}$

إذن لإثبات المساواة يكفي أن نبين أن: $\left| \sqrt{\frac{x}{y}} - \sqrt{\frac{y}{x}} \right| \leq \frac{1}{\sqrt{2}}$

$$(x,y) \in [1,2]^2 \Rightarrow \begin{cases} 1 \leq x \leq 2 \\ 1 \leq y \leq 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{2} \leq \frac{1}{y} \leq 1 \\ \frac{1}{2} \leq \frac{1}{x} \leq 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{2} \leq \frac{x}{y} \leq 2 \\ \frac{1}{2} \leq \frac{y}{x} \leq 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2}} \leq \sqrt{\frac{x}{y}} \leq \sqrt{2} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \leq \sqrt{\frac{y}{x}} \leq \sqrt{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2}} \leq \sqrt{\frac{x}{y}} \leq \sqrt{2} \\ -\sqrt{2} \leq -\sqrt{\frac{y}{x}} \leq \frac{-1}{\sqrt{2}} \end{cases}$$

بالفعل لدينا :

$$\Rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} - \sqrt{2} \leq \sqrt{\frac{x}{y}} - \sqrt{\frac{y}{x}} \leq \sqrt{2} - \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow \frac{-1}{\sqrt{2}} \leq \sqrt{\frac{x}{y}} - \sqrt{\frac{y}{x}} \leq \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow \left| \sqrt{\frac{x}{y}} - \sqrt{\frac{y}{x}} \right| \leq \frac{1}{\sqrt{2}}$$

وهذا ينهي البرهان.

$$\left| \sqrt{\frac{a}{b}} - \sqrt{\frac{b}{a}} \right| = \left| \sqrt{\frac{b}{c}} - \sqrt{\frac{c}{b}} \right| = \left| \sqrt{\frac{c}{d}} - \sqrt{\frac{d}{c}} \right| = \left| \sqrt{\frac{d}{a}} - \sqrt{\frac{a}{d}} \right| = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

التساوي يتحقق إذا كان ولدينا :

$$\left| \sqrt{\frac{x}{y}} - \sqrt{\frac{y}{x}} \right| = \frac{1}{\sqrt{2}} \Leftrightarrow \left(\sqrt{\frac{x}{y}} - \sqrt{\frac{y}{x}} \right) = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \frac{x}{y} + \frac{y}{x} - 2 = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \frac{x}{y} + \frac{y}{x} = \frac{5}{2}$$

نضع : $\frac{x}{y} + \frac{y}{x} = \frac{5}{2} \Leftrightarrow t + \frac{1}{t} = \frac{5}{2} \Leftrightarrow 2t^2 - 5t + 2 = 0 \Leftrightarrow \left(t = 2 \text{ ou } t = \frac{1}{2} \right) : t = \frac{x}{y}$

منه : $\left| \sqrt{\frac{x}{y}} - \sqrt{\frac{y}{x}} \right| = \frac{1}{\sqrt{2}} \Leftrightarrow \left(\frac{x}{y} = 2 \text{ ou } \frac{y}{x} = 2 \right) \Leftrightarrow (x = 2y \text{ ou } y = 2x)$

ولكون : $y = 2x \Rightarrow x = 1 \Rightarrow y = 2$ فإن : $x = 2y \Rightarrow 2y \leq 2 \Rightarrow 1 \leq y \leq 1 \Rightarrow y = 1 \Rightarrow x = 2$ بالمثل :

$$\left| \sqrt{\frac{x}{y}} - \sqrt{\frac{y}{x}} \right| = \frac{1}{\sqrt{2}} \Leftrightarrow (x, y) \in \{(1,2); (2,1)\}$$

منه :

إذن المتساوية تتحقق إذا كان $(d,a) \in \{(1,2); (2,1)\}$ و $(c,d) \in \{(1,2); (2,1)\}$ و $(b,c) \in \{(1,2); (2,1)\}$ و $(a,b) \in \{(1,2); (2,1)\}$ مما يعني أن :

$$(a,b,c,d) = (2,1,2,1) \text{ أو } (a,b,c,d) = (1,2,1,2)$$

 في المعادلة أعلاه استعملنا المحددة لإيجاد حلولها

الحلول المقترحة هي حلول شخصية وليس حلولاً رسمية