

المحاليل الإلكترولولية

تمارين

تمرين 1

أتم الجدول التالي بكتابه الصيغة الكيميائية لكل من الأجسام الصلبة الأيونية المكونة من الأيونات التالية:

الصيغة المكونة للمركب الصلب الأيوني	الأيونات المكونة للمركب الصلب الأيوني
	I^- و K^+
	Cl^- و Cu^{2+}
	NO_3^- و Fe^{3+}
	SO_4^{2-} و K^+

تمرين 2


أكتب المعادلة الكيميائية لذوبان كل من المركبات الصلبة الأيونية التالية في الماء:



تمرين 3

معطيات:

- كهرسلبية بعض العناصر الكيميائية: $\chi(O) = 3,4$ | $\chi(N) = 3,0$ | $\chi(C) = 2,6$ | $\chi(H) = 2,2$
- النماذج الجزيئية لأنواع كيميائية:



1. حدد الجزيئات التي لها بنية قطبية، معللاً جوابك.
2. قابلية الذوبان لثنائي أكسيد الكربون في الماء ضعيفة بينما قابلية الذوبان للأمونياك في الماء مرتفعة. أعط تفسيراً لذلك.

تمرين 4

تداب الكتلة $m = 4,05 \text{ g}$ من كلورور الحديد (III) في ماء مقطر، لتحضير محلول حجمه $V = 100 \text{ mL}$.

أكتب الصيغة الكيميائية لكلورور الحديد (III).

أكتب المعادلة الكيميائية لذوبانه في الماء.

احسب التركيز المولى للمحلول.

احسب التركيز المولى الفعلي للأيونات الناتجة في محلول.

$$M(Fe) = 55,8 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \quad / \quad M(Cl) = 35,5 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

معطيات:

تمرين 5

ملح مور (sel de Mohr) مركب صلب أيوني على شكل بلورات خضراء. صيغته الكيميائية هي $Fe(NH_4)_2(SO_4)_2 \cdot 6H_2O$. وكتلته المولية هي $M = 392 \text{ g.mol}^{-1}$.



1. باستعمال هذه الصيغة، بين أن عنصر الحديد يوجد في ملح مور على شكل أيونات الحديد (II) Fe^{2+} .

2. أكتب المعادلة الكيميائية لذوبان هذا المركب في الماء.

3. يراد تحضير محلول مائي لهذا المركب حجمه $V = 100 \text{ mL}$ بحيث يكون فيه التركيز المولي الفعلي للأيونات الحديد (II) هو $0,10 \text{ mol.L}^{-1}$. ما كتلة ملح مور التي ينبغي إذابتها؟

تمرين 6

ذوبانية مركب أيوني في الماء مقدار قييس الكتلة القصوى لهذا المركب التي يمكن إذابتها في لتر واحد من الماء. يوصف محلول المائي حينئذ بال محلول المشبع: لأن المحلول يصبح غير قادر على إذابة كمية إضافية من هذا المركب.

$s \text{ (g.L}^{-1})$	المركب الأيوني
360	$NaCl$
372	NH_4Cl
316	KNO_3

تتعلق الذوبانية في الماء بطبيعة المذاب ودرجة الحرارة، ووحدتها g.L^{-1} .

يعطي الجدول جانبه قيمة الذوبانية s في الماء لبعض المركبات الأيونية عند $20^\circ C$.

1. أكتب المعادلة الكيميائية لذوبان كل من هذه المركبات الأيونية في الماء.

2. أحسب التركيز المولي الفعلي للأيونات الناتجة في محلول مشبع لكل منها.

• معطيات:

$$M(O) = 16,0 \text{ g.mol}^{-1} / M(N) = 14,0 \text{ g.mol}^{-1} / M(H) = 1,0 \text{ g.mol}^{-1}$$

$$M(K) = 39,1 \text{ g.mol}^{-1} / M(Cl) = 35,5 \text{ g.mol}^{-1} / M(Na) = 23,0 \text{ g.mol}^{-1}$$

تمرين 7

يحضر محلولان مائيان:

- محلول $_1S$: بإذابة 50 mg من هيدروكسيد الكالسيوم $Ca(OH)_2$ في الماء للحصول على 100 mL من المحلول.

- محلول $_2S$: بإذابة 80 mg من هيدروكسيد البوتاسيوم KOH في الماء للحصول على 100 mL من المحلول.

1. أحسب التركيز المولي لكل محلول.

2. يمزج الحجم $V_1 = 50 \text{ mL}$ من المحلول $_1S$ مع الحجم $S_2 = 50 \text{ mL}$ من المحلول $_2S$.

أحسب التركيز المولي الفعلي للأيونات في الخليط علما أنه لا يحصل أي تفاعل بين محلولين.

• معطيات:

$$M(O) = 16,0 \text{ g.mol}^{-1} / M(H) = 1,0 \text{ g.mol}^{-1}$$

$$M(Ca) = 40,1 \text{ g.mol}^{-1} / M(K) = 39,1 \text{ g.mol}^{-1}$$