

قياس مواصلة محلول أيوني

تمارين تطبيقية

التمرين 1 :

1 – أحسب الموصلية σ عند درجة الحرارة 25°C لمحلول مائي لنترات البوتاسيوم $(\text{K}^+(\text{aq}) + \text{NO}_3^-(\text{aq}))$ ذي التركيز المولى $C = 10\text{mol / m}^3$

2 – مواصلة محلول لنترات البوتاسيوم $m = 25\text{mS / m} = \sigma$. حدد التركيز المولى للمذاب C لهذا محلول .
نعطي : عند درجة الحرارة 25°C وبالوحدة $\text{S.m}^2.\text{mol}^{-1}$: $\lambda_{\text{NO}_3^-} = 7,35 \cdot 10^{-3}$ و $\lambda_{\text{K}^+} = 7,14 \cdot 10^{-3}$.

التمرين 2 :

مقارنة الموصليات المولية لعدة محلائل مائية .

1 – باستعمال الجدول الخاص بالموصليات المولية الأيونية للأيونات (انظر الدرس) ، أحسب عند 25°C ، الموصلية المولية لمحلول كلورور الصوديوم $(\text{Na}^+(\text{aq}) + \text{Cl}^-(\text{aq}))$ ومحلول هيدروكسيد الصوديوم $(\text{Na}^+(\text{aq}) + \text{HO}^-(\text{aq}))$ لها نفس التركيز المولى $C = 10^{-3}\text{mol / L}$

2 – بالمقارنة بين قيمتي الموصلية المولية للمحلولين ، قارن مثلا جوابك مواصلتهما للتيار الكهربائي .

التمرين 3 :

1 – أحسب التراكيز المولية الفعلية B mol / m^3 للأيونات الموجودة في محلول بروموري الأمونيوم $(\text{NH}_4^+(\text{aq}) + \text{Br}^-(\text{aq}))$ ذي التركيز $C = 8,2 \times 10^{-3}\text{ mol / L}$

2 – أحسب الموصلية σ للمحلول عند 25°C
نعطي : عند درجة الحرارة 25°C وبالوحدة $\text{mS.m}^2.\text{mol}^{-1}$: $\lambda_{\text{Br}^-} = 7,34$ و $\lambda_{\text{NH}_4^+} = 7,81$.

التمرين 4 :

أحسب التركيز المولى لمحلول بومور الليثيوم $(\text{Li}^+(\text{aq}) + \text{Br}^-(\text{aq}))$ ب mol / L علما انه عند درجة الحرارة 25°C موصلية محلول $\sigma = 58,4\text{mS / cm}$

نعطي : عند درجة الحرارة 25°C وبالوحدة $\text{mS.m}^2.\text{mol}^{-1}$: $\lambda_{\text{Br}^-} = 7,81$ و $\lambda_{\text{Li}^+} = 3,86$.

التمرين 5 :

تحمل بطاقة خلية قياس الموصلة في المختبر الإشارة التالية : $K = 5,0 \cdot 10^{-3}\text{ m}$.

لتتحقق من هذه القيمة نقوم بغمر الخلية في محلول عيار لكlorور البوتاسيوم تركيزه $C = 1,0 \cdot 10^{-2}\text{ mol / l}$ ودرجة حرارته 25°C ، فيشير مقياس الموصلة إلى : $G = 0,76 \cdot 10^{-3}\text{ S}$.

1 – أعط تعبير موصلية هذا محلول σ بدالة الموصلية المولية الأيونية λ للأيونات المتواجدة في محلول وتراكيزها

2 – أحسب قيمة موصلية محلول عند 25°C .

نعطي : $\lambda_{\text{Cl}^-} = 76 \cdot 10^{-4}\text{ S.m}^2.\text{mol}^{-1}$, $\lambda_{\text{K}^+} = 74 \cdot 10^{-4}\text{ S.m}^2.\text{mol}^{-1}$

3 – استنتاج قيمة ثابتة خلية قياس الموصلة ، وقارنها مع القيمة المسجلة عليه .

التمرين 6 :

نتوفر على ثلاثة محلائل لها نفس التركيز $C = 1,00 \cdot 10^{-2}\text{ mol / l}$

نغمي تباعا ، نفس خلية القياس في المحاليل الثلاث ونقيس الموصلة G . يعطي الجدول التالي النتائج المحصلة :

المحلول	الموصلة ب (σ)	الاسم
$\text{H}_\text{aq}^+ + \text{Cl}^-_\text{aq}$	$\text{NH}_4^+_\text{aq} + \text{Cl}^-$	$\text{H}_\text{aq}^+ + \text{NO}_3^-_\text{aq}$
$8,23 \cdot 10^{-3}$	$2,82 \cdot 10^{-3}$	$8,12 \cdot 10^{-3}$

- عبر عن موصلية هذه المحاليل . واستنتاج موصلية محلول S_4 لنترات الأمونيوم $\text{NH}_4^+_\text{aq} + \text{NO}_3^-_\text{aq}$ تركيزه $C = 1,00 \cdot 10^{-2}\text{ mol / l}$ بدالة الموصلية المولية الأيونية للأيونات المتواجدة في محلول .
- أستنتاج علاقة بين موصليات المحاليل S_4, S_3, S_2, S_1 .
- عبر بدالة G_4 ، عن G_1, G_2, G_3 موصلة محلول S_4 . أحسب G_4 .

قياس مواصلة محلول أيوني

تمارين توليفية

التمرin 1

لدينا $20\text{m}\ell$ من محلول S_1 لنترات الفضة $(\text{Ag}_{\text{aq}}^+ + \text{NO}_3^-)$ تركيزه $C_1 = 1,00 \cdot 10^{-3} \text{ mol/l}$. مواصلة جزء من هذا محلول هي $G_1 = 5,93 \cdot 10^{-4} \text{ S}$. لدينا كذلك $80,0\text{m}\ell$ من محلول S_2 لليودور الصوديوم $(\text{Na}^+ + \text{I}^-)$ تركيزه المولي $C_2 = 1,00 \cdot 10^{-3} \text{ mol/l}$. مواصلة جزء من هذا محلول S_2 هي $G_2 = 5,65 \cdot 10^{-4} \text{ S}$.

معادلة الترسب هي : $\text{Ag}_{\text{aq}}^+ + \text{I}_{\text{aq}}^- \rightarrow \text{AgI}(\text{s})$

$$\lambda_{\text{Na}^+} = 5,10^{-3} \text{ Sm}^2 \text{ mol}^{-1}, \lambda_{\text{I}^-} = 7,68 \cdot 10^{-3} \text{ Sm}^2 \text{ mol}^{-1}, \lambda_{\text{NO}_3^-} = 7,14 \cdot 10^{-3} \text{ Sm}^2 \text{ mol}^{-1}$$

عند درجة حرارة التجربة ، مواصلة محلول كلورور البوتاسيوم تركيزه $C = 10,0 \text{ mol/m}^3$ يساوي $0,14 \text{ S.m}^{-1}$. عند عمر خلية القياس المستعملة في جميع التجارب على المحاليل السابقة نجد $S = 6,41 \cdot 10^{-3} \text{ S}$.

1 - أحسب ثابتة خلية القياس

2 - أوجد المواصلة النهائية للمحلول بعد التصفيف .

التمرin 2

نحضر $100\text{m}\ell$ من مائي بإذابة 68mg من ميثانوات الصوديوم الصلب (HCOONa) في الماء المقطر .

1 - أكتب معادلة الذوبان .

2 - أحسب التركيز المولي للمذاب المستعمل : C .

3 - إذا علمت أن ذوبان ميثانوات الصوديوم يكون كليا ، أعط تراكيز الأيونات الموجودة في محلول بالوحدة mol/m^3 .

4 - أعط تعبير موصلية محلول بدلالة تراكيز الأيونات الموجودة في محلول ، واحسب قيمتها .

5 - نصف كمية من الماء المقطر إلى محلول الأول ثم نقوم بقياس مواصلة جزء من محلول من جديد باستعمال خلية ذات الخصائص التالية $(L = 1\text{cm}, S = 3,21\text{cm}^2)$. $U = 1\text{V}, I = 2,47\text{mA}$ و I و N :

أ - أحسب المواصلة G ثم استنتج موصلية محلول الجديد .

ب - أحسب تراكيز الأيونات الموجودة في محلول الجديد .

ج - استنتاج حجم الماء المضاف إلى محلول الأول .

نعطي : عند 25°C . $\lambda_{\text{HCOO}^-} = 5,5 \cdot 10^{-3} \text{ S.m}^2 \text{ mol}$ و $\lambda_{\text{Na}^+} = 5 \cdot 10^{-3} \text{ S.m}^2 \text{ mol}$.

التمرin 3

عند درجة حرارة 25°C نقوم بمزج محلولين S_1 و S_2 .

المحلول S_1 محلول مائي لبرومور البوتاسيوم $(\text{K}_{\text{aq}}^+ + \text{Br}_{\text{aq}}^-)$ حجمه $V_1 = 100\text{m}\ell$ و تركيزه $C_1 = 1,08 \cdot 10^{-3} \text{ mol/l}$

المحلول S_2 محلول مائي ليدور الصوديوم $(\text{Na}_{\text{aq}}^+ + \text{I}_{\text{aq}}^-)$ حجمه $V_1 = 200\text{m}\ell$ و تركيزه $C_1 = 9,51 \cdot 10^{-4} \text{ mol/l}$

نعتبر V حجم الخليط .

1 - أوجد تعبير كمية المادة لكل أيون موجود في الخليط . واحسبها .

2 - أوجد تعبير التركيز المولي لكل أيون في الخليط . واحسبه بالوحدة mol/m^3 .

3 - استنتاج الموصلية σ للخليل .

4 - أوجد σ_1 و σ_2 للمحلولين S_1 و S_2 قبل مزجهما .

5 - ما هي العلاقة بين σ موصلية الخليط و σ_1 و σ_2 و V_1 و V_2 و C_1 و C_2 .

6 - أحسب الموصلية σ للخليل المحصل عليه انطلاقاً من S_1 و S_2 من $V_1 = 50\text{m}\ell$ و $V_2 = 300\text{m}\ell$.

نعطي : الموصلية الأيونية عند درجة حرارة 25°C :

$$\lambda_{\text{Na}^+} = 50,1 \cdot 10^{-4} \text{ S.m}^2 \cdot \text{mol}^{-1}, \lambda_{\text{K}^+} = 73,5 \cdot 10^{-4} \text{ S.m}^2 \cdot \text{mol}^{-1},$$

$$\lambda_{\text{I}^-} = 76,3 \cdot 10^{-4} \text{ S.m}^2 \cdot \text{mol}^{-1}, \lambda_{\text{Br}^-} = 76,8 \cdot 10^{-4} \text{ S.m}^2 \cdot \text{mol}^{-1}$$

التمرin 4

1 - أحسب التركيز المولي C لمحلول مائي لكلورور الرصاص $(\text{Pb}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{Cl}^-(\text{aq}))$ ذي التركيز الكتلي $C_m = 1,06\text{g/L}$.

2 - استنتاج التراكيز المولية الفعلية للأيونات الموجودة في محلول

3 - أحسب موصلية محلول σ عند 25°C .

4 - هل الموصلية σ للمحلول تناسب اطراضاً و التركيز المولي C ؟

قياس مواصلة محلول أيوني

- 5 – عند 25°C يكون محلول مشبعاً . نضيف إلى هذا الأخير بلورات كلورور الرصاص على أساس أن تترسب في قاع الكأس . نرشح الخليط ونقيس موصولة الرشاحة فنجد $\sigma = 462\text{mS/m}$.
- 5 – استنتج التركيز المولي للأيونات الموجودة في الرشاحة .
- 5 – استنتاج ذوبانية كلورور الرصاص عند 25°C .

$$\lambda_{\text{Pb}^{2+}} = 14,0 \text{ mS.m}^2.\text{mol}^{-1}; \lambda_{\text{Cl}^-} = 7,63 \text{ mS.m}^2.\text{mol}^{-1}$$

التمرin 5

يحتوي كلورور الكالسيوم المعيناً في حبات من فئة n على 1g من $\text{CaCl}_2 \cdot n\text{H}_2\text{O}$. نريد تحديد قيمة المعامل n بواسطة قياس المواصلة .

لتدرج خلية قياس المواصلة ، نتوفر على سلم تركيز محلول كلورور الكالسيوم . يعطي الجدول أسفله مواصلة مختلف هذه المحاليل .

C(mmol/L)	1	2,5	5	7,5	10
G(mS)	0,53	1,32	2,63	3,95	5,21

$$1 - \text{خط المنحنى } G = f(C)$$

2 – نخفف محتوى الحبة 100 مرة ونقيس مواصلته ، فنجد $G = 2,24\text{mS}$ ، استنتاج قيمة تركيز محلول المخفف ، ثم تركيزه قبل التخفيف .

3 – أحسب الكتلة m لكلورور الكالسيوم $\text{CaCl}_2 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ الموجود في الحبة . واستنتاج قيمة n .

$$\text{الجواب : } 2 - \text{تركيز محلول المخفف } 4,6 \times 10^{-3} \text{ mol/L} , \text{ تركيز محلول الأم } 0,46 \text{ mol/L}$$

$$n = 3$$

التمرin 6: تطور الموصولة المولية خلال تحول كيميائي

لدراسة التفاعل بين كربونات الكالسيوم $\text{CaCO}_3(s)$ ومحلول حمض الكلوريدريك $(\text{H}_3\text{O}^+(aq) + \text{Cl}^-(aq))$ عند درجة الحرارة 25°C نجز التجربة التالية :

نصب في حوجلة حجماً $V = 100\text{mL}$ من محلول حمض الكلوريدريك تركيزه $C = 1 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$ ، عند اللحظة $t = 0$ ندخل في الحوجلة وبسرعة 40mg من كربونات الكالسيوم . ننمذج التفاعل الحاصل داخل الحوجلة بالمعادلة الكيميائية التالية :



1 – أحسب كميات المادة البدئية لمتفاعلات

2 – أنشئ الجدول الوصفي لتقدم التفاعل
حدد المتفاعل المهد والتقدم الأقصى x_{\max} .

3 – يمكن تتبع هذا التفاعل بقياس مواصلة محلول بدلالة الزمن t علماً أن أيونات $\text{Cl}^-(aq)$ غير نشطة لكنها موجودة في الوسط التفاعلي .

3 – ما هي الأيونات الموجودة في محلول قبل بداية التفاعل ؟ أحسب تركيزها المولي في هذه الحالة .

3 – أعط تعبير الموصولة المولية σ_0 للمحلول قبل بداية التفاعل . واحسب قيمتها .

3 – ما هي الأيونات الموجودة في محلول عند نهاية التفاعل ؟

أحسب كمية المادة لهذه الأيونات واستنتاج تركيزها المولي

3 – أوجد تعبير الموصولة المولية σ_f عند نهاية التفاعل . أحسب قيمتها .

3 – كيف تتطور موصولة محلول خلال هذا التفاعل ؟ علل هذا التطور .

4 – بين أن العلاقة بين الموصولة المولية σ والتقدم x في اللحظة t يمكن على الشكل التالي :

$$\sigma = 0,425 - 580x \quad (\text{S/m})$$

5 – تأكد باستعمال العلاقة السابقة من القيم σ_0 و σ_f المحقق عليها في السؤال (3)

نعطي : الموصولة المولية الأيونية عند درجة حرارة 25°C :

$$\lambda_{\text{Ca}^{2+}} = 12,0 \text{ mS.m}^2.\text{mol}^{-1}; \lambda_{\text{H}_3\text{O}^+} = 35,0 \text{ mS.m}^2.\text{mol}^{-1}; \lambda_{\text{Cl}^-} = 7,5 \text{ mS.m}^2.\text{mol}^{-1}$$

$$\text{كتلة المولية : } M(\text{O}) = 16\text{ g/mol}; M(\text{C}) = 12\text{ g/mol}; M(\text{Ca}) = 40\text{ g/mol}$$