

### التصحيح correction


#### تصحيح تمرين الفيزياء 1

$$v_B = L.\omega_B = 2m/s \quad (1)$$

(2) بتطبيق مبرهنة الطاقة الحركية على العارضة بين الموضعين  $G_1$  و  $G_2$  :

$$(1) \quad \Delta E_c = m.g(z_1 - z_2) \quad \Leftrightarrow \quad \text{مع } \overline{WR}_{G_1 \rightarrow G_2} = 0 \quad \Delta E_c = \overline{WP}_{G_1 \rightarrow G_2} + \overline{WR}_{G_1 \rightarrow G_2}$$

ولدينا :  $z_1 = \frac{L}{2} \cos \theta_1$  و  $z_2 = \frac{L}{2} \cos \theta_2$   $\Leftrightarrow$  وبالتعويض في (1) :



$$\Delta E_c = m.g \frac{L}{2} (\cos \theta_2 - \cos \theta_1)$$

(3) من خلال العلاقة السابقة :  $E_{c2} - E_{c1} = m.g \frac{L}{2} (\cos \theta_2 - \cos \theta_1)$  أي :  $\frac{1}{2} J_\Delta (\omega_2^2 - \omega_1^2) = m.g \frac{L}{2} (\cos \theta_2 - \cos \theta_1)$

مع :  $J_\Delta = \frac{1}{3} m.L^2$   $\Leftrightarrow \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} m.L^2 (\omega_2^2 - \omega_1^2) = m.g \frac{L}{2} (\cos \theta_2 - \cos \theta_1)$  ومنه :  $(\omega_2^2 - \omega_1^2) = \frac{3.g}{L} (\cos \theta_2 - \cos \theta_1)$

$$\omega_2 = \sqrt{\omega_1^2 + \frac{3.g}{L} (\cos \theta_2 - \cos \theta_1)} \quad \text{ت.ع.} \quad (2) \quad \omega_2 = \sqrt{2^2 + \frac{3 \times 10}{1} (\cos 30 - \cos 60)} = 3,87 \text{ rad/s}$$

(4) عند مرور العارضة من موضع التوازن أي في النقطة O تصبح :  $\theta = 0$  و  $\cos \theta = 1$  و بذلك من خلال العلاقة (2) نتوصل إلى ما يلي :

$$\omega_o = \sqrt{\omega_1^2 + \frac{3.g}{L} (1 - \cos \theta_1)} \quad \text{ت.ع.} \quad \omega_o = \sqrt{2^2 + \frac{3 \times 10}{1} (1 - \cos 60)} \approx 4,36 \text{ rad/s}$$

$$v_o = \frac{L}{2} \cdot \omega_o \quad \text{ت.ع.} \quad v_o = \frac{1}{2} \times 4,36 = 2,18 \text{ m/s}$$


#### تصحيح تمرين الفيزياء 2

(1) 1-1 - المستوى مائل 20% يعني كلما قطعنا المسافة 100 متر أفقيا كلما ارتفع المستوى ب 20 متر .  
بينما المستوى مائل 50% يعني كلما قطعنا المسافة 100 متر أفقيا كلما ارتفع المستوى ب 50 متر .  
المستوى مائل 50% هو كما يلي :



$$\alpha = \tan^{-1} 0,5 \approx 26,56^\circ \quad \Leftarrow \quad \tan \alpha = \frac{50}{100} = 0,5 : \text{أي أن}$$

$$W_{A \rightarrow B}^{\vec{P}} = 250 \cdot 10^{-3} \times 10 \times 50 \cdot 10^{-2} \cdot \sin 26,56 \approx 0,56 J \quad \text{ت.ع.} \quad W_{A \rightarrow B}^{\vec{P}} = m \cdot g \cdot (z_A - z_B) = +m \cdot g \cdot h = m \cdot g \cdot AB \cdot \sin \alpha$$



2-1- بتطبيق مبرهنة الطاقة الحركية على الجسم S بين A و B :

$$W_{A \rightarrow B_2}^{\vec{T}} = \Delta E_c - W_{A \rightarrow B_2}^{\vec{P}} \quad \text{ومنه} \quad \Delta E_c = W_{A \rightarrow B_2}^{\vec{P}} + W_{A \rightarrow B_2}^{\vec{T}} \quad \text{مع} \quad \Delta E_c = W_{A \rightarrow B_2}^{\vec{P}} + W_{A \rightarrow B_2}^{\vec{R}} + W_{A \rightarrow B_2}^{\vec{T}}$$

$$W_{A \rightarrow B_2}^{\vec{T}} = \frac{1}{2} \cdot 250 \cdot 10^{-3} (1,5^2 - 0) - 0,56 \approx -0,28 J \quad \text{ت.ع.}$$

$$W_{A \rightarrow B_2}^{\vec{T}} = \frac{1}{2} \cdot m (v_B^2 - v_A^2) - W_{A \rightarrow B_2}^{\vec{P}} \quad \text{أي}$$

$$T = \frac{-(-0,28)}{0,5} = 0,56 N. \quad \text{ت.ع.} \quad T = \frac{-W_{A \rightarrow B_2}^{\vec{T}}}{AB} \quad \text{ومنه} \quad W_{A \rightarrow B_2}^{\vec{T}} = \vec{T} \cdot \vec{AB} = T \cdot AB \cdot \cos 180 = -T \cdot AB \quad \text{ولدينا}$$

$$P = -0,56 \times 1,5 = -0,84 W \quad \text{ت.ع.} \quad P = \vec{T} \cdot \vec{v}_B = T \cdot v_B \cdot \cos 180 = -T \cdot v_B \quad \text{-3-1}$$

2 بتطبيق مبرهنة الطاقة الحركية على البكرة بين لحظة انفلات الخيط ولحظة التوقف :

$$W = M \cdot \Delta \theta \quad \text{شغل المزدوجة المقاومة} \quad \text{مع} \quad W_{A \rightarrow B_2}^{\vec{P}} = 0 \quad \text{و} \quad W_{A \rightarrow B_2}^{\vec{R}} = 0 \quad \text{و} \quad \Delta E_c = W_{A \rightarrow B_2}^{\vec{P}} + W_{A \rightarrow B_2}^{\vec{R}} + W_{A \rightarrow B_2}^{\vec{T}}$$

$$J_{\Delta} = \frac{-4 \cdot M \cdot \pi \cdot n \cdot r^2}{v_B^2}$$

$$0 - \frac{1}{2} \cdot J_{\Delta} \cdot \omega_B^2 = M \cdot 2 \cdot \pi \cdot n \quad \text{أي} \quad E_{c.f} - E_{c.B} = M \cdot \Delta \theta \quad \text{إذن}$$


$$J_{\Delta} = \frac{-4 \cdot (-2,24 \cdot 10^{-3}) \cdot \pi \times 4,32 \times (10 \times 10^{-2})^2}{1,5^2} = 5,4 \cdot 10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \quad \text{تطبيق عددي}$$

2-2- شغل وزن الجسم S بين M و B :

$$W_{B \rightarrow M_2}^{\vec{P}} = m \cdot g (z_B - z_M) = m \cdot g \cdot (R \cdot \sin \theta_o - R \sin \theta) = m \cdot g \cdot R (\sin \theta_o - \sin \theta) \quad \text{-2-2}$$

$$z_B = R \cdot \sin \theta_o$$

$$z_M = R \sin \theta$$



$$W_{B \rightarrow M_2}^{\vec{P}} = m \cdot g \cdot R (\sin \theta_o - \sin \theta)$$

3-2- بتطبيق مبرهنة الطاقة الحركية على الجسم S بين B و M :

$$E_{c.M} - E_{c.B} = m \cdot g (z_B - z_M) \quad \text{أي} \quad \Delta E_c = W_{B \rightarrow M_2}^{\vec{P}} \quad \text{إذن} \quad W_{B \rightarrow M_2}^{\vec{R}} = 0 \quad \text{مع} \quad \Delta E_c = W_{B \rightarrow M_2}^{\vec{P}} + W_{B \rightarrow M_2}^{\vec{R}}$$

$$v_M^2 = \frac{5 \cdot v_B^2}{3} \quad \Leftarrow \quad v_M = v_B \cdot \sqrt{\frac{5}{3}} \quad \text{مع}$$

$$\frac{1}{2} \cdot m (v_M^2 - v_B^2) = m \cdot g \cdot R (\sin \theta_o - \sin \theta) \quad \text{إذن}$$

$$\frac{v_B^2}{2} \left[ \frac{5}{3} - 1 \right] = g \cdot R (\sin \theta_o - \sin \theta) \quad \text{أي} \quad \Leftarrow \frac{1}{2} \cdot m \left[ \frac{5}{3} v_B^2 - v_B^2 \right] = m \cdot g \cdot R (\sin \theta_o - \sin \theta) \quad :$$


$$\Leftarrow \frac{v_B^2}{3 \cdot g \cdot R} = \sin \theta_o - \sin \theta \quad \frac{v_B^2}{3} = g \cdot R (\sin \theta_o - \sin \theta) \quad \text{أي} \quad \Leftarrow \frac{v_B^2}{2} \left( \frac{2}{3} \right) = g \cdot R (\sin \theta_o - \sin \theta)$$

$$\theta = \sin^{-1} \left( \sin 60 - \frac{1,5^2}{3 \times 10 \times 1} \right) \approx 52,5^\circ \quad \text{ت.ع.} \quad \theta = \sin^{-1} \left( \sin \theta_o - \frac{v_B^2}{3 \cdot g \cdot R} \right) \quad \text{أي :} \quad \sin \theta = \sin \theta_o - \frac{v_B^2}{3 \cdot g \cdot R}$$

وبالتالي :  
تصحيح كيمياء :

$$C_1 = \frac{n}{V_1} = \frac{m}{M \cdot V_1} = \frac{m}{M \cdot V_1} = \frac{500 \cdot 10^{-3}}{342 \times 100 \cdot 10^{-3}} \approx 14,6 \cdot 10^{-3} \text{ mol/L} \quad -1-1 \quad (1)$$

2-1- معادلة الذوبان :



الذوبان كلي أي أن  $Al_2(SO_4)_3$  يختفي كليا عند الحالة النهائية.

$$\dots n \dots \dots 0 \dots \dots 0$$

$$\dots 0 \dots \dots 2 \cdot n \dots \dots 3 \cdot n$$

$$[Al^{3+}] = \frac{2 \cdot n}{V_1} = 2 \cdot C_1 = 2 \times 14,6 \cdot 10^{-3} = 2,92 \cdot 10^{-3} \text{ mol/L}$$

$$[SO_4^{2-}] = \frac{3 \cdot n}{V_1} = 3 \cdot C_1 = 3 \times 14,6 \cdot 10^{-3} = 43,8 \cdot 10^{-3} \text{ mol/L}$$

3-1- للكشف عن أيونات الكبريتات نستعمل كلورور الباريوم الذي يعطي راسبا أبيضاً لكبريتات الباريوم.

1-2(2) الجدول الوصفي للتفاعل الحاصل :

كمية مادة أيونات الكبريتات البدئية :  $n_o(SO_4^{2-}) = 3 \cdot C_1 \cdot V_1 = 3 \times 14,6 \cdot 10^{-3} \times 100 \cdot 10^{-3} = 4,38 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$  قادمة من المحلول الأول فقط.

$n_o(Ba^{2+}) = C_2 \cdot V_2$  قادمة من المحلول الثاني فقط.

م التفاعل				
$BaSO_4$	$\rightarrow$	$SO_4^{2-}$	+	$Ba^{2+}$
			التقدم	الحالات
$C_2 \cdot V_2$		$4,38 \cdot 10^{-3}$	0	الحالة البدئية
$C_2 \cdot V_2 - x$		$4,38 \cdot 10^{-3} - x$	$x$	حالة التحول
$C_2 \cdot V_2 - x_{\max}$		$4,38 \cdot 10^{-3} - x_{\max}$	$x_{\max}$	الحالة النهائية

$$n = \frac{m(BaSO_4)}{M} = \frac{0,92}{233,3} = 3,94 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \quad \text{إذن : } m = 0,92 \text{ g } BaSO_4$$

3 2

3-2- نلاحظ أن كمية مادة الراسب المتكون ل:  $BaSO_4$  أكبر من كمية مادة أيونات الكبريتات البدئية . إذن

بما أن الخليط ليس ستوكيوميتريا:

إذا كان  $SO_4^{2-}$  هو المحد فإن :  $x_{\max} = 4,38 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$  وإذا كان  $Ba^{2+}$  هو المحد فإن :  $x_{\max} = 3,94 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$  بما أن

و المفاعل المحد هو :  $Ba^{2+}$  . فإن :  $3,94 \cdot 10^{-3} \text{ mol} < 4,38 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$

$$C_2 = \frac{x_{\max}}{V_2} = \frac{3,9 \cdot 10^{-3}}{150 \cdot 10^{-3}} \approx 0,027 \text{ mol/L} \quad \text{ومنه : } C_2 \cdot V_2 - x_{\max} = 0 \quad \text{بما أن المفاعل المحد هو : } Ba^{2+}$$

$$[Al^{3+}] = \frac{2 \cdot C_1 \cdot V_1}{V_1 + V_2} = \frac{2 \times 14,6 \cdot 10^{-3} \times 100 \cdot 10^{-3}}{(100 + 150) \cdot 10^{-3}} = 11,56 \cdot 10^{-3} \text{ mol/L} \quad -5-2$$

$$[SO_4^{2-}] = \frac{3 \cdot C_1 \cdot V_1 - x_{\max}}{V_1 + V_2} = \frac{3 \times 14,6 \cdot 10^{-3} \times 100 \cdot 10^{-3} - 4 \cdot 10^{-3}}{(100 + 150) \cdot 10^{-3}} = 1,52 \cdot 10^{-3} \text{ mol/L}$$

$$[Ba^{2+}] = \frac{C_2 \cdot V_2 - x_{\max}}{V_1 + V_2} = 0 \text{ mol/L} \quad \text{لأنه محد .}$$

لا يتدخل في لتفاعل .  $[Cl^-] = \frac{2 \cdot C_2 \cdot V_2}{V_1 + V_2} = \frac{2 \times 0,027 \times 150 \cdot 10^{-3}}{(100 + 150) \cdot 10^{-3}} = 3,24 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L}$