

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا
الدورة العادية 2015
-الموضوع -

NS 35

٤٥٠٤٦ | ٢٠١٤ | ٩٠٣ | ٨٠٤٦ | ٣٣٨٧
 ٨ | ٣٣٨٧ | ٩٠٣ | ٢٠١٤ | ٤٥٠٤٦



المملكة المغربية
 وزارة التربية الوطنية
 والتكوين المهني

المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه

3 مدة الإنجاز
 5 المعامل

علوم الحياة والأرض

شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الزراعية

المادة

الشعبة أو المسلك

يسمح باستعمال الآلة الحاسبة غير القابلة للبرمجة

المكون الأول: استرداد المعرف (5 نقط)

I - عرف ما يلي: مكملات غذائية - تعديل وراثي - تهجين.

II - يوجد اقتراح صحيح بالنسبة لكل مُعطى من المعطيات المرقمة من 1 إلى 3. أنقل على ورقة تحريرك الأزواج الآتية (1,...,....) ؛ (2,...,....) ؛ (3,...,....) ، ثم أكتب داخل كل زوج الحرف المقابل لاقتراح الصحيح.

1 - تعتمد تقنية المقاومة البيولوجية على:

أ . رش الحقول بمبيدات الأعشاب.

ب. رش الحقول بمبيدات الحشرات.

ج. إدخال كائنات حية مفترسة للطفيليات في الحقول.

د . تزاوج سلالتين نباتيتين مختلفتين للحصول على سلالة مقاومة للطفيليات.

2 - يعتمد استعمال الري السطحي التقليدي على:

أ. توصيل كميات ملائمة من المياه إلى جذور النبات وتنبلي جزء من التربة.

ب. جلب الماء إلى المحاصيل الزراعية باستعمال الأذرع المحورية.

ج. جريان طبقة رقيقة من الماء على مستوى الحقل باستعمال الرشاشات.

د. جلب الماء إلى المحاصيل الزراعية عن طريق شبكة من القنوات السطحية.

3 - يمكن تقدير المردودية باستعمال معامل الاستهلاك الذي:

أ . يعكس تحويل مواد غذائية يستهلكها الحيوان إلى مواد قابلة للاستهلاك من طرف الإنسان.

ب. يعكس تحويل مواد غذائية يستهلكها الحيوان إلى مواد قابلة وغير قابلة للاستهلاك من طرف الإنسان.

ج. يعكس تحويل مواد غذائية يستهلكها الحيوان إلى مواد غير قابلة للاستهلاك من طرف الإنسان.

د. يكون كبيرا كلما كان الإنتاج كبيرا.

III - أنقل على ورقة تحريرك رقم كل اقتراح من الاقتراحات الآتية، ثم أكتب أمامه "صحيح" أو "خطأ". (1ن)

1- تمكن الزراعة المغطاة الرفع من المردود الزراعي بالتحكم في درجة الحرارة وفي شدة الإضاءة وفي قوام التربة

2- يؤدي تناوب الزراعات في نفس القطعة المزروعة إلى الحفاظ على خصوبة التربة والزيادة في مردود المحاصيل الزراعية

3- تتميز سلالة الدمان بقدرة تكاثرية مرتفعة.

4- يتم الحفاظ على سلالة نقية بتزاوج ذكور وإناث من سلالتين مختلفتين بعد الانتقاء.

IV- أنساب لكل عنصر التعريف المناسب له، وذلك باتمام الجدول الآتي بعد نقله على ورقة تحريرك. (1ن)

العنصر	الحرف المقابل للتعريف	1- تسميد كيميائي	2- لؤسب	3 - حرث	4 - تسميد كيميائي

أ. قلب التربة وخلط مكوناتها المعدنية والعضوية.

ب. مادة موجهة للقضاء على الطفيليات الحيوانية أو النباتية.

ج. إمداد التربة بالعناصر المعدنية الأساسية (الأزوت، والفسفور، والبوتاسيوم).

د. بقايا صلبة للبذور الزيتية تستعمل كأعلاف للحيوانات.


المكون الثاني: الاستدلال العلمي والتواصل الكتابي والبصري: (15 نقطة)

التمرين الأول: (5 نقاط)

في إطار دراسة بعض مظاهر الخبر الوراثي، تم إنجاز سلسلة من التجارب على أسيتابولاريا وهو طحلب وحيد الخلية يتراوح طوله بين 1 cm و 8 cm. يتشكل هذا الطحلب من قبعة وساقي ووبر جذري (قاعدة) يحتوي على النواة.

• السلسلة التجريبية الأولى:

تبين الوثيقة 1 رسوما تخطيطية لتجارب ونتائج التطعيم المتبادل للنواة بين نوعين من الأسيتابولاريا نوع ذو قبعة مستديرة (*Acétabularia mediteranea : Am*) مع نوع ذو قبعة مسننة (*Acétabularia crénulata : Ac*).




الوثيقة 1

1- صرف النتائج التجريبية المحصلة. ماذا تستنتج؟ (1 ن)


• السلسلة التجريبية الثانية:

لتعرف العلاقة بين النواة وتركيب البروتينات المتدخلة في تشكيل القبعة، قام باحثون بإنجاز التجارب الآتية:

- تم زرع طحلب أسيتابولاريا فتي في وسط يحتوي على بشائر مشعة تدخل في تركيب ARNm ثم تمت إعادة زرره في وسط عادي تقدم الوثيقة 2 رسوما تخطيطية للظروف التجريبية لنتائج المحصلة
- تم عزل مستخلص خلوي يحتوي على المكونات السيتوبلازمية الضرورية لتركيب البروتينات خال من المادة الوراثية، وتم وضع هذا المستخلص داخل أنبوب اختبار في وسط غني بالأحماض الأمينية. في الزمن $t = 30 \text{ min}$ تمت إضافة ARNm. تبين الوثيقة 3 تغير كمية البروتينات المركبة وكمية ARNm في هذا الوسط.



الوثيقة 3



الوثيقة 2

: إشعاع

2- أ. ما هي المعلومات التي يمكن استخلاصها من معطيات الوثيقة 2 ؟ (0.5 ن)

ب. بتوظيفك لمعطيات الوثيقة 3، استنتاج دور ARNm ؟ (0.75 ن)

• السلسلة التجريبية الثالثة:

لإبراز كيفية تدخل النواة في تركيب القبعة تم إنجاز مجموعة من التجارب. تلخص الوثيقة 4 الظروف التجريبية والنتائج المحصلة.

التجارب	ظروف التجربة	النتيجة بعد شهرين
1 : تجربة شاهد	<p>قطع طلب فتي على مستوى القطعة S وفصله إلى جزئين: القاعدة والساق.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - الجزء الذي يتكون من القاعدة يركب الساق والقبعة. - الجزء الذي يتكون من الساق يركب القبة جزئيا ويموت.
2	<p>قطع طلب فتي آخر على مستوى القطعة S وفصله إلى جزئين: القاعدة والساق ومعالجة الساق بأنزيم الريبيونيكيلياز Ribonucléase الذي يدمّر ARN.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - الجزء الذي يتكون من القاعدة يركب الساق والقبعة. - الجزء الذي يتكون من الساق لا يركب القبة ويموت.
3	<p>معالجة طلب فتي ثالث بمادة أكتينومسين Actinomycine التي ترتبط بـ ADN ويُكبح نسخه إلى ARN. بعد ذلك تم قطع الططلب على مستوى S وفصله إلى جزئين: القاعدة والساق.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - الجزء الذي يتكون من القاعدة لا يركب الساق والقبعة.

3- باستثمار نتائج التجاربتين 2 و 3 من الوثيقة 4، بين كيف تتدخل النواة في تركيب القبعة. (1ن)

تتوفر النباتات الخضراء على إنزيم Rubisco ، وهو بروتين يتدخل في تركيب المادة العضوية. تحكم في تركيب هذا البروتين المورثة *rbcl*. تمثل الوثيقة 5 جزءاً من متالية الرفكلويونيدات للحيط المستنسخ المتحكم في تركيب إنزيم Rubisco عند صنفين من النباتات: صنف عادي ينمو بشكل عادي وصنف طافر يتميز بنمو ضعيف.

تمثل الوثيقة 6 مقتطفاً من جدول الرمز الوراثي.


الأحماض الأمينية	برولين Pro	أرجينين Arg	فالين Val	تريبتوفان Trp	ايوزولوسين Ile	الآنين Ala	بدون معنى	تربيونين Thr	غليسين Gly
الوحدات الرمزية	CCU	CGU	GUG	UGG	AUA	GCC	UAA	ACA	GGG
الرمزية	CCA	AGA	GUA				UAG	ACU	GGU

4- باستغلال معطيات الوثيقة 5 ومقطف جدول الرمز الوراثي من الوثيقة 6، أبرز العلاقة مورثة -بروتين- صفة. (نـ 75, 1ـ نـ)

التمرين الثاني: (5 نقط)

ذبابة الخل حشرة صغيرة تعيش على الخضر والفواكه الفاسدة لدراسة بعض مظاهر انتقال الخبر الوراثي عبر التوالد الجنسي عند هذه الحشرة نقترح المعطيات الآتية:

- تشكل الأمشاج عند ذباب الخل انطلاقاً من الخلايا الأم للأمشاج (المنسليات) التي تتعرض للانقسام الاختزالي. تمثل الوثيقة 1 رسوماً تخطيطية لمظهر الصبغيات في خلية منسلية ذكرية (الشكل - أ) وفي خلية منسلية أنثوية (الشكل - ب).



1- قارن مظهر الصبغيات وعددها بين خلايا ذكر وأنثى ذباب الخل، ثم أكتب الصيغة الصبغية للأمشاج المُنَجَّة بعد الانقسام الاختزالي. (1ن)

2- ممثل برسم تخططي مبسط الطور الانفصالي الأول من الانقسام الاختزالي لخلية تتحدر من منسلية أنثوية (دون تمثيل ظاهرة العبور). (1ن)

● لتفسير كيفية انتقال صفة لون العيون عند ذباب الخل نقترح التزاوجات الآتية:
التزاوج الأول: بين سلالتين نقيمهتين من ذباب الخل، ذكور بعيون حمراء مع إناث بعيون بيضاء. تم الحصول في الجيل الأول F_1 على ذكور بعيون بيضاء وإناث بعيون حمراء.


3- ماذا تستنتج من تحليل نتيجة هذا التزاوج؟ (1.25ن)
استعمل R و r لتمثيل حليلي مورثة لون العيون.

التزاوج الثاني: بين ذكور وإناث الجيل F_1 . تم الحصول على جيل F_2 . يعطي جدول الوثيقة 2 نتائج هذا التزاوج.

الجنس	الجيل	عيون حمراء	عيون بيضاء	عدد الأفراد ذوي
الذكور	F_2	118	119	عدد الأفراد ذوي عيون بيضاء
		115	123	عيون حمراء
إناث				

4- أعط التفسير الصبغي لنتائج التزاوج الثاني مستعيناً بشبكة التزاوج. (1ن)

● يحدث التزاوج عند ذباب الخل بين الأنثى والذكر حيث يضع الذكر أمشاجه في المسالك التناسلية الأنوثية فتيم الإخصاب. تضع الأنثى البيض فوق الأغذية الفاسدة وبعد يوم واحد تفقس البيضة وتعطي يرقة تتحول إلى خادرة بعد 5 إلى 6 أيام. تتحول الخادرة بدورها خلال 4 أيام إلى حشرة بالغة. تلخص الوثيقة 3 دورة نمو هذه الحشرة.




5- أنجز الدورة الصبغية لذباب الخل وحدّد نمطها مع التعليل. (0.75 ن)


التمرين الثالث: (5 نقط)

تعرف العديد من الأوساط المائية (بحيرات، أنهار، ضيادات) حدوث ظاهرة التخاصب. تسبب هذه الظاهرة تدهور الحميات البيئية المائية. للكشف عن تطور الأوساط المائية بعد تعرضها لهذه الظاهرة، نقترح دراسة واستثمار المعطيات الآتية:

- تمثل الوثيقان 1 و 2 نتائج دراسة لجزت في بحيرة بأمريكا(Lac Washington)، تتوارد بالقرب من منطقة حضرية تعرف نمواً ديموغرافياً سريعاً كانت هذه البحيرة تستقبل المياه العادمة للمنطقة الحضرية المجاورة دون آلية معالجة إلى حدود سنة 1965.



الوثيقة 2



الوثيقة 1

- 1- بتوظيف معطيات الوثيقتين 1 و 2، فسر أثر طرح المياه العادمة على مياه البحيرة قبل سنة 1965. (1 ن)

- قبل سنوات الخمسينات من القرن الماضي كانت مياه بحيرة Annecy بفرنسا مياهًا نقية تعيش بها العديد من الحيوانات المائية. وقد عرفت هذه البحيرة بعد ذلك تدفق مياه عادمة ملوثة غنية بالفوسفور. أدى هذا إلى ارتفاع حمولة مياه البحيرة من المواد العضوية وتکاثر مفرط للطحالب.


تمثل الوثيقة 3 تطور كمية السمك المصطاد في بحيرة Annecy بين سنوات 1948 و 1970.

خلال هذه الفترة أنجزت عدة قياسات في المياه العميقة لبحيرة Annecy؛ تعطي الوثيقة 4 تطور تركيز ثنائي الأوكسجين المذاب في مياه هذه البحيرة.

تركيز O_2 المذاب بـ mg/L	السنوات
0,56	1937
0,36	1956
0,10	1966

تتكاثر الطحالب الزرقاء وتنشر بسرعة في المياه الملوثة الغنية بالأملاح المعدنية (الفوسفور والأزوت والبوتاسيوم)؛ يؤدي ذلك إلى ارتفاع حمولة المياه من المواد العضوية وتتكاثر بكتيريات مؤكسدة وبالتالي انخفاض كمية O_2 المذاب في الوسط.


الوثيقة 4



2- صرف تطور كمية السمك المصطاد (الوثيقة 3) وفسن التغيرات الملاحظة بعد سنة 1956 مستغلاً معطيات الوثيقة 4. (1.5 ن)

- تعالت عدة أصوات لإنقاذ بحيرة Annecy، وفي سنة 1964 تم تجميع المياه العادمة التي تصب في البحيرة بواسطة شبكة تصريف وإنشاء محطة للمعالجة.

تعطي الوثيقة 5 مراحل معالجة مياه عادمة في محطة معالجة معينة.



الوثيقة 5

3- صرف مراحل معالجة المياه العادمة في هذه المحطة (الوثيقة 5). (1 ن)

بعد إحداث محطة المعالجة بالمنطقة، لوحظ ارتفاع في كمية ثاني الأوكسجين المذاب في مياه البحيرة وتحسن شفافية الماء، كما ارتفعت كمية السمك المصطاد. تمثل الوثائقان 6 و 7 نتائج قياسات تم إنجازها في مياه بحيرة Annecy بعد إحداث محطة المعالجة

المنشطات	الطلالب الزرقاء	السنوات
12,21 %	86,30 %	1961
65,36 %	32,73 %	1967
95,55 %	0,22 %	1974

الوثيقة 7

السنوات	تركيز الفوسفور $\mu\text{g}/\text{L}$
1971	18,5
1972	14,5
1975	11,9
1976	11

الوثيقة 6

- استخرج من الوثائقين 6 و 7 أهم التغيرات الملاحظة بعد إنشاء محطة المعالجة. (1 ن)

ب- أبرز تأثير إنشاء محطة المعالجة على جودة مياه بحيرة Annecy. (0.5 ن).