

المادة: الرياضيات

ملخص لدرس الاشتقاق

ودراسة الدوال

مستوى: السنة الثانية من سلك البكالوريا

- شعبة التعليم الأصيل: مسلك العلوم الشرعية و مسلك اللغة العربية
- شعبة الآداب و العلوم الإنسانية: مسلك الآداب و مسلك العلوم الإنسانية

ا. اشتقاق دالة في نقطة:

تعريف:

نقول ان دالة f قابلة للاشتقاق في النقطة x_0 إذا وجد عدد حقيقي l بحيث $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 - h) - f(x_0)}{h} = l$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = l \text{ أو}$$

العدد l يسمى العدد المشتق للدالة f في النقطة x_0 . و نكتب $l = f'(x_0)$

ملاحظة:

إذا كانت f قابلة للاشتقاق في x_0 فان معادلة مماس المنحنى (C_f) في النقطة التي أفصولها x_0 هي:

$$y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$$

ii. الدالة المشتقة:

مشتقات الدوال الاعتيادية:

المجال	$f'(x)$	$f(x)$
\mathbb{R}	0	k
\mathbb{R}	a	ax
\mathbb{R}	$2x$	x^2
\mathbb{R}	nx^{n-1}	$x^n (n \in \mathbb{N}^*)$
$] -\infty, 0[$ أو $] 0, +\infty[$	$-\frac{1}{x^2}$	$\frac{1}{x}$

العمليات على الدوال المشتقة:

الشرط	مشتقتها	الدالة
	$u' + v'$	$u + v$
	$k \cdot u'$	$k \cdot u$
	$u'v + uv'$	$u \cdot v$
u لا تنعدم في I	$-\frac{u'}{u^2}$	$\frac{1}{u}$
v لا تنعدم في I	$\frac{u'v + uv'}{v^2}$	$\frac{u}{v}$
	$nu^{n-1}u'$	$u^n (n \in \mathbb{N}^*)$

III. رتبة دالة و إشارة مشتقتها:

خاصية:

- مجال من \mathbb{R} و f دالة قابلة للاشتقاق على I .
- f ثابتة على $I \Leftrightarrow f'(x) = 0$ لكل x من I .
- f تزايدية على $I \Leftrightarrow f'(x) \geq 0$ لكل x من I .
- f تناقصية على $I \Leftrightarrow f'(x) \leq 0$ لكل x من I .

ملاحظة: f قابلة للاشتقاق على المجال I .

إذا انعدمت $f'(x)$ في x_0 مغيرة اشارتها بالمرور من فان f تقبل مطرافا في x_0 .

IV. نهايات دالة:

نهاية دالة حدودية في $+\infty$ أو في $-\infty$ هي نهاية حدها الأعلى درجة.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{ax+b}{cx+d} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{ax+b}{cx+d} = \frac{a}{c} \quad (c \neq 0)$$

و نهاية الدالة $\frac{ax+b}{cx+d}$ في $x \rightarrow -\frac{d}{c}$ هي $+\infty$ أو في $-\infty$.

ملاحظة:

- إذا كان $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l$ أو $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = l$ فان المستقيم ذا المعادلة $y = l$ مقارب أفقي للمنحنى (C_f) .
- إذا كان $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$ أو $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$ فان المستقيم ذا المعادلة $x = x_0$ مقارب عمودي.

V. المعادلة و المتراجحة:

دالة عددية و (C_f) منحناها و c عدد حقيقي.

- حلول المعادلة $f(x) = c$ هي أفاصيل نقط تقاطع المنحنى (C_f) و المستقيم $y = c$.
- حلول المتراجحة $f(x) = c$ هي المجالات التي يكون فيها المنحنى (C_f) تحت المستقيم $y = c$.
- حلول المتراجحة $f(x) = c$ هي المجالات التي يكون فيها المنحنى (C_f) فوق المستقيم $y = c$.

مثال 1 : دراسة دالة حدودية:

دالة عددية معرفة على \mathbb{R} ب: $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4$

1. حدد أرتوب مركز تماثل منحنى الدالة f علما أن أفصولها يساوي 1.
2. حدد حيز الدراسة و أحسب النهاية $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
3. أحسب الدالة المشتقة ثم ضع جدول تغيرات الدالة f على حيز الدراسة.
4. أنشئ منحنى الدالة f .
5. حدد مبيانيا عدد حلول المعادلة $f(x) = 3$ على المجال $]-\infty, 1]$.

الحل:

1. الدالة f حدودية يعني معرفة على \mathbb{R} , و يعني أن مركز تماثل (C_f) ينتمي إليه.

فإذا كان أفصول مركز التماثل هو 1 فان أرتوبه هو $f(1) = 2$.

2. حيز دراسة الدالة f هو $D = [1, +\infty[$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 = +\infty$$

3. لكل x من $[1, +\infty[$: $f'(x) = (x^3 - 3x^2 + 4)' = 3x^2 - 6x$

يعني: $f'(x) = 3x(x-2)$

$$f'(x) = 0 \text{ يعني } 3x(x-2) = 0$$

يعني $x = 0$ أو $x = 2$

جدول تغيرات الدالة f .


x	1	2	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$	2	0	$+\infty$

جدول إشارة $f'(x)$

x	1	2	$+\infty$
$3x$	+		+
$x-2$	-	0	+
$f'(x)$	-	0	+

4. التمثيل المبياني للدالة f .

نبدأ برسم المنحنى على المجال $[1, +\infty[$ ثم نستعمل التماثل المركزي الذي مركزه $I(1, 2)$ لإتمام المنحنى على \mathbb{R} .



الأستاذ: عثمانى نجيب

5. مبيانيا، نلاحظ أن المستقيم ذا المعادلة $y = 3$ يقطع المنحنى (C_f) مرتين على المجال $]-\infty, 1]$.

ومن المعادلة $f(x) = 3$ تقبل حلين على المجال $]-\infty, 1]$.

مثال 2 : دراسة دالة متخاطة:

نعتبر الدالة العددية g المعرفة ب: $g(x) = \frac{x+2}{x-1}$

1. حدد حيز تعريف الدالة g .

2. أحسب نهايات الدالة g في محداث حيز التعريف و أول النتائج هندسيا.

3. أحسب الدالة المشتقة. ثم ضع جدول تغيرات الدالة g .

4. أنشئ منحنى الدالة g .

5. حل مبيانيا المتراجحة $-2 < g(x) < 2$.

الحل:

1. حيز تعريف الدالة g هو: $D = \{x \in \mathbb{R} / x - 1 \neq 0\} = \mathbb{R} - \{1\}$

و منه $D =]-\infty, 1[\cup]1, +\infty[$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x+2}{x-1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{x} = 1 \text{ و } \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x+2}{x-1} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{x} = 1 \quad .2$$

يعني المستقيم ذا المعادلة $y = 1$ مقارب أفقي للمنحنى (C_f) .

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x+2}{x-1} = -\infty \text{ و } \lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x+2}{x-1} = +\infty$$

يعني المستقيم ذا المعادلة $x = 1$ مقارب عمودي للمنحنى.


$$g'(x) = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -1 \end{vmatrix}}{(x-1)^2} = \frac{-3}{(x-1)^2} \quad .3 \text{ لكل } x \text{ من } D \text{ لدينا:}$$

يعني: $(\forall x \in D) g'(x) < 0$

جدول تغيرات الدالة

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$g'(x)$		-	-
$g(x)$	1		1

.4 منحنى الدالة g .



.5 لدينا $g(0) = -2$ و $g(4) = 2$

مجموعة حلول المتراجحة $-2 < g(x) < 2$ هي:

$$S =]-\infty, 0[\cup]4, +\infty[$$

.VI دراسة الدالة $(a \neq 0) x \mapsto \sqrt{ax+b}$

.1 مجموعة تعريف الدالة $(a \neq 0) x \mapsto \sqrt{ax+b}$

مجموعة تعريف الدالة $(a \neq 0) f : x \mapsto \sqrt{ax+b}$ هي:

في جميع الحالات يجب أن يكون $ax + b \geq 0$.

لدينا: $f\left(-\frac{b}{a}\right) = 0$ في الحالتين.

▪ إذا كان $a > 0$ $D_f = \left[-\frac{b}{a}, +\infty\right[$

▪ إذا كان $a < 0$ $D_f = \left]-\infty, -\frac{b}{a}\right]$

2. **نهايات الدالة** $x \mapsto \sqrt{ax + b}$ ($a \neq 0$):

▪ إذا كان $a > 0$ فإن $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{ax + b} = +\infty$

▪ إذا كان $a < 0$ فإن $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{ax + b} = +\infty$

3. **اشتقاق الدالة** $x \mapsto \sqrt{ax + b}$ ($a \neq 0$):

نعتبر الدالة العددية f المعرفة ب: $(a \neq 0)f(x) = \sqrt{ax + b}$

▪ إذا كان $a > 0$ فإن الدالة f غير قابلة للاشتقاق في النقطة $-\frac{b}{a}$ و قابلة للاشتقاق على $\left]-\frac{b}{a}, +\infty\right[$

فان: $\left(\forall x \in \left]-\frac{b}{a}, +\infty\right[\right) f'(x) = \frac{a}{2\sqrt{ax + b}}$

▪ إذا كان $a < 0$ فإن الدالة f غير قابلة للاشتقاق في النقطة $-\frac{b}{a}$ و قابلة

للاشتقاق على $\left]-\infty, -\frac{b}{a}\right]$ فان: $\left(\forall x \in \left]-\infty, -\frac{b}{a}\right]\right) f'(x) = \frac{a}{2\sqrt{ax + b}}$

إذا كان $a > 0$ فان

يعني $\frac{a}{2\sqrt{ax + b}} > 0$

$f'(x) > 0$

إذا كان $a < 0$ فان

يعني $\frac{a}{2\sqrt{ax + b}} < 0$

$f'(x) < 0$

4. **جدول تغيرات الدالة** $x \mapsto \sqrt{ax + b}$ ($a \neq 0$):

حالة $a < 0$

x	$-\infty$	$-\frac{b}{a}$	$+\infty$
f'		-	
f(x)	$+\infty$		0

حالة $a < 0$

x	$-\frac{b}{a}$	$+\infty$
f'(x)		+
f(x)	0	$+\infty$

ملاحظة: الرمز || يعني أن الدالة f غير قابلة للاشتقاق في النقطة $-\frac{b}{a}$

مثال: لدراسة الدالة من قبيل $x \mapsto \sqrt{ax + b}$ ($a \neq 0$):

نعتبر الدالة العددية f المعرفة ب: $f(x) = \sqrt{3x - 5}$

1. حدد D حيز تعريف الدالة f .

2. أحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

3. أدرس قابلية اشتقاق الدالة في النقطة $\frac{5}{3}$ على اليمين.

4. أحسب $f'(x)$ و ضع جدول تغيرات الدالة f .

5. أحسب $f(2)$ و $f(3)$ و $f(7)$.

6. مثل مبيانيا الدالة f في معلم متعامد ممنظم.

الحل:

1. $f(x)$ معرفة إذا فقط إذا كان $3x - 5 \geq 0$ يعني $3x \geq 5$ ومنه $x \geq \frac{5}{3}$

يعني حيز تعريف الدالة f هو: $D = \left[\frac{5}{3}, +\infty \right[$

$$2. \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} = +\infty \text{ و } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5}{x} = 0 \text{ لأن } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x \left(3 - \frac{5}{x} \right)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} \sqrt{3 - \frac{5}{x}} = +\infty$$

$$3. \text{ نحسب النهاية } \lim_{x \rightarrow \left(\frac{5}{3}\right)^+} \frac{f(x) - f\left(\frac{5}{3}\right)}{x - \frac{5}{3}}$$

$$\text{لدينا: } \frac{f(x) - f\left(\frac{5}{3}\right)}{x - \frac{5}{3}} = \frac{\sqrt{3x-5} - 0}{x - \frac{5}{3}} = \frac{3\sqrt{3x-5}}{3x-5} = \frac{3}{\sqrt{3x-5}}$$

$$\text{لدينا: } \lim_{x \rightarrow \left(\frac{5}{3}\right)^+} \sqrt{3x-5} = 0 \text{ و } \left(\forall x > \frac{5}{3}\right): \sqrt{3x-5} > 0 \text{ ومنه } \lim_{x \rightarrow \left(\frac{5}{3}\right)^+} \frac{f(x) - f\left(\frac{5}{3}\right)}{x - \frac{5}{3}} = +\infty$$

هذا يعني أن الدالة f غير قابلة للاشتقاق في $\frac{5}{3}$ على اليمين.

$$4. \text{ لدينا: } f'(x) = \frac{3}{2\sqrt{3x-5}} \left(\forall x \in \left] \frac{5}{3}, +\infty \right[\right)$$

بما أن $\frac{3}{2} > 0$ و $\sqrt{3x-5} > 0$ فان: $f'(x) > 0$.

جدول التغيرات:

x	$\frac{5}{3}$	$+\infty$
$f'(x)$		+
$f(x)$	0	$+\infty$

$$5. \text{ لدينا: } f(2) = \sqrt{3 \times 2 - 5} = \sqrt{1} = 1$$

$$\text{ و } f(3) = \sqrt{3 \times 3 - 5} = \sqrt{4} = 2$$

$$\text{ و } f(7) = \sqrt{3 \times 7 - 5} = \sqrt{16} = 4$$

6. التمثيل المبياني:

$$\left(\frac{5}{3}\right) = 0 \text{ يعني أن النقطة } A \left(\frac{5}{3}, 0\right) \text{ تنتمي لـ } (C_f).$$

$$f(2) = 1 \text{ يعني أن النقطة } B(2, 1) \text{ تنتمي لـ } (C_f).$$

$$f(3) = 2 \text{ يعني أن النقطة } B(3, 2) \text{ تنتمي لـ } (C_f).$$

$$f(7) = 4 \text{ يعني أن النقطة } B(7, 4) \text{ تنتمي لـ } (C_f).$$

