

## المادة : الرياضيات

مستوى: السنة الثانية من سلك البكالوريا

- شعبة التعليم الأصيل: مسلك العلوم الشرعية و مسلك اللغة العربية
- شعبة الآداب و العلوم الإنسانية: مسلك الآداب و مسلك العلوم الإنسانية

**ذكرة رقم 1 في درس المتتاليات الترجعية**

**ذكرة رقم : 1**  
الأستاذ : عثمانى نجيب

الأهداف القدرات المنتظرة من الدرس :

توجيهات تربوية	القدرات المنتظرة	محتوى البرنامج
<ul style="list-style-type: none"> <li>- نقيل أن المتتاليات <math>(u_n)_{n \geq 0}</math> و <math>(n^2)_{n \geq 0}</math> و <math>(n^3)_{n \geq 0}</math> و <math>(\sqrt{n})_{n \geq 0}</math> حيث <math>p</math> عدد صحيح طبيعي أكبر من 3 تؤول إلى <math>\infty</math> + عندما يؤول <math>n</math> إلى <math>\infty</math> + وأن المتتاليات <math>(\frac{1}{n})_{n \geq 0}</math> و <math>(\frac{1}{n^2})_{n \geq 0}</math> و <math>(\frac{1}{n^3})_{n \geq 0}</math> و <math>(\frac{1}{\sqrt{n}})_{n \geq 0}</math> عدد صحيح طبيعي أكبر من 3، تؤول إلى 0 عندما يؤول <math>n</math> إلى <math>\infty</math> + اعتبارا لكون المتتالية العددية دالة عدديه معرفة على مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية؛</li> <li>- جميع النهايات الواردة في محتوى البرنامج تعتبر نهايات مرجعية؛</li> <li>- تعتبر العمليات على النهايات المنهية واللامنهية مقبولة وينبغي تعويد التلميذ على الاستعمال الصحيح لها؛</li> <li>- إن أي دراسة نظرية لمفهوم نهاية متتالية تعتبر خارج البرنامج</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- استعمال المتتاليات الهندسية والمتتاليات الحسابية في دراسة أمثلة من متتاليات من الشكل: <math>u_{n+1} = au_n + b</math></li> <li>- استعمال نهايات المتتاليات المرجعية: <math>(\frac{1}{n^2})_{n \geq 0}</math> و <math>(\frac{1}{n^3})_{n \geq 0}</math> و <math>(\frac{1}{\sqrt{n}})_{n \geq 0}</math> حيث <math>p</math> عدد صحيح طبيعي أكبر من 3،</li> <li>- استعمال نهايات المتتاليات العددية لتحديد نهايات متتاليات عدديه؛</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- المتتاليات من الشكل: <math>u_{n+1} = au_n + b</math> و تمثيلها مبيانا؛</li> <li>- نهايات المتتاليات المرجعية: <math>(\frac{1}{n^2})_{n \geq 0}</math> و <math>(\frac{1}{n^3})_{n \geq 0}</math> و <math>(\frac{1}{\sqrt{n}})_{n \geq 0}</math> حيث <math>p</math> عدد صحيح طبيعي أكبر من 3،</li> <li>- نهايات المتتاليات المرجعية: <math>(\frac{1}{n^2})_{n \geq 0}</math> و <math>(\frac{1}{n^3})_{n \geq 0}</math> و <math>(\frac{1}{\sqrt{n}})_{n \geq 0}</math> حيث <math>p</math> عدد صحيح طبيعي أكبر من 3؛</li> <li>- نهاية متتالية هندسية <math>(a^n)</math> حيث <math>a \in \mathbb{R}</math>.</li> <li>- العمليات على النهايات؛</li> </ul>

**I. المتتاليات الحسابية: تذكر**

نشاط: لاحظ ثم أتم باربعه أعداد ملائمة لتسلسل كل متتالية من المتتاليات التالية :

(1) ..... , 10 , 8 , 6 , 4 , 2 , 0

(2) ..... , -12 , -9 , -6 , -3 , 0 , 3 , 6

(3) ..... , 243 , 81 , 27 , 9 , 3 , 1

(4) ..... ,  $\frac{1}{32}$  ,  $\frac{1}{16}$  ,  $\frac{1}{8}$  ,  $\frac{1}{4}$  ,  $\frac{1}{2}$

(5) ..... , 36 , 25 , 16 , 9 , 4 , 1

**مثال 1:** نعتبر المتتالية العددية  $(u_n)_{n \geq 0}$  المعرفة بالصيغة الصريحة التالية :• أحسب حدها الأول  $u_0$ • أحسب الحدود الأربع الأولى للمتتالية  $(u_n)_{n \geq 0}$ 

• أحسب  $\forall n \in \mathbb{N} \quad u_{n+1} - u_n$

الجواب :  $u_0 = 2 \times 0 - 1 = 0 - 1 = -1$

$u_1 = 2 \times 1 - 1 = 2 - 1 = 1$

$u_2 = 2 \times 2 - 1 = 4 - 1 = 3$

$u_3 = 2 \times 3 - 1 = 6 - 1 = 5$

نلاحظ أن فرق حدين متتاليين هو العدد 2

$u_{n+1} - u_n = (2(n+1) - 1) - (2n - 1) = (2n + 2 - 1) - (2n - 1)$

$u_{n+1} - u_n = 2 = r = (2n + 2 - 1) - (2n - 1) = (2n + 1) - (2n - 1) = 2n + 1 - 2n + 1$

اذن:  $r = 2$  ومنه المتتالية  $(u_n)_{n \geq 0}$  هي حسابية أساسها :**تعريف:** نقول إن  $(u_n)_{n \geq I}$  متتالية حسابية إذا وجد عدد حقيقي  $r$  بحيث :العدد الحقيقي  $r$  يسمى أساس المتتالية  $(u_n)_{n \geq n_0}$

**تمرين 1:** نعتبر المتالية العددية  $(u_n)$  المعرفة كالتالي :  $\forall n \in \mathbb{N} \quad u_n = 2n + 3$

1. أحسب :  $u_{n+1} - u_n$

2. ماذا تستنتج ؟

الجواب :

$$u_{n+1} - u_n = (2(n+1) + 3) - (2n + 3) = (2n + 2 + 3) - (2n + 3)$$

$$= (2n + 2 + 3) - (2n + 3) = (2n + 5) - (2n + 3) = 2n + 5 - 2n - 3$$

اذن :  $u_{n+1} - u_n = 2 = r$

ومنه المتالية  $(u_n)_{n \in I}$  هي حسابية أساسها :  $r = 2$

### 2. صيغة الحد العام للمتالية بدلالة $n$ :

إذا كانت  $(u_n)$  متالية حسابية أساسها  $r$  وحدتها الأول  $u_0$  فان :  $u_n = u_0 + (n-0)r$

إذا كانت  $(u_n)$  متالية حسابية أساسها  $r$  وحدتها الأول  $u_1$  فان :  $u_n = u_1 + (n-1)r$

إذا كانت  $(u_n)$  متالية حسابية أساسها  $r$  وحدتها الأول  $u_2$  فان :  $u_n = u_2 + (n-2)r$

### 3. مجموع حدود متتابعة لمتالية حسابية :

لتكن  $(u_n)_{n \in I}$  متالية حسابية

نضع  $n > p \geq n_0$  حيث  $S_n = u_p + u_{p+1} + u_{p+2} + \dots + u_n$

$$\text{لدينا } S_n = (n-p+1) \left( \frac{u_n + u_p}{2} \right)$$

المجموع  $S_n = u_p + u_{p+1} + u_{p+2} + \dots + u_n$  يحتوي على  $(n-p+1)$  حد

مثال :

1. لتكن  $(u_n)$  متالية حسابية أساسها  $r = \frac{1}{2}$  وحدتها الأول  $1$

أحسب المجموع التالي :  $S_1 = u_3 + u_4 + u_5 + \dots + u_{30}$

2. لتكن  $(u_n)$  متالية حسابية أساسها  $r = -2$  وحدتها الأول  $4$

أحسب المجموع التالي :  $S_2 = u_7 + u_8 + u_9 + \dots + u_{25}$

$$\text{الجواب: } S_1 = u_3 + u_4 + u_5 + \dots + u_{30} = (30-3+1) \frac{u_3 + u_{30}}{2}$$

$$S_1 = (28) \frac{u_3 + u_{30}}{2}$$

وبما أن  $(u_n)$  متالية حسابية أساسها  $r = \frac{1}{2}$  وحدتها الأول  $1$  فان :  $u_0 = \frac{1}{2}$

$$u_n = 1 + \frac{n}{2} \text{ أي: } u_n = 1 + (n-0) \frac{1}{2}$$

$$u_{30} = 1 + \frac{30}{2} = \frac{32}{2} = 16 \text{ و } u_3 = 1 + \frac{3}{2} = \frac{5}{2}$$

$$S_1 = (28) \frac{u_3 + u_{30}}{2} = 14 \left( \frac{5}{2} + 16 \right) = 14 \left( \frac{37}{2} \right) = 7 \times 37 = 259$$

$$S_2 = u_7 + u_8 + u_9 + \dots + u_{25} = (25-7+1) \frac{u_7 + u_{25}}{2} = (19) \frac{u_7 + u_{25}}{2} \quad (2)$$

وبما أن  $(u_n)$  متالية حسابية أساسها  $r = -2$  وحدتها الأول  $4$  فان :  $u_0 = 4$

$$\text{أي: } u_n = 4 - 2n \quad u_n = 4 + (n-0)(-2)$$

$$u_{25} = 4 - 2 \times 25 = 4 - 50 = -46 \quad u_7 = 4 - 2 \times 7 = 4 - 14 = -10$$

$$\text{وبالتالي: } S_2 = (19) \frac{u_7 + u_{25}}{2} = (19) \frac{-10 + -46}{2} = (19) \frac{-56}{2} = 19 \times -28 = -532$$

**تمرين 2:** نعتبر المتالية العددية  $(u_n)_{n \geq 0}$  المعرفة بالصيغة التالية :  $\forall n \in \mathbb{N} \quad u_n = 3n + 1$

1. تحقق أن  $(u_n)_{n \geq 0}$  حسابية

2. أحسب المجموع :  $S_6 = u_1 + u_2 + u_3 + \dots + u_6$

الجواب : (1)

$$u_{n+1} - u_n = (3(n+1) + 1) - (3n + 1) = (3n + 3 + 1) - (3n + 1) = 3$$

اذن:  $(u_n)_{n \geq 0}$  حسابية و  $u_{n+1} - u_n = 3 = r$

$$S_6 = u_1 + u_2 + \dots + u_6 = (6-1+1) \frac{u_1 + u_6}{2} \quad (2)$$

$$S_6 = (6) \frac{u_1 + u_6}{2} = 3(u_1 + u_6)$$

وبما أن  $(u_n)$  متالية حسابية أساسها  $3$  وحدتها الأول  $u_0 = 1$  فان :

$$u_n = 1 + 3n \quad \text{أي: } u_n = 1 + (n-0)3$$

$$u_6 = 1 + 3 \times 6 = 19 \quad \text{و } u_1 = 1 + 3 \times 1 = 4$$

ومنه نحسب:  $u_6 = 1 + 3 \times 6 = 19$  و  $u_1 = 1 + 3 \times 1 = 4$

$$S_6 = 3(4+19) = 3 \times 23 = 69$$

**تمرين 3:** نعتبر متالية حسابية  $(u_n)_{n \geq 0}$  أساسها  $3$  وحدتها الأول  $u_0 = 3$  و  $r = 2$  :

1. أحسب  $u_1$  و  $u_2$  و  $u_3$  و  $\dots$

2. أكتب بدلالة  $n$

3. أحسب المجموع :  $S_6 = u_1 + u_2 + u_3 + \dots + u_{10}$

$$\text{الجواب: } u_1 = u_0 + r = 3 + 2 = 5$$

$$u_2 = u_1 + r = 5 + 2 = 7$$

$$u_3 = u_2 + r = 7 + 2 = 9$$

وبما أن  $(u_n)$  متالية حسابية أساسها  $2$  وحدتها الأول  $u_0 = 3$  فان :

$$u_n = 2n + 3 \quad \text{أي: } u_n = 3 + 2(n-0)$$

$$S = u_0 + u_1 + \dots + u_{10} = (10-0+1) \frac{u_0 + u_{10}}{2} \quad (3)$$

$$S_6 = 11 \frac{u_0 + u_{10}}{2} = \frac{11}{2}(3+u_{10})$$

$$\text{ومنه نحسب: } u_{10} = 2 \times 10 + 3 = 23$$

$$S = \frac{11}{2}(3+23) = \frac{11}{2} \times 26 = 11 \times 13 = 143$$

## II. المتاليات الهندسية

1. **تعريف:** نقول إن  $(u_n)_{n \in I}$  متالية هندسية إذا وجد عدد حقيقي  $q$  بحيث :

العدد الحقيقي  $q$  يسمى أساس المتالية  $(u_n)_{n \geq n_0}$

**مثال :** نعتبر المتالية العددية  $(u_n)_{n \geq 0}$  المعرفة بالصيغة الصريرة التالية :

1. أحسب حدتها الأول  $u_0$

2. أحسب  $\frac{u_{n+1}}{u_n}$  ماذا تستنتج ؟

الجواب: (1)

$$u_0 = 2 \times 3^0 = 2 \times 1 = 2$$

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{2 \times 3^{n+1}}{2 \times 3^n} = \frac{3^{n+1}}{3^n} = \frac{3^n \times 3^1}{3^n} = 3^1 = 3 = q \quad (2)$$

اذن: المتالية  $(u_n)_{n \geq 0}$  هندسية أساسها  $q = 3$  وحدتها الأول  $2$

**تمرين 4:** نعتبر المتالية العددية  $(u_n)$  المعرفة كالتالي :

بين أن  $(u_n)$  متالية هندسية و حدد أساسها و حدتها الأول

$$\text{الجواب: } u_0 = 3 \times \left(\frac{2}{5}\right)^0 = 3 \times 1 = 3 \quad (1)$$

اذن: المتالية  $(u_n)_{n \geq 0}$  هندسية أساسها  $\frac{2}{5} = q$  وحدتها الأول  $3$

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{3 \times \left(\frac{2}{5}\right)^{n+1}}{3 \times \left(\frac{2}{5}\right)^n} = \frac{\left(\frac{2}{5}\right)^{n+1}}{\left(\frac{2}{5}\right)^n} = \frac{\left(\frac{2}{5}\right)^n \times \left(\frac{2}{5}\right)^1}{\left(\frac{2}{5}\right)^n} = \frac{2}{5} = q \quad (2)$$

## 2. صيغة الحد العام للمتالية بدلالة $n$ :

إذا كانت  $(u_n)$  متالية هندسية أساسها  $q$  غير منعدم وحدها الأول  $u_0$  فان :

$u_n = u_0 q^{n-0}$  غير منعدم وحدها الأول  $u_1$  فان :

**نتيجة :** إذا كانت  $(u_n)_{n \geq n_0}$  متالية هندسية أساسها  $q$  غير منعدم فان : لكل  $m \geq n_0$  و  $n \geq n_0$   $u_n = u_m q^{n-m}$

**مثال:** تعتبر المتالية الهندسية  $(u_n)$  بحيث حدها الأول  $u_0 = 81$  وأساسها  $q$  :

1. أكتب  $u_n$  بدلالة  $n$

2. أحسب  $u_1$  و  $u_2$  و  $u_3$

3. حدد العدد الصحيح الطبيعي  $n$  بحيث  $u_n = 1$

الأجوبة : (1) نعلم أن  $(u_n)_{n \geq 0}$  متالية هندسية أساسها  $q = \frac{1}{3}$  وحدها الأول  $u_0 = 81$

$$\text{اذن: } u_n = 81 \times \left(\frac{1}{3}\right)^n. \quad u_n = u_0 q^{n-0}$$

$$u_3 = 81 \times \left(\frac{1}{3}\right)^3 = \frac{81}{27} = 3 \quad \text{و} \quad u_2 = 81 \times \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{81}{9} = 9 \quad \text{و} \quad u_1 = 81 \times \left(\frac{1}{3}\right)^1 = \frac{81}{3} = 27 \quad (2)$$

$$n = 4 \quad \text{يعني} \quad u_n = 1 \quad \text{يعني} \quad 81 \times \left(\frac{1}{3}\right)^n = 1 \quad \text{يعني} \quad 81 \times \frac{1}{3^n} = 1 \quad \text{يعني} \quad 3^n = 81 \quad \text{يعني} \quad 3^n = 3^4 \quad \text{يعني} \quad n = 4$$

**تمرين 5:** تعتبر المتالية الهندسية  $(u_n)$  بحيث حدها الأول  $u_0 = 40$  و  $u_3 = 5$

1. تحقق أن أساس المتالية  $(u_n)$  هو  $q = 2$

2. أكتب  $u_n$  بدلالة  $n$

3. أحسب  $u_4$

4. حدد العدد الصحيح الطبيعي  $n$  بحيث  $u_n = 160$

الأجوبة : (1) نعلم أن  $(u_n)_{n \geq 0}$  متالية هندسية اذن :

$$\text{اذن: } q = 2 \quad \text{يعني: } u_3 = u_0 q^{3-0} \quad \text{يعني: } q^3 = 8 \quad \text{يعني: } q = \sqrt[3]{8} = 2$$

$$u_n = 5 \times (2)^n \quad (2)$$

$$u_4 = 5 \times (2)^4 = 5 \times 16 = 80 \quad \text{و} \quad u_2 = 81 \times \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{81}{9} = 9 \quad \text{و} \quad u_1 = 81 \times \left(\frac{1}{3}\right)^1 = \frac{81}{3} = 27 \quad (3)$$

$$u_5 = 2 \times u_4 = 2 \times 80 = 160 \quad \text{و} \quad u_2 = 81 \times \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{81}{9} = 9 \quad \text{و} \quad u_1 = 81 \times \left(\frac{1}{3}\right)^1 = \frac{81}{3} = 27 \quad (4)$$

ومنه :  $n = 5$

### 3. مجموع حدود متتابعة لمتالية هندسية :

لتكن  $S_n = u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_n$  مجموع نصع متالية هندسية أساسها  $q$  غير منعدم نضع

$$\text{إذا كان } q \neq 1 \quad \text{فإن: } S_n = u_0 \left( \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} \right)$$

**تمرين 6:** تعتبر المتالية العددية  $(u_n)_{n \geq 0}$  المعرفة بالصيغة التالية :

1. تتحقق أن  $(u_n)_{n \geq 0}$  هندسية

2. عبر عن  $U_n$  بدلالة  $n$

3. أحسب المجموع :

الجواب (1):

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{3 \times u_n}{u_n} = 3 = q$$

اذن: المتالية هندسية أساسها  $q = 3$  وحدها الأول  $u_0 = 3$

$u_0 = 3$  وحدتها الأولى  $q = 3$  هندسية أساسها  $(u_n)_{n \geq 0}$  (2)

اذن:  $u_n = 3 \times (3)^n = 3^1 \times (3)^n = (3)^{n+1}$  أي:  $u_n = u_0 q^{n-0}$

$$S_n = u_1 + u_2 + u_3 + \dots + u_5 = u_1 \times \frac{1-q^{5-1+1}}{1-q} = u_1 \times \frac{1-q^5}{1-q} \quad (3)$$

نحسب:  $u_1$ :

$$u_1 = 3^{1+1} = 3^2 = 9$$

$$S_n = 9 \times \frac{1-3^5}{1-3} = 9 \times \frac{1-3^5}{-2} = 9 \times \frac{1-243}{-2} = 9 \times \frac{-242}{-2} = 1029$$

### III. المتتاليات من صنف $U_{n+1} = aU_n + b$

**مثال 1:** نعتبر المتتالية العددية  $(u_n)$  المعرفة بالعلاقة الترجعية التالية :  
 $\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = 2u_n + 3 \end{cases}$

أحسب الحدود الأربع الأولي للمتتالية  $(u_n)$

الجواب : نعرض  $n$  ب 0 فجد:  $u_0 = 1$

$$\text{اذن: } u_1 = 5$$

نعرض  $n$  ب 1 فجد:  $u_1 = 2 \times u_0 + 3 = 2 \times 1 + 3 = 2 + 3 = 5$

$$\text{اذن: } u_2 = 13$$

نعرض  $n$  ب 2 فجد:  $u_2 = 2 \times u_1 + 3 = 2 \times 5 + 3 = 10 + 3 = 13$

$$\text{اذن: } u_3 = 29$$

**ملاحظة :** هذه المتتالية تسمى متتالية ترجعية

**مثال 2:** نعتبر المتتالية العددية  $(v_n)$  المعرفة كالتالي :  
 $\forall n \in \mathbb{N} \quad \begin{cases} v_{n+1} = 2v_n + 2 \\ v_0 = 2 \end{cases}$

ونعتبر المتتالية العددية  $(v_n)$  المعرفة كالتالي :  
 $\forall n \in \mathbb{N} \quad v_n = u_n + 2$

1. أحسب  $u_1$  و  $u_2$  و  $v_0$  و  $v_1$  و

2. أحسب  $\frac{v_{n+1}}{v_n}$  و استنتج طبيعة المتتالية  $(v_n)$

3. أكتب  $v_n$  بدالة  $n$

4. استنتاج  $u_n$  بدالة  $n$

الجواب: (1) نعرض  $n$  ب 0 فجد:  $u_0 = 2$

$$\text{اذن: } u_1 = 7$$

نعرض  $n$  ب 1 فجد:  $u_1 = 2 \times u_0 + 2 = 2 \times 2 + 2 = 4 + 2 = 16$

$$\text{اذن: } u_2 = 16$$

: نعرض  $n$  ب 0 فجد:  $v_0 = u_0 + 2 = 2 + 2 = 4$

نعرض  $n$  ب 1 فجد:  $v_1 = u_1 + 2 = 7 + 2 = 9$

$$\frac{v_{n+1}}{v_n} = \frac{u_{n+1} + 2}{u_n + 2} = \frac{2u_n + 2 + 2}{u_n + 2} = \frac{2u_n + 4}{u_n + 2} = \frac{2(u_n + 2)}{u_n + 2} = 2 = q \quad (2)$$

اذن: المتتالية  $(v_n)$  هندسية أساسها  $q = 2$  وحدتها الأولى 4

كتابة  $v_n$  بدالة  $n$  (3)

بما أن المتتالية  $(v_n)$  هندسية أساسها  $q = 2$  وحدتها الأولى 4

فإن:  $v_n = 4 \times 2^n$  أي:  $v_n = v_0 \times q^n$

استنتاج  $u_n$  بدالة  $n$  (4)

لدينا:  $v_n - 2 = u_n$  اذن:  $v_n = u_n + 2$ :

$$\text{أي: } u_n = 4 \times 2^n - 2$$

تمرين 7: نعتبر المتالية العددية  $(u_n)$  المعرفة كالتالي :

$$\forall n \in \mathbb{N} \begin{cases} u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n - \frac{1}{2} \\ u_0 = 3 \end{cases}$$

ونعتبر المتالية العددية  $(v_n)$  المعرفة كالتالي :  $v_n = u_n + 1$

1. أحسب  $u_1$  و  $v_0$  و  $v_1$  و  $v_2$ .

2. بين أن  $(v_n)$  متالية هندسية أساسها  $\frac{1}{2}$

3. أكتب  $v_n$  بدلالة  $n$  و استنتج  $u_n$  بدلالة  $n$

4. أحسب بدلالة  $n$  المجموع :

$$S = v_0 + v_1 + v_2 + \dots + v_n = u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_n = \frac{1}{2} \times u_0 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{2}\right)u_1 - \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}u_n - \frac{1}{2}$$

الجواب: (1) نعرض  $n$  بـ 0 فجده :

$$u_1 = -\frac{3}{2} \quad \text{اذن :}$$

$$u_2 = -\frac{9}{4} \quad u_{n+1} = \frac{1}{2} \times u_1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \times \frac{3}{2} - 3 = \frac{3}{4} - 3 = -\frac{9}{4} \quad \text{اذن :}$$

نعرض  $n$  بـ 1 فجده :

$$v_0 = u_0 + 1 = 3 + 1 = 4 \quad \text{نعرض } n \text{ بـ 0 فجده :}$$

نعرض  $n$  بـ 1 فجده :

$$\frac{v_{n+1}}{v_n} = \frac{u_{n+1} + 1}{u_n + 1} = \frac{\frac{1}{2}u_n - \frac{1}{2} + 1}{u_n + 1} = \frac{\frac{1}{2}u_n + \frac{1}{2}}{u_n + 1} = \frac{\frac{1}{2}(u_n + 1)}{u_n + 1} = \frac{1}{2} = q \quad (2)$$

اذن: المتالية  $(v_n)$  هندسية أساسها  $q = \frac{1}{2}$  وحدتها الأولى 4

كتابة  $v_n$  بدلالة  $n$  (3)

بما أن المتالية  $(v_n)$  هندسية أساسها  $q = \frac{1}{2}$  وحدتها الأولى 4

$$\text{فإن: } v_n = 4 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n \quad \text{أي: } v_n = v_0 \times q^n$$

استنتاج  $u_n$  بدلالة  $n$

$$v_n - 1 = u_n \quad \text{اذن: } v_n = u_n + 1$$

$$\text{أي: } u_n = 4 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n - 1$$

$$S = v_0 + v_1 + v_2 + \dots + v_n \quad (4)$$

$$S_n = v_0 \times \frac{1 - q^{n-0+1}}{1 - q} = 3 \times \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{2}} = 3 \times \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{\frac{1}{2}} = 6 \times \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right)$$

تمرين 8: نعتبر المتالية العددية  $(u_n)$  المعرفة كالتالي :

$$\forall n \in \mathbb{N} \begin{cases} u_{n+1} = \frac{3}{2}u_n - 1 \\ u_0 = -1 \end{cases}$$

ونعتبر المتالية العددية  $(v_n)$  المعرفة كالتالي :  $v_n = u_n - 2$

1. أحسب  $u_1$  و  $v_0$  و  $v_1$  و  $v_2$ .

2. بين أن  $(v_n)$  متالية هندسية أساسها  $\frac{3}{2}$

3. أكتب  $v_n$  بدلالة  $n$  و استنتاج  $u_n$  بدلالة  $n$

الجواب: (1) نعرض  $n$  بـ 0 فجده :

$$u_1 = -\frac{5}{2} \quad \text{اذن: } u_{n+1} = \frac{3}{2} \times u_0 - 1 = \frac{3}{2} \times (-1) - 1 = -\frac{3}{2} - 1 = -\frac{5}{2} \quad \text{اذن :}$$

نعرض  $n$  بـ 1 فجده :

$$u_2 = -\frac{15}{4} \quad \text{اذن: } u_{n+1} = \frac{3}{2} \times u_n - 1 = \frac{3}{2} \times \left( -\frac{15}{4} \right) - 1 = -\frac{15}{4} - 1 = -\frac{15}{4} - \frac{4}{4} = -\frac{19}{4}$$

: نعوض  $n$  ب 0 فجده :

$$v_1 = u_0 - 2 = -1 - 2 = -3 \quad \text{نعم} n \text{ ب 1 فجده :}$$

$$\frac{v_{n+1}}{v_n} = \frac{u_{n+1} - 2}{u_n - 2} = \frac{\frac{3}{2}u_n - 3}{u_n - 2} = \frac{\frac{3}{2}u_n - \frac{6}{2}}{u_n - 2} = \frac{\frac{3}{2}(u_n - 2)}{u_n - 2} = \frac{3}{2} = q \quad (2)$$

اذن: المتالية  $(v_n)$  هندسية أساسها  $q = \frac{3}{2}$  وحدتها الأول  $v_0 = 4$

كتابة  $v_n$  بدلالة  $n$  (3)

$$\text{بما أن المتالية } (v_n) \text{ هندسية أساسها } q = \frac{3}{2} \text{ وحدتها الأول } v_0 = -3$$

$$\text{فإن: } v_n = (-3) \times \left( \frac{3}{2} \right)^n$$

استنتاج  $v_n$  بدلالة  $n$

$$\text{لدينا: } u_n = -3 \left( \frac{3}{2} \right)^n + 2 \quad \text{اذن: } v_n = u_n - 2$$

**تمرين 9:** نعتبر المتالية العددية  $(u_n)$  المعرفة كالتالي :

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad \begin{cases} u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n - 3 \\ u_0 = 2 \end{cases}$$

ونعتبر المتالية العددية  $(v_n)$  المعرفة كالتالي :

1. أحسب  $u_1$  و  $u_2$  و  $v_0$  و  $v_1$  و

2. بين أن  $(v_n)$  متالية هندسية أساسها  $\frac{1}{2}$

3. أكتب  $v_n$  بدلالة  $n$  و استنتاج  $u_n$  بدلالة  $n$

الجواب: 1) نعوض  $n$  ب 0 فجده :

$$u_1 = -2 \quad \text{اذن: } u_{n+1} = \frac{1}{2} \times u_n - 3 = \frac{1}{2} \times 2 - 3 = 1 - 3 = -2$$

نعوض  $n$  ب 1 فجده :

$$u_2 = -\frac{15}{4} \quad \text{اذن: } u_{n+1} = \frac{1}{2} \times u_n - 3 = \frac{1}{2} \times (-2) - 3 = -1 - 3 = -4$$

: نعوض  $n$  ب 0 فجده :

$v_0 = u_0 + 6 = 2 + 6 = 8$

نعوض  $n$  ب 1 فجده :

$$\frac{v_{n+1}}{v_n} = \frac{u_{n+1} + 6}{u_n + 6} = \frac{\frac{1}{2}u_n - 3 + 6}{u_n + 6} = \frac{\frac{1}{2}u_n + 3}{u_n + 6} = \frac{\frac{1}{2}u_n + \frac{6}{2}}{u_n + 6} = \frac{\frac{1}{2}(u_n + 6)}{u_n + 6} = \frac{1}{2} = q \quad (2)$$

اذن: المتالية  $(v_n)$  هندسية أساسها  $q = \frac{1}{2}$  وحدتها الأول  $v_0 = 8$

كتابة  $v_n$  بدلالة  $n$  (3)

$$\text{بما أن المتالية } (v_n) \text{ هندسية أساسها } q = \frac{1}{2} \text{ وحدتها الأول } v_0 = 8$$

$$\text{فإن: } v_n = 8 \times \left( \frac{1}{2} \right)^n$$

استنتاج  $v_n$  بدلالة  $n$

$$\text{لدينا: } u_n = 8 \left( \frac{1}{2} \right)^n - 6 \quad \text{اذن: } v_n = u_n + 6$$

تمرين 10: نعتبر المتالية العددية  $(u_n)$  المعرفة كالتالي :

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad \begin{cases} u_{n+1} = \frac{2}{3}u_n + 1 \\ u_0 = 10 \end{cases}$$

ونعتبر المتالية العددية  $(v_n)$  المعرفة كالتالي :

1. أحسب  $v_1$  و  $v_0$  و  $v_1$  و  $v_0$

2. بين أن  $(v_n)$  متالية هندسية أساسها  $\frac{2}{3}$

3. أكتب  $v_n$  بدلالة  $n$  واستنتج  $u_n$  بدلالة  $n$

$$u_1 = \frac{23}{3} \quad u_0 = \frac{2}{3}u_0 + 1 = \frac{2}{3} \times 10 + 1 = \frac{20}{3} + 1 = \frac{20}{3} + \frac{3}{3} = \frac{23}{3}$$

الجواب: 1) نعرض  $n=0$  فنجد :

$$u_2 = \frac{55}{9} \quad u_1 = \frac{2}{3} \times u_0 + 1 = \frac{2}{3} \times \frac{23}{3} + 1 = \frac{46}{9} + 1 = \frac{46}{9} + \frac{9}{9} = \frac{55}{9}$$

نعرض  $n=1$  فنجد :

$$v_0 = u_0 - 3 = 10 - 3 = 7$$

نعرض  $n=0$  فنجد :

$$v_1 = u_1 - 3 = \frac{23}{3} - 3 = \frac{23}{3} - \frac{9}{3} = \frac{14}{3}$$

نعرض  $n=1$  فنجد :

$$\frac{v_{n+1}}{v_n} = \frac{u_{n+1} - 3}{u_n - 3} = \frac{\frac{2}{3}u_n + 1 - 3}{u_n - 3} = \frac{\frac{2}{3}u_n - 2}{u_n - 3} = \frac{\frac{2}{3}u_n - \frac{6}{3}}{u_n - 3} = \frac{\frac{2}{3}(u_n - 3)}{u_n - 3} = \frac{2}{3} = q$$

$$\text{اذن: المتالية } (v_n) \text{ هندسية أساسها } q = \frac{3}{2} \text{ وحدتها الأولى } 7$$

كتابة  $v_n$  بدلالة  $n$

$$v_0 = 7 \quad \text{بما أن المتالية } (v_n) \text{ هندسية أساسها } q = \frac{3}{2} \text{ وحدتها الأولى } 7$$

$$v_n = 7 \times \left(\frac{2}{3}\right)^n$$

استنتاج  $u_n$  بدلالة  $n$

$$u_n = 7 \left(\frac{2}{3}\right)^n + 3 \quad \text{اذن: } v_n + 3 = u_n \quad v_n = u_n - 3$$