

الأستاذ : الحيان	الأعداد العقدية	الثانية بكالوريا علوم رياضية
<p>تحقق من أن المميز المختصر Δ' يساوي $(\sqrt{3}j)^2$</p> <p>ب. حل المعادلة : (E_1)</p> <p>ج. أكتب حل المعادلة (E_1) على الشكل المتلثي وعلى الشكل λi و λj حيث : $(\lambda \in \mathbb{R})$</p> <p>2. أ. أنشر $P(z)$.</p> <p>ب. استنتج حلول المعادلة:</p> <p>$(E) : (z \in \mathbb{C} ; z^3 + 8i = 0)$</p> <p>3. لتكن a و b و c هي حلول المعادلة (E) بحيث :</p> <p>$\text{Re}(a) = 0$ و $\text{Re}(b) < 0$ و $\text{Re}(c) > 0$</p> <p>أ. تحقق من أن : $a + bj + cj^2 = 0$</p> <p>ب. في المستوى المنسوب الى معلم متعامد ممنظم ومباشر (O, \vec{u}, \vec{v}) ؛ تعتبر على التوالي النقط A و B و C التي ألقاها على التوالي هي : a و b و c.</p> <p>بين أن ABC مثلث متساوي الأضلاع.</p> <p>التمرين 4 : نضع :</p> $\forall z \in \mathbb{C} - \{i\} : P(z) = \frac{2z - i}{z - i}$ <p>و $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ / $z = x + iy$</p> <p>1. أ. حدد $\text{Re}(P(z))$ بدلالة x و y ، حيث :</p> <p>$\text{Re}(P(z))$ هو الجزء الحقيقي للعدد العقدي $P(z)$.</p> <p>ب. المستوى العقدي ρ منسوب الى معلم متعامد ممنظم مباشر (O, \vec{u}, \vec{v}) . حدد (Γ) مجموعة النقط $M(z)$ من ρ التي تحقق :</p> <p>$\text{Re}(P(z)) = 0$</p> <p>أ. بين أن :</p> $\forall z \in \mathbb{C} - \{i\}; [P(z) = z] \Leftrightarrow [z^2 - (2+i)z + i = 0]$ <p>ب. حل المعادلة : $z^2 - (2+i)z + i = 0$; $z \in \mathbb{C}$;</p> <p>ج. ليكن $\theta \in]0, \frac{\pi}{2}[$. أكتب على الشكل المتلثي كلا من العددين :</p> $1 + \cos(\theta) + i \sin(\theta)$ <p>و $1 - \cos(\theta) + i \sin(\theta)$.</p> <p>د. استنتج الشكل المتلثي لكل من العددين :</p> $\frac{2 - \sqrt{3} + i}{2} \quad \text{و} \quad \frac{2 + \sqrt{3} + i}{2}$ <p>التمرين 5 : لتكن $(S_n)_{n \geq 2}$ المتتالية العددية حيث :</p> $S_n = \sum_{k=0}^{n-1} \sin\left(\frac{k\pi}{n}\right)$ <p>1. بين بالترجع : صيغة موافر <i>Formule de Moivre</i></p> <p>$\forall \theta \in \mathbb{R}; \forall n \in \mathbb{N};$</p> $(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$ <p>2) نضع : $Z_n = \cos\left(\frac{\pi}{n}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{n}\right)$; $\forall n \geq 2$</p>	<p>التمرين 1 :</p> <p>I نعتبر المعادلة :</p> $(E) : z \in \mathbb{C}; z^3 - 4(1-i)z^2 + 16(1-i)z + 64i = 0$ <p>1. تحقق من أن العدد $-4i$ حل للمعادلة (E) .</p> <p>2. حل المعادلة (E) .</p> <p>3. نعتبر العدد z_k بحيث : $z_k = \left(\frac{1+i\sqrt{3}}{4}\right)^k - \left(\frac{1-i\sqrt{3}}{4}\right)^k$ و $k \in \mathbb{Z}$</p> <p>أثبت أن : $z_k = \frac{i}{2^{k-1}} \sin\left(\frac{k\pi}{3}\right)$ ثم استنتج أن : $z_{2001} = 0$.</p> <p>II المستوى العقدي منسوب إلى معلم متعامد ممنظم $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$.</p> <p>لتكن A صورة العدد z_A والنقطة B صورة العدد z_B بحيث :</p> $z_B = 2 - 2i\sqrt{3} \quad \text{و} \quad z_A = 2 + 2i\sqrt{3}$ <p>1. أنشئ النقطة C صورة العدد z_C بحيث : $z_C = \frac{3}{2}z_A + z_B$</p> <p>2. حدد عمدة للعدد $\frac{z_B - z_C}{z_A - z_C}$ واستنتج طبيعة المثلث ABC .</p> <p>التمرين 2 : نضع $\forall z \in \mathbb{C}^* : P(z) = z + \frac{4}{z}$</p> <p>1. حل في \mathbb{C} المعادلة : $(E) : P(z) = -2$</p> <p>2. نرسم z_1 و z_2 لحلي المعادلة (E) .</p> <p>أ. أكتب z_1 و z_2 على الشكل المتلثي .</p> <p>ب. بين أن : $z_1^{2001} + z_2^{2001} = 2^{2002}$</p> <p>3. المستوى العقدي منسوب إلى معلم متعامد ممنظم $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$.</p> <p>أ. لتكن النقط $A(\alpha)$ و $B(-1 + \sqrt{3})$ و $C(-1 - i\sqrt{3})$ حيث α عدد حقيقي موجب . حدد قيمة α لكي يكون المثلث ABC متساوي الأضلاع .</p> <p>ب. بين أن : $\forall z \in \mathbb{C}^* : P(z) = \overline{P(z)} \Leftrightarrow (z - \bar{z})(z\bar{z} - 4) = 0$</p> <p>ج. استنتج (Γ) مجموعة النقط $M(z)$ التي من أجلها يكون $P(z)$ عددا حقيقيا .</p> <p>د. تحقق من أن النقط A و B و C تنتمي الى المجموعة (Γ) .</p> <p>التمرين 3 :</p> <p>A نضع : $j = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$ j esl l'entier de JACOBI</p> <p>($j^3 = 1$ هو جذر من الرتبة الثالثة للوحدة :)</p> <p>1. تحقق من أن : $j^2 = \bar{j}$ و أن $1 + j + j^2 = 0$.</p> <p>2. أكتب على الشكل المتلثي العددين $2i$ و $2ij$.</p> <p>B نعتبر P و Q التطبيقين من \mathbb{C} نحو \mathbb{C} المعرفين كما يلي :</p> $Q(z) = z^2 + 2ij^2z - 4j \quad \text{و} \quad P(z) = (z - 2i\bar{j})Q(z)$ <p>1. أ. نعتبر المعادلة : $(E_1) : (z \in \mathbb{C}; Q(z) = 0)$</p>	

التمرين 8 : الحذور من الرتبة الخامسة للوحدة .

إنشاء الخمس المنتظم .

(Pentagone - régulier).

$$z_0 = \cos\left(\frac{2\pi}{5}\right) + i \sin\left(\frac{2\pi}{5}\right) \quad \text{ليكن}$$

1. نضع : $\alpha = z_0 + z_0^4$ و $\beta = z_0^2 + z_0^3$

أ. بين أن : $1 + z_0 + z_0^2 + z_0^3 + z_0^4 = 0$

واستنتج أن α و β هما حلا المعادلة :

$$(*) : X^2 + X - 1 = 0$$

ب. أوجد α بدلالة $\cos\left(\frac{2\pi}{5}\right)$.

ج. حل المعادلة (*) واستنتج قيمة $\cos\left(\frac{2\pi}{5}\right)$.

2. لتكن A_0 و A_1 و A_2 و A_3 و A_4 النقط التي أحاقها على التوالي

هي 1 و z_0 و z_0^2 و z_0^3 و z_0^4 في المستوى المنسوب الى معلم

متعامد ممنظم ومباشر (O, \vec{u}, \vec{v}) .

أ. لتكن H نقطة تقاطع المستقيم (A_1A_4) و المحور (O, \vec{u}) .

$$\overline{OH} = \cos\left(\frac{2\pi}{5}\right) \quad \text{بين أن :}$$

ب. الدائرة التي مركزها النقطة Ω , ذات اللق $-\frac{1}{2}$, والمارة من

النقطة B , ذات اللق i , تقطع المحور (O, \vec{u}) في نقطتين M

و N (نسمي النقطة التي أفصولها موجب)

بين أن : $\overline{OM} = \alpha$ و $\overline{ON} = \beta$

و أن H منتصف القطعة $[OM]$.

ج. استنتج إنشاء لمخمس منتظم مركزه O ومارا من نقطة A_0 .

التمرين 9 : نعتبر الدالة P المعرفة على \mathbb{R} بما يلي :

$$\forall x \in \mathbb{R} : P(x) = \frac{1}{2i} \left[\left(1 + i \frac{x}{8}\right)^8 - \left(1 - i \frac{x}{8}\right)^8 \right]$$

1. بين أن P دالة حدودية معاملات أعداد حقيقية . ثم حدد درجتها وأدرس زوجيتها.

2. أ. حل في \mathbb{C} المعادلة $z^8 = 1$, نعطي الحلول على شكلها الجبري .

ب. حل المعادلة : $P(x) = 0$: $x \in \mathbb{R}$

التمرين 10 : نعتبر الدالة الحدودية P من \mathbb{C} الى \mathbb{C} المعرفة

$$P(z) = (z - i)^n - (i - \bar{z})^n \quad \text{بما يلي :}$$

حيث $n \in \mathbb{N}^*$ و \bar{z} مرافق العدد العقدي z .

1. لتكن A و M و M' صور الأعداد i و z و \bar{z} على التوالي في المستوى العقدي .

أ. بين أنه إذا كان z حلا للمعادلة $P(z) = 0$ فإن : $AM = AM'$

ب. استنتج أنه إذا كان z حلا للمعادلة $P(z) = 0$ فإن : عدد

حقيقي .

(2) حل المعادلة $P(z) = 0$.

أحسب المجموع : $\sum_{k=0}^{n-1} Z_n^k$ لكل $n \geq 2$.

$$3. \text{ بين أن : } \forall n \geq 2 : \frac{2}{1 - Z_n} = 1 + i \frac{1}{\tan\left(\frac{\pi}{2n}\right)}$$

$$4. \text{ استنتج أن : } \forall n \geq 2 : S_n = \frac{1}{\tan\left(\frac{\pi}{2n}\right)}$$

(5) أحسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{S_n}{n}$.

التمرين 6 : في المستوى العقدي المنسوب الى معلم متعامد ممنظم ومباشر $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$; نعتبر النقط A و B و C التي أحاقها على

التوالي هي a و b و c ; ونعتبر \vec{u}_1 و \vec{u}_2 متجهتين غير منعدمتين

بحيث : $Aff(\vec{u}_1) = z_1$ و $Aff(\vec{u}_2) = z_2$

1. بين أن : \vec{u}_1 و \vec{u}_2 مستقيمتان $\Leftrightarrow z_1 \bar{z}_2 - \bar{z}_1 z_2 = 0$

2. بين أن : $\vec{u}_1 \perp \vec{u}_2 \Leftrightarrow z_1 \bar{z}_2 + \bar{z}_1 z_2 = 0$

3. بين أن : $\overline{u_1 u_2} = \text{Re}(z_1 \bar{z}_2) = \frac{1}{2}(z_1 \bar{z}_2 + \bar{z}_1 z_2)$

4. ليكن $j = -\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2}$ و Ω نقطة لحقها ω .

أ. ليكن R الدوران الذي مركزه Ω وزاويته $\frac{\pi}{3}$.

بين أنه إذا كانت النقطة M' , التي لحقها z' , هي صورة النقطة

M , التي لحقها z , بالدوران R , فإن :

$$z' = -j^2 z - j\omega$$

(ب) استنتج أن : ABC مثلث متساوي الأضلاع

$$\Leftrightarrow a + bj + cj^2 = 0 \quad \text{أو} \quad a + bj^2 + cj = 0$$

$$\Leftrightarrow a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca = 0$$

$$\Leftrightarrow (a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2 = 0$$

ج. حدد الأعداد العقدية z التي من أجلها يكون المثلث ABC

متساوي الأضلاع, حيث : $a = i$ و $b = z$ و $c = iz$.

5. بين أن : النقط A و B و C مستقيمية

$$\Leftrightarrow \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ \bar{a} & \bar{b} & \bar{c} \end{vmatrix} = 0$$

التمرين 7 :

1. بين أن : $\forall x \in \mathbb{R} : e^{2ix} - 1 = 2i \sin(x) e^{ix}$

2. حل في \mathbb{C} المعادلة التالية :

$$(Z + 1)^n = e^{2in a} \quad (n \in \mathbb{N}^* \text{ و } a \in \mathbb{R})$$

3. نضع : $\forall n \in \mathbb{N}^* : P_n = \prod_{k=0}^{n-1} \sin\left(a + \frac{k\pi}{n}\right)$

أثبت أن : $P_n = \frac{\sin(na)}{2^{n-1}}$

التمرين 11 : يكن f التطبيق من $\mathbb{C} - \{i\}$ نحو $\mathbb{C} - \{i\}$

$$f(z) = \frac{iz}{z-i} \quad \text{المعرف بما يلي :}$$

في المستوى المنسوب إلى معلم متعامد ممنظم (O, \vec{u}, \vec{v}) ؛ نعتبر

النقطة B ذات اللوح i ؛ ونربط كل نقطة M بلحقتها z .

$$1. \text{ حدد المجموعتين : } (E_1) = \{M(z) / f(z) \in \mathbb{R}\}$$

$$(E_2) = \{M(z) / f(z) \in i\mathbb{R}\} \text{ و}$$

$$2. \text{ حل في } \mathbb{C} - \{i\} \text{ المعادلة : } f(z) = -2z + 1.$$

$$3. \text{ ليكن } z \in \mathbb{C} - \{i\}. \text{ نعتبر } r \text{ معيار } z - i \text{ و } \alpha \text{ قياسا لعمدة } z - i.$$

أ. أكتب $f(z) - i$ على الشكل المثلثي.

$$\text{ب. حدد } (C), \text{ مجموعة النقط } M(z) \text{ بحيث : } |f(z) - i| = \sqrt{2}$$

$$\text{ج. حدد } (D), \text{ مجموعة النقط } M(z) \text{ بحيث يكون } \frac{\pi}{4} \text{ قياسا لعمدة}$$

$$f(z) - i.$$

$$\text{د. حدد } z_0 \text{ بحيث } f(z_0) = 1 + 2i.$$

لتكن A النقطة ذات اللوح z_0 .

تحقق من أن A تنتمي إلى (C) و (D) .

أرسم (C) و (D) .

التمرين 12 : في المستوى الأفليدي \mathcal{P} المنسوب إلى معلم متعامد

ممنظم مباشر $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$ ، نعتبر النقطتين $A(i)$ و $A'(-i)$ وليكن f

$$\text{التطبيق من } \mathbb{C} - \{i\} \text{ نحو } \mathbb{C} \text{ والمعرف بما يلي : } f(z) = \frac{\bar{z}(z-i)}{z+i}$$

وليكن F التطبيق من $\mathcal{P} - \{A\}$ نحو \mathcal{P} الذي يربط كل نقطة

$$M(z) \text{ بالنقطة } M'(z') \text{ حيث : } z' = f(z).$$

1. أثبت أنه إذا كان $z \neq 0$ و $z' \neq 0$ فإن :

$$|z| = |z'| \text{ و } \arg(z') \equiv -\arg(z) + 2\arg(z-i) [2\pi]$$

(لاحظ أن $z - i$ و $\bar{z} + i$ مترافقان)

ب. بين أنه إذا كان $|z| = 1$ فإن $f(z) = -i$.

2. أ. حدد مجموعة النقط الصامدة بالتطبيق F .

ب. ماهي مجموعة النقط $M(z)$ بحيث تكون $f(z)$ على شكل

ai مع a عنصر من \mathbb{R} ؟

$$3. \text{ أ. أثبت أن : } z' + i = \frac{\bar{z}\bar{z} - 1}{|\bar{z} + i|^2} (z - i)$$

$$\text{وأن : } z' - z = \frac{-i(z + \bar{z})}{|\bar{z} + i|^2} (z - i)$$

ب. استنتج أن المتجهين \vec{AM} و $\vec{A'M'}$ مستقيمان.

وأن \vec{AM} و $\vec{MM'}$ متعامدان.

ج. أعط طريقة للإنشاء الهندسي لصورة M بالتطبيق F .

التمرين 13 : α عدد حقيقي ينتمي إلى المجال $[0, 2\pi[$.

$$1. \text{ أ. حل في } \mathbb{C} \text{ المعادلة : } z^2 + i(2^{\alpha+1} \cdot \sin(\alpha))z - 2^{2\alpha} = 0$$

ب. أكتب الحلين على شكلهما المثلثي.

$$2. \text{ المستوى العقدي منسوب إلى معلم متعامد ممنظم } (O, \vec{u}, \vec{v}).$$

نعتبر A و B صورتين حلي المعادلة السابقة.

حدد α لكي يكون المثلث OAB متساوي الأضلاع.

التمرين 14 : ليكن θ عددا حقيقيا. لكل z من \mathbb{C} . نضع :

$$P(z) = z^3 + (1 + 3ie^{i\theta})z^2 + (1 + i(1 + 3e^{i\theta}))z + (3i - 3)e^{i\theta}$$

$$1. \text{ بين أن } z_1 = -3ie^{i\theta} \text{ حل للمعادلة : } P(z) = 0, z \in \mathbb{C} (E)$$

2. أ. حدد العددين العقديين a و b بحيث :

$$P(z) = (z + 3ie^{i\theta})(z^2 + az + b) \text{ لكل } z \text{ من } \mathbb{C}.$$

ب. ليكن z_2 و z_3 الحلين الآخرين للمعادلة (E) .

حدد z_2 و z_3 (z_2 هو الحل التخيلي الصرف)

3. أ. أكتب z_1 و z_2 و z_3 على الشكل المثلثي.

ب. نضع : $\theta = \frac{\pi}{10}$. حدد الشكل الجبري للعدد العقدي α

$$\text{حيث : } \alpha = z_1^5 + z_2^5 + z_3^5$$

التمرين 15 : لكل عدد عقدي z ؛ نضع :

$$P(z) = 2iz^3 + 2(2-i)z^2 - (3+2i)z + i$$

$$1. \text{ أ. أوجد العدد الحقيقي } \alpha \text{ بحيث : } P(i\alpha) = 0$$

$$\text{ب. تحقق أن : } P(z) = (z - \alpha i)Q(z)$$

$$\text{حيث : } Q(z) = ((1+i)z - i)^2$$

2. نعتبر المعادلة :

$$(E) : z \in \mathbb{C} : z^2 - (m - i(m+1))z - im^2 - m = 0$$

حيث m بارامتر حقيقي.

أ. بين أن مميز المعادلة (E) هو $Q(m)$.

ب. حدد الجدرين z' و z'' للمعادلة (E) علما أن $|z'| = |m|$.

3. نضع $m = 2 \cos(\theta) + i \sin(\theta)$ حيث $\theta \in [0, \pi]$ ،

$$\text{ونعتبر المجموعة : } (C) = \{M(z'') / \theta \in [0, \pi]\}$$

أ. بين أن (C) جزء من إهليلج ينبغي تحديد معادلته ورؤوسه في

المعلم (O, \vec{i}, \vec{j}) .

ب. أنشئ (C) في المعلم (O, \vec{i}, \vec{j}) .

$$4. \text{ نضع : } m = \frac{2}{\cos(\theta)} + 3i \tan(\theta) \text{ حيث } \theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$$

$$\text{ونعتبر المجموعة : } (C') = \left\{M(z') / \theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]\right\}$$

أ. بين أن (C') جزء من هذلول (H) ينبغي تحديد معادلته ورؤوسه

ومقاربيه في المعلم (O, \vec{i}, \vec{j}) .

ب. أنشئ (H) و (C') في المعلم (O, \vec{i}, \vec{j}) .

التمرين 16 :

لكل z من المجموعة \mathbb{C} نضع :

$$t(z) = z^2 - \sqrt{2}z + i\sqrt{3}$$

4. أ. بين أن معادلة المماس (T) للمنحنى (Γ) في النقطة P هي :

$$3x \cos(\theta) + 5y \sin(\theta) = 15$$

ب. بين أن المماس (T) عمودي على المستقيم (M_1M_2).

التمرين 18 :

1. حل في \mathbb{C} , المعادلة : $z^2 + z + 1 = 0$

2. لكل عدد عقدي z حيث : $z = e^{i\theta} = \cos(\theta) + i \sin(\theta)$

مع $-\pi \leq \theta \leq \pi$ و $\theta \neq \frac{2\pi}{3}$ و $\theta \neq -\frac{2\pi}{3}$ ؛

نضع : $z' = \frac{1}{z^2 + z + 1}$

أ. تحقق من أن : $1 + z + z^2 = z(1 + z + \bar{z})$

ب. أحسب معيار وعمدة z' بدلالة θ .

ج. نضع $z' = x + iy$ حيث x و y عدنان حقيقيان .

بين أن : $x^2 + y^2 = (1 - 2x)^2$

د. استنتج أن النقطة M ذات اللق z' , تنتمي إلى هذلول يتم تحديده مركزه ورأسه ومقاربيه .

التمرين 19 : المستوى العقدي منسوب إلى معلم متعامد ممنظم مباشر (O, \vec{u}, \vec{v}) ؛ ليكن a عددا عقديا غير منعدم شكله الجبري هو :

$$a = \alpha + i\beta$$

1. لتكن (H) مجموعة النقط M التي لحقها z يحقق :

$$z^2 - (\bar{z})^2 = a^2 - (\bar{a})^2 \quad (\bar{u} \text{ هو مرافق العدد العقدي } u)$$

أ. حدد طبيعة (H) .

ب. أنشئ (H) في الحالة : $a = 1 + i$

2. لتكن (C) مجموعة النقط M التي لحقها z يحقق :

$$(z - a)(\bar{z} - \bar{a}) = 4a\bar{a}$$

أ. حدد طبيعة (C) .

ب. أنشئ (C) في الحالة : $a = 1 + i$

3. نعتبر في المجموعة \mathbb{C} , النظمة التالية :

$$(S) : \begin{cases} z^2 - (\bar{z})^2 = a^2 - (\bar{a})^2 \\ (z - a)(\bar{z} - \bar{a}) = 4a\bar{a} \end{cases} \quad \text{ونضع : } u = z - a$$

أ. بين أن النظمة (S) تكافئ النظمة :

$$(S') : \begin{cases} u\bar{u} = 4a\bar{a} \\ (u + 2a)(u^3 - 8a(\bar{a})^2) = 0 \end{cases}$$

ب. نضع $a = re^{i\theta}$ حيث $r > 0$ و $-\pi < \theta \leq \pi$

حدد ؛ بدلالة r و θ ؛ ألقاق نقط تقاطع (C) و (H) .

ج. استنتج أن تقاطع (C) و (H) يتضمن ثلاث نقط هي رؤوس

لمثلث متساوي الأضلاع .

التمرين 20 : في المستوى العقدي المنسوب إلى معلم متعامد

ممنظم ؛ نعتبر النقط I و A و M و M' التي ألقاقها على التوالي :

1 و 2 و z و z' حيث z' و z عدنان عقديان .

1. نعتبر في \mathbb{C} المعادلة التالية : $t(z) = -i\sqrt{3}$ ؛

وليكن z_1 و z_2 حلها بحيث z_1 يحقق : $\text{Im}(z_1) < 0$.

أ. حدد z_1 و z_2 .

ب. أكتب z_1 و z_2 على الشكل المثالي .

ج. حدد مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية n بحيث : $\left(\frac{z_1}{z_2}\right)^n \in \mathbb{R}$

2. المستوى العقدي (ρ) منسوب إلى معلم متعامد ممنظم مباشر

$$(O, \vec{u}, \vec{v})$$

أ. نعتبر المجموعة : $E = \{M(z) / t(z) \in i\mathbb{R}\}$

بين أن E هذلول يتم تحديده مركزه ورأسه ومقاربيه في المعلم

$$(O, \vec{u}, \vec{v})$$

ب. لتكن (C) الدائرة التي مركزها النقطة Ω ذات اللق $\frac{\sqrt{2}}{2}$

وشعاعها $r = \frac{\sqrt{2}}{2}$ و M النقطة ذات اللق z و M' النقطة

ذات اللق $t(z)$. بين أنه إذا كانت M تنتمي إلى الدائرة (C)

فإن M' تنتمي إلى دائرة (C') يتم تحديده مركزها وشعاعها .

ج. أنشئ E و (C) و (C') في المعلم (O, \vec{u}, \vec{v}) .

التمرين 17 : ليكن θ عددا حقيقيا بحيث : $0 \leq \theta < 2\pi$

نضع : $p = 5 \cos(\theta) + 3i \sin(\theta)$

نعتبر في \mathbb{C} المعادلة (E) التالية : $z^2 - 2pz + 16 = 0$: (E) .

1. أ. تحقق أن : $p^2 - (3 \cos(\theta) + 5i \sin(\theta))^2 = 16$

ب. حل في \mathbb{C} المعادلة (E) .

نرمز ب z_1 و z_2 لحلي المعادلة (E) بحيث : $|z_1| < |z_2|$.

2. المستوى العقدي (ρ) منسوب إلى معلم متعامد ممنظم مباشر

(O, \vec{u}, \vec{v}) ؛ نعتبر النقطتين M_1 و M_2 اللتين ألقاقهما على التوالي

هما z_1 و z_2 .

أ. بين أنه عندما يتغير العدد θ في المجال $[0, 2\pi[$ ، فإن النقطة M_1

تتغير على دائرة (C) ينبغي تحديده معادلة لها .

ب. لتكن P منتصف القطعة $[M_1M_2]$. ولتكن (Γ) مجموعة

النقط P عندما يتغير العدد θ في المجال $[0, 2\pi[$.

بين أن (Γ) إهليلج بؤرتاه هما النقطتان F و F' اللتين ألقاقهما

على التوالي هما 4 و -4 .

3. أ. بين أنه لكل عددين عقديين a و b من $\mathbb{C} - \{4\}$ ، لدينا :

$$\left(\frac{b+4}{b-4} = -\frac{a+4}{a-4}\right) \Leftrightarrow (ab = 16)$$

ب. استنتج أن : $\frac{z_2 + 4}{z_2 - 4} = -\frac{z_1 + 4}{z_1 - 4}$

ج. بين أن : $[2\pi] \equiv \overline{(M_1F, M_1F')} \equiv \pi + \overline{(M_2F, M_2F')}$

1. بين أن المخروطي (H) ؛ إذا المعادلة $x^2 - y^2 - 2x = 0$ ؛
هذلول محدد رأسيه ومقاربيه .

2. بوضع : $z = x + iy$ و $z' = x' + iy'$ حيث x و y و x' و y' أعداد حقيقية ؛ أوجد بدلالة x و y و x' و y' الجزء الحقيقي للعدد : $(z'-1)^2 + (z-1)^2 - 1$

3. نفترض أن : $(z'-1)^2 + (z-1)^2 = 1$ بحيث :

$$z \notin \{0, 1, 2\} \quad \text{و} \quad z' \notin \{0, 1, 2\}$$

أ. بين أنه إذا كان $M \in (H)$ فإن M' تنتمي إلى اتحاد مستقيمين يجب تحديد معادلة ديكارتية لكل منهما .

$$\text{ب. بين أن : } \overline{IM'^2} = \overline{OM} \times \overline{MA} \\ \text{و أن : } \overline{(OM, IM')} \equiv \overline{(IM', MA)} [2\pi]$$

ج. بين أن :

$$MA^2 + MO^2 + 2IM^2 = 2[z\bar{z} - (z+\bar{z}) + z'z' - (z'+\bar{z}') + 3]$$

د. بين أن : $MA + MO = M'A + M'O$

التمرين 21 : نعتبر التطبيق f_a من $\mathbb{C} - \{a\}$ نحو $\mathbb{C} - \{a\}$

المعرف بما يلي : $f_a(z) = \frac{az}{z-a}$ حيث $a \in \mathbb{C}^*$

1. بين أن : $f_a(z) \in i\mathbb{R} \Leftrightarrow |z|^2 \operatorname{Re}(a) = |a|^2 \operatorname{Re}(z)$

2. ليكن $z \in \mathbb{C} - \{a\}$

نضع : $r = |z-a|$ و $\arg(z-a) \equiv \theta [2\pi]$

أحسب $|f_a(z) - a|$ بدلالة r و $|a|$ ؛

وأحسب $\arg(f_a(z) - a)$ بدلالة θ و $\arg(a)$

3. نضع في ما يلي : $a = -1 + i$ و نعتبر في المستوى (ρ) المنسوب

إلى معلم متعامد ممنظم مباشر (O, \vec{u}, \vec{v}) ،

المجموعات : $(C) = \{M(z) / |f_a(z) - a| = 2\}$

و $(E) = \{M(z) / f_a(z) \in i\mathbb{R}\}$

و $(D) = \left\{M(z) / \arg(f_a(z) - a) \equiv \frac{3\pi}{4} [2\pi]\right\}$

أ. حدد كلا من (E) و (C) و بين أن (D) نصف مستقيم طرفه

$A(a)$ محروم من $A(a)$ محددًا معادلة ديكارتية له .

ب. ليكن z_0 عنصرًا من $\mathbb{C} - \{a\}$ والنقطة B ذات اللوح z_0

بحيث $B \in (D) \cap (C)$.

أكتب $f(z_0)$ على الشكل الجبري ثم استنتج z_0 .

ج. أنشئ المجموعات (C) و (E) و (D) .

التمرين 22 : لتكن $U = \{z \in \mathbb{C} / |z| = 1\}$

1. بين أن : $-1 \leq \operatorname{Re}(z) \leq 1$ و $-1 \leq \operatorname{Im}(z) \leq 1$

2. ليكن $(a, b) \in U^2$.

$$\text{أ. بين أن : } \frac{(a+b)^2}{ab} = a\bar{b} + \bar{a}b + 2$$

ب. استنتج أن : $\frac{(a+b)^2}{ab}$ عدد حقيقي موجب .

3. ليكن z_1 و z_2 عددين عقديين غير منعدمين .

نعتبر في المستوى المنسوب إلى معلم متعامد ممنظم مباشر

(O, \vec{u}, \vec{v}) ، النقطتين M_1 و M_2 اللتين لحقاهما على التوالي هما

z_1 و z_2 . وليكن t لحق النقطة G مرجح النظمة المترنة

$$\text{نضع : } \left\{ \left(M_1, \frac{1}{|z_1|} \right); \left(M_2, \frac{1}{|z_2|} \right) \right\} \\ \text{ب. } a = \frac{z_1}{|z_1|} \quad \text{و} \quad b = \frac{z_2}{|z_2|}$$

$$\text{أ. بين أن : } \frac{t^2}{z_1 z_2} = \frac{(a+b)^2}{ab} \times \frac{|z_1| |z_2|}{(|z_1| + |z_2|)^2}$$

ب. نفترض أن : $a + b \neq 0$.

بين أن المستقيم (OG) هو حامل منصف الزاوية الموجهة

$$(\overline{OM_1}, \overline{OM_2})$$

تطبيق : نعتبر النقطتين A و B اللتين لحقاهما على التوالي هما

$2 + i$ و $-2 + 11i$. حدد معادلة ديكارتية لحامل

منصف الزاوية الموجهة $(\overline{OA}, \overline{OB})$.

التمرين 23 : المستوى العقدي منسوب إلى معلم متعامد ممنظم

مباشر $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$.

لكل z من \mathbb{C} ؛ نضع $f(z) = z^2 - 2jz - 1$ حيث $j = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}$

1. حل في \mathbb{C} المعادلة : $f(z) = 0$.

2. ليكن التطبيق : $F : \rho \rightarrow \rho$

$$M(z) \mapsto M'(f(z))$$

ولتكن (C) الدائرة التي مركزها $A(j)$ و شعاعها r و (D) المستقيم

الذي يمر من A ومعامله الموجه $\tan(\theta)$ حيث $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$.

أ. تحقق من أن : $\forall z \in \mathbb{C} : f(z) - j = (z-j)^2$

ب. حدد طبيعة صورة كل من المجموعتين (C) و (D) بالتطبيق F .

التمرين 24 : المستوى العقدي منسوب إلى معلم متعامد ممنظم

و مباشر $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$.

1. نعتبر التطبيق φ المعرف على المجموعة \mathbb{C}^* بما يلي :

$$\forall z \in \mathbb{C}^* : \varphi(z) = \frac{1}{2} \left(z + \frac{1}{z} \right)$$

أ. حل في \mathbb{C} المعادلة : $\varphi(z) = i$.

ب. نضع $z = re^{i\theta}$ حيث : $r > 0$ و $0 \leq \theta < 2\pi$.

عبر ؛ بدلالة r و θ ؛ عن الجزء الحقيقي وعن الجزء التخيلي

للعدد العقدي $\varphi(z)$.

2. نعتبر التطبيق f من ρ^* نحو ρ الذي يربط كل نقطة $M(z)$

بالنقطة $M'(\varphi(z))$. لتكن (C_r) الدائرة التي مركزها O

و شعاعها r .

ب. أحسب z_1^6 و z_2^6 و z_3^6 و z_4^6 .
 3. أ. أحسب $(\sqrt{3}-i)^3$ و $(-8i)^2$.
 ب. حدد على الشكل الجبري حلول المعادلة :
 $z \in \mathbb{C} : z^6 + 64 = 0$

التمرين 27 : لكل عدد عقدي z مخالف للعدد -1 ؛ نضع :

$$f(z) = \frac{iz - 1}{(z + 1)^2}$$

1. أ. حدد العدد الحقيقي y بحيث : $f(iy) = iy$.
 ب. حل في \mathbb{C} المعادلة : $f(z) = z$: (E) .
 نرسم z_0 و z_1 و z_2 لحلول المعادلة (E) حيث :
 $\Re(z_1) > \Re(z_2)$ و $\Re(z_0) = 0$.
 2. أ. تحقق أن : $z_1 + 1 = e^{i\frac{11\pi}{6}}$ و $z_2 + 1 = e^{i\frac{7\pi}{6}}$.
 ب. استنتج الكتابة المتأنيثة لكل من العددين z_1 و z_2 .
 3. في هذا السؤال نفترض أن $z = e^{i\alpha}$ حيث $0 \leq \alpha < \pi$.
 أ. بين أن : $f(z) = izf(z)$.

ب. حدد α إذا علمت أن : $f(z) + \overline{f(z)} = 0$.
 ج. أكتب $f(z)$ على الشكل $re^{i\varphi}$ حيث :
 $(r, \varphi) \in \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}$.

4. حدد z إذا علمت أن :

$$\begin{cases} |z| = 1 \\ \Re(f(z)) = \frac{1}{2} \end{cases}$$

التمرين 28 : في المستوى المنسوب إلى معلم متعامد منظم

(O, \vec{i}, \vec{j}) ؛ نعتبر المنحنى (C_m) الذي معادلته هي :

$$\frac{x^2}{10-m} + \frac{y^2}{2-m} = 1 ; m \in \mathbb{R} \setminus \{2, 10\}$$

I. 1. ناقش حسب قيم m ؛ طبيعة المنحنى (C_m) .
 2. إذا كان (C_m) مخروطيا ؛ أعط عناصره المميزة .
 3. أرسم (C_1) .
 II. نعتبر في مجموعة الأعداد العقدية \mathbb{C} المعادلة ذات المجهول z :
 $(E) : z^2 - (6\cos(\alpha))z + 1 + 8\cos^2(\alpha) = 0$

حيث : $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$.

1. حل في \mathbb{C} المعادلة (E) .

لتكن z_1 و z_2 حلي المعادلة (E) ($\Im m(z_1) > 0$) و M_1 و M_2 النقطتين ذات اللحيين z_1 و z_2 على التوالي .

2. أ. تحقق أن : $M_1 \in (C_1)$.

ب. بين أنه توجد نقطتان P_1 و P_2 من (C_1) حيث يكون فيهما

المماس للمنحنى (C_1) مولزيا للمستقيم (OM_1) .

ج. تحقق أن : $OM_1^2 + OP_1^2 = OM_2^2 + OP_2^2$.

أ. بين أن : $M(z) \in (C_r) \Leftrightarrow (\exists \theta \in [0, 2\pi]) / z = re^{i\theta}$.
 ب. بين أن صورة الدائرة (C_r) بالتطبيق f توجد ضمن مخروطي (E_r) يجب تحديد معادلة مختصرة له ، ثم استنتج أن (E_r) إهليلج بؤراته $F(1)$ و $F(-1)$.

3. لتكن $M(z)$ نقطة من (E_r) و $M'(z')$ نقطة من المستوى ρ

بحيث : $z'^2 + z^2 = 1$.

أ. بين أن : $OM'^2 = MF \times MF'$

(لاحظ أن : $z'^2 = (1-z)(1+z)$)

ب. استنتج أن : $2\arg(z') \equiv \arg(1-z) + \arg(-1-z) + \pi [2\pi]$.

ج. استنتج أن نصف المستقيم $[OM')$ عمودي على منصف الزاوية

الموجبة $(\overline{MF}, \overline{MF'})$.

د. بين أن : $(MF + MF')^2 = 2(|z|^2 + |z'|^2 + 1)$

ثم استنتج أن النقطة $M'(z')$ تنتمي إلى الإهليلج (E_r) .

أحسب بدلالة r المجموع : $|z|^2 + |z'|^2$.

التمرين 25 :

1. أ. حل المعادلة $z \in \mathbb{C} : z^2 + (1+i)z + 2i = 0$

نعتبر التطبيق P حيث : $P(z) = z^3 + 2 - 2i$

أحسب $P(1+i)$ واستنتج تعميلال $P(z)$ ثم أعط ؛ على شكلهما

الجبري ؛ حلي المعادلة $z \in \mathbb{C} : P(z) = 0$.

ب. أعط على شكل مثلثي الجذور المكعبة للعدد العقدي $-2 + 2i$

ج. استنتج مما سبق $\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)$ و $\sin\left(\frac{\pi}{12}\right)$.

2. أ. أثبت أنه توجد ثلاث متتاليات هندسية $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ للأعداد العقدية

بحيث $u_6 = 2 + 2i$ و $u_3 = -i$ (أحسب الأساس q و الحد

الأول u_0 لكل متتالية من المتتاليات المحصل عليها)

ب. لتكن $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$ المتتالية العقدية المعرفة بما يلي :

$$\begin{cases} z_0 = \frac{1}{4}(-1+i) \\ z_{n+1} = (1+i)z_n ; n \in \mathbb{N} \end{cases}$$

✓ أحسب z_n بدلالة n .

✓ أكتب z_n على شكل مثلثي .

✓ حدد قيم العدد الصحيح n لكي يكون z_n حقيقيا .

التمرين 26 :

1. أ. أحسب $(3 + \sqrt{3}i)^2$.

ب. حل في \mathbb{C} المعادلة :

$$Z^2 + 2(1 - \sqrt{3}i)Z - 8(1 + \sqrt{3}i) = 0$$

2. نرسم بالأعداد z_1 و z_2 و z_3 و z_4 لحلول المعادلة :

$$(E) : z \in \mathbb{C}, z^4 + 2(1 - \sqrt{3}i)z^2 - 8(1 + \sqrt{3}i) = 0$$

أ. أكتب على الشكل الجبري حلول المعادلة (E) .