

البنيات الجبرية

1) قانون التركيب الداخلي:

قانون تركيب داخلي

لتكن E مجموعة كل تطبيق f من $E \times E$ نحو E يسمى قانون تركيب داخلي في E

$$f : E \times E \rightarrow E$$

$$(x, y) \mapsto f(x, y)$$

غالباً ما نرمز لـ $x * y$ بـ $f(x, y)$ أو $x \text{Ty}$ أو $x * y$ ونكتب $(E, *)$ إن المجموعة E مزودة بقانون التركيب الداخلي *

جزء مستقر

لتكن E مزودة بقانون تركيب داخلي * و ليكن S جزءاً من E نقول إن S جزء مستقر من $(E, *)$ إذا كان : $(\forall (x, y) \in S^2) x * y \in S$

خصائص قوانين التركيب الداخلية

ليكن * قانون تركيب داخلي في E

- ❖ * تجمعي في E $\Leftrightarrow (\forall (x, y, z) \in E^3) x * (y * z) = (x * y) * z$
- ❖ * تبادلي في E $\Leftrightarrow (\forall (x, y) \in E^2) x * y = y * x$

العنصر المحايد

ليكن * قانون تركيب داخلي في E و $e \in E$

- ✓ e عنصر محايد في E بالنسبة للقانون * $\Leftrightarrow (\forall x \in E) e * x = x \text{ و } x * e = x$
- ✓ إذا كان للقانون * عنصراً محايضاً فإنه وحيد

العنصر المماثل

ليكن * قانون تركيب داخلي في E بحيث * يقبل عنصراً محايضاً e و ليكن $x \in E$

- ✓ x يقبل مماثلاً في بالنسبة للقانون * إذا وفقط إذا وجد عنصر $'x$ من E بحيث $x * x' = x' * x = e$
- ✓ بالإضافة إذا كان القانون * تجمعي فإن $'x$ وحيد
- ✓ بالإضافة إذا كان القانون * تجمعي و كان $'x$ مماثل y فإن $'y$ مماثل y

العنصر المنتظم

ليكن * قانون تركيب داخلي في E . نقول إن عنصرا a من E منتظم إذا وفقط إذا كان :

$$(\forall(x,y) \in E^2) \quad \begin{cases} a*x = a*y \Rightarrow x = y \\ x*a = y*a \Rightarrow x = y \end{cases}$$

(2) التشاكل:

❖ ليكن * قانون تركيب داخلي في E و T قانون تركيب داخلي في F
نسمى تشاكل من $(E, *)$ نحو (F, T) كل تطبيق $f: E \rightarrow F$ يحقق :

$$(\forall(x,y) \in E^2) \quad f(x*y) = f(x)Tf(y)$$

❖ إذ كان f تشاكل من $(E, *)$ نحو (F, T) فإن f جزء مستقر من (F, T)

❖ إذ كان f تشاكل من $(E, *)$ نحو (F, T) و * تجمعي في E فإن T تجمعي في F

❖ إذ كان f تشاكل من (F, T) نحو $(E, *)$ و * تبادلي في E فإن T تبادلي في F

❖ إذا كان e عنصر محايد في $(E, *)$ فإن $f(e)$ عنصر محايد في $(f(E), T)$

❖ إذا كان x' مماثل x في $(E, *)$ فإن $f(x') = f(x)$ هو مماثل $f(x)$ في $(f(E), T)$

(3) الزمرة:

لتكن G مجموعة مزودة بقانون تركيب داخلي *
نقول إن $(G, *)$ زمرة إذا وفقط إذا كان :

- * تجمعي في G
- يقبل عنصرا محايضا
- كل عنصر من G يقبل مماثلا

بالإضافة إذا كان القانون * تبادلي فإننا نقول أن $(G, *)$ زمرة تبادلية

» لتكن $(G, *)$ زمرة

▪ كل عنصر a من G منتظم

▪ ليكن a و b من G : كل من المعادلتين $x*a=b$ و $a*x=b$ تقبل حال وحيدا في G

زمرة جزئية

لتكن $(G, *)$ زمرة و H جزء مستقر من $(G, *)$

زمرة جزئية ل $(G, *)$ إذا وفقط إذا كان $(H, *)$ زمرة

لتكن $(G, *)$ زمرة عنصرها المحايد e و لتكن H زمرة جزئية لـ $(G, *)$ ، لدينا :

$$H \neq \emptyset \quad \circ$$

$$e \text{ هو العنصر المحايد في } H \quad \circ$$

$$\text{إذا كان } x \in H \text{ و } x' \in H \text{ مماثل } x \text{ في } G \text{ فإن } x' \in H \quad \circ$$

$$G \text{ حيث } (x, y) \in H^2 \text{ مماثل } y \text{ في } H \quad \circ$$

لتكن $(G, *)$ زمرة و H جزء من G . تكون H زمرة جزئية لـ $(G, *)$ إذا وفقط إذا كان :

$$H \neq \emptyset \quad \circ$$

$$G \text{ حيث } (x, y) \in H^2 \text{ مماثل } y \text{ في } H \quad \circ$$

تشاكل الزمرة

لتكن $(G, *)$ زمرة و لتكن E مزودة بقانون تركيب داخلي T و $f : (G, *) \rightarrow (E, T)$ تشاكل لدينا ما يلي :

$$(f(G), T) \text{ زمرة} \quad \bullet$$

$$\text{إذا كانت } (G, *) \text{ زمرة تبادلية فإن } (f(G), T) \text{ زمرة تبادلية} \quad \bullet$$

$$\text{إذا كان } f \text{ تشاكل شمولي، فإن } f(G) = E \text{ و منه } (E, T) \text{ زمرة.} \quad \bullet$$

الحلقة: 4

توزيعية قانون بالنسبة لآخر

لتكن E مجموعة مزودة بقانوني تركيب داخليين $*$ و T نقول أن T توزيعي بالنسبة لـ $*$ إذا وفقط إذا كان :

$$(\forall (x, y, z) \in E^3) \quad x T(y * z) = (x T y) * (x T z) \quad \bullet$$

$$(\forall (x, y, z) \in E^3) \quad (x * y) T z = (x T z) * (y T z) \quad \bullet$$

الحلقة

لتكن A مجموعة مزودة بقانوني تركيب داخليين $*$ و T نقول أن $(A, *, T)$ حلقة إذا وفقط إذا كان :

$$(A, *) \text{ زمرة تبادلية} \quad \bullet$$

$$T \text{ تجميلي} \quad \bullet$$

$$T \text{ توزيعي بالنسبة لـ *} \quad \bullet$$

✓ بالإضافة إذا كان القانون T تبادلي نقول إن الحلقة A تبادلية
 ✓ بالإضافة إذا كان للقانون T عنصر محايد ، نقول إن الحلقة A واحدية.

- لتكن $(A, *, T)$ حلقة صفرها e ، لدينا :
 ► لتكن $(A, *, T)$ حلقة صفرها e ونرمز بـ a' مماثل a في $(A, *)$ ، لدينا :

$$(\forall (a, b) \in A^2) \quad aTb' = a'Tb = (aTb)'$$

العناصر القابلة للماٹلة

لتكن $(A, *, T)$ حلقة واحدة وحدتها e
 نقول إن عنصرا a من A قابلا للماٹلة أو يقبل مقلوبا إذا كان له مماثلا بالنسبة لقانون T في

لتكن $(A, *, T)$ حلقة واحدة وحدتها e وlet U مجموعة العناصر القابلة للماٹلة ، لدينا : (U, T) زمرة

قواسم الصفر في حلقة

لتكن $(A, *, T)$ حلقة صفرها 0_A
 نقول إن عنصرا a من A قاسم للصفر إذا وفقط إذا كان : $b \neq 0_A$ و يوجد $a \neq 0_A$ بحيث :

لتكن $(A, *, T)$ حلقة
 نقول إن الحلقة $(A, *, T)$ كاملة إذا كانت لا تحتوي على قواسم للصفر

الجسم : (5)

لتكن K مجموعة مزودة بقانوني تركيب داخليين $*$ و T
 نقول إن $(K, *, T)$ جسم إذا وفقط إذا كان :

- $(K, *, T)$ حلقة واحدة
- كل عنصر يخالف صفر الحلقة يقبل مماثلا بالنسبة لـ T

ليكن $(K, +, \times)$ جسما
 لدينا كل عنصر من $K - \{0_A\}$ منتظم بالنسبة للضرب . يعني :

$$(\forall a \in K - \{0_A\}) (\forall (x, y) \in K^2) : \begin{cases} ax = a.y \Rightarrow x = y \\ x.a = y.a \Rightarrow x = y \end{cases}$$

ليكن $(K, +, \times)$ جسما . لدينا :

$$(\forall (x, y) \in K^2) : x.y = 0_K \Rightarrow x = 0_K \text{ أو } y = 0_K$$

 ► كل جسم هو حلقة كاملة

ليكن $(K, +, \times)$ جسما . نعتبر المعادلة $a \times x = b$

▪ إذا كان $a \neq 0_K$ فإن المعادلة تقبل حلًا وحيدا $x = a^{-1}b$

▪ إذا كان $a = 0_K$ و $b \neq 0_K$ فإن المعادلة ليس لها حل

▪ إذا كان $a = 0_K$ و $b = 0_K$ فإن $S = K$