

2004

لكل E مجموعة المصفوفات M_a مع $M_2(\mathbb{R})$ و التي تكتب على

$$\text{الشكل } M_a = \begin{pmatrix} a & \frac{1}{\sqrt{3}}(a-1) \\ 0 & \frac{1}{a} \end{pmatrix} \text{ مع } F \text{ مجموعة المصفوفات } N_a \text{ مع}$$

$$a \in \mathbb{R}^* \text{ مع } N_a = \begin{pmatrix} a & \frac{1}{\sqrt{3}}(a-1) \\ -a\sqrt{3} & -a \end{pmatrix} \text{ بحيث } M_2(\mathbb{R})$$

(1) أ- يبي أنه $M_a \times M_b = M_{ab}$ ($\forall (a,b) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}^*$)

ب- ليك φ التطبيق المعرف مع \mathbb{R}^* نحو E بحيث $\varphi(a) = M_a$

بيه أنه φ تشاكل تقابلي مع (\mathbb{R}^*, \times) نحو (E, \times)

ج- استنتج البنية الجبرية ل (E, \times)

(2) أ- يبي أنه $N_a \times N_b = M_{\frac{b}{a}}$ ($\forall (a,b) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}^*$)

ب- نضع $G = E \cup F$. يبي أنه (G, \times) زمرة .

هل هي تبادلية ؟

تمريره

نعتبر في الفضاء المتجهي الحقيقي $(M_2(\mathbb{R}), +, \cdot)$ المجموعة E

$$\text{للمصفوفات } M = \begin{pmatrix} a & -b \\ 3b & a-2b \end{pmatrix} \text{ حيث } (a,b) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$$

(1) أ- يبي أنه $(E, +)$ زمرة تبادلية

ب- يبي أنه $(E, +, \cdot)$ فضاء حقيقي و أعط بعده

(2) أحسب $M(a,b) \times M(c,d)$

(3) نعتبر التطبيق f المعرف مع E نحو \mathbb{C} كما يلي :

$$f: E \rightarrow \mathbb{C}$$

$$M(a,b) \rightarrow z = (a-b) + ib\sqrt{2}$$

أ- يبي أنه f تقابل و عرف تقابله العكسي

ب- يبي أنه f تشاكل مع (E, \times) نحو (\mathbb{C}, \times)

ج- استنتج بنية $(E, +, \times)$

د- حدد مقلوب M مع E عندما يكون ممكنا

2007

$$[I] \text{ ليك } E = \mathbb{R} - \left\{ \frac{1}{\sqrt{2}} \right\} \text{ مع } (a,b) \text{ زوج } \perp \text{ مع } E^2$$

$$\text{نضع } a \perp b = a + b - ab\sqrt{2}$$

(1) أ- تحقق أنه :

$$(\forall (a,b) \in E^2) a \perp b = \frac{1}{\sqrt{2}} + (a\sqrt{2}-1)(b\sqrt{2}-1)$$

ب- استنتج أنه \perp قانون ترتيب داخلي في E

(2) يبي أنه (E, \perp) زمرة تبادلية

$[II]$ $M_2(\mathbb{R})$ مجموعة المصفوفات المربعة مع الرتبة 2 . نذكر أنه

$(M_2(\mathbb{R}), +, \times)$ فضاء متجهي حقيقي وأن

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ حلقة واحدة وحدتها}$$

لكل F مجموعة المصفوفات مع $M_2(\mathbb{R})$ و التي تكتب على

$$M(a) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} \sqrt{2}-a & a \\ a & \sqrt{2}-a \end{pmatrix} \text{ الشكل}$$

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \text{ حيث } a \in E \text{ ونضع}$$

$$(1) \text{ أ- تحقق أنه } A^2 = 2A \text{ وأنه } M(a) = I + \frac{a}{\sqrt{2}}A$$

ب- يبي أنه F جزء مستقر مع $(M_2(\mathbb{R}), \times)$

$$\varphi: (E, \perp) \rightarrow (F, \times)$$

(2) نعتبر التطبيق : $a \rightarrow \varphi(a) = M(a)$

أ- يبي أنه φ تشاكل

تمريره

في الفضاء الحقيقي $(M_3(\mathbb{R}), +, \cdot)$ نعتبر المصفوفات

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \text{ و } I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{و ليك } \mathcal{S} \text{ مجموعة المصفوفات } M = \begin{pmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{pmatrix}$$

حيث $(a,b) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$

(1) يبي أنه $(\mathcal{S}, +, \cdot)$ فضاء حقيقي و حدد بعده

(2) تحقق أنه $A^2 = A + 2I$ و استنتج أنه A قابل مقلوبا A^{-1}

و حدد A^{-1} بدلالة A, I

(3) نضع $A^0 = I$ و $A^n = A \times A^{n-1}$ لكل n مع \mathbb{N}^*

أ- يبي أنه A^n تكتب على الشكل :

$$A^n = u_n A + v_n I \text{ محدد } (u_n)_n \text{ و } (v_n)_n$$

$$\text{ب- نضع } x_n = 2u_n + v_n ; y_n = u_n - v_n$$

$$\text{أحسب } x_{n+1} ; y_{n+1} \text{ على التوالي بدلالة } x_n, y_n$$

واستنتج A^n بدلالة n

(4) يبي أنه $(\mathcal{S}, +, \times)$ حلقة تبادلية واحدة . هل هي كاملة ؟