

الأستاذ : الحيان	دراسة الدوال اللوغاريتمية والدوال الأسية	الثانية بكالوريا علوم رياضية
<p>أحسب $g(0)$.</p> <p>5. لتكن h الدالة العددية المعرفة كما يلي :</p> $\forall t \in [0, +\infty[: h(t) = e^{\sqrt{t}} - \sqrt{t}$ <p>أ- ليكن $x \in]0, +\infty[$. باستعمال مبرهنة التزايديات المنتهية، بين انه يوجد عدد حقيقي c من المجال $]0, x^2[$ بحيث :</p> $\frac{e^x - 1 - x}{x^2} = \frac{1}{2} \left(\frac{e^{\sqrt{c}} - 1}{\sqrt{c}} \right)$ <p>ب- استنتج أن الدالة f قابلة للاشتقاق على يمين 0 وأحسب $f'_d(0)$.</p> <p>التمرين الثالث :</p> <p>الجزء الأول :</p> <p>1. نعتبر الدالة العددية u المعرفة على \mathbb{R} بما يلي :</p> $u(x) = (2-x)e^x - 2$ <p>1. أدرس تغيرات الدالة u.</p> <p>2. بين أن المعادلة $u(x) = 0$ تقبل بالضبط حلين مختلفين في \mathbb{R}. نرمز للحل الغير المنعدم ب α. تحقق من أن :</p> $1 < \alpha < 2$ <p>3. استنتج إشارة $u(x)$ على \mathbb{R}.</p> <p>II. لتكن f الدالة العددية المعرفة على \mathbb{R} بما يلي :</p> $\begin{cases} f(x) = \frac{x^2}{e^x - 1} ; x \neq 0 \\ f(0) = 0 \end{cases}$ <p>وليكن (\mathcal{E}_f) المنحنى الممثل للدالة f في المستوى المنسوب إلى معلم متعامد ممنظم (O, \vec{i}, \vec{j}).</p> <p>1. بين أن الدالة f متصلة على \mathbb{R}.</p> <p>2. أحسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ ، ثم حدد الفرعين اللانهائيين للمنحنى (\mathcal{E}_f).</p> <p>3. أدرس قابلية اشتقاق الدالة f في 0 وأعط تأويلا هندسيا للنتيجة المحصلة.</p> <p>4. بين أن الدالة f قابلة للاشتقاق على \mathbb{R}، و بين أن :</p> $\forall x \in \mathbb{R}^* : f'(x) = \frac{x u(x)}{(e^x - 1)^2}$ <p>5. ضع جدول تغيرات الدالة f.</p>	<p>التمرين الأول :</p> <p>لتكن f الدالة العددية المعرفة على المجال $]0, +\infty[$ بما يلي :</p> $\begin{cases} f(x) = \frac{x+1}{x-1} \frac{\ln(x)}{2} ; x \neq 1 \\ f(1) = 1 \end{cases}$ <p>وليكن (\mathcal{E}_f) المنحنى الممثل للدالة f في المستوى المنسوب إلى معلم متعامد ممنظم (O, \vec{i}, \vec{j}).</p> <p>1. بين أن f دالة متصلة على المجال $]0, +\infty[$.</p> <p>2. أحسب $f'(x)$ لكل $x \in]0, 1[$ ولكل $x \in]1, +\infty[$ ، ثم أدرس رتابتها على كل من هذين المجالين.</p> <p>3. بين أن لكل $x \in]0, 1[\cup]1, +\infty[$ لدينا :</p> $f'(x) = \frac{(x-1) - \ln(x)}{(x-1)^2} - \frac{1}{2x}$ <p>4. أ- بين أن لكل $x \in]0, +\infty[$ لدينا :</p> $x - \frac{x^2}{2} < \ln(1+x) < x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}$ <p>ب- استنتج أن f قابلة للاشتقاق في 1 وحدد $f'(1)$.</p> <p>ج- بين أن f' متصلة على المجال $]0, +\infty[$.</p> <p>5. أ- بين أن :</p> $\forall x \in]0, 1[\cup]1, +\infty[: \ln(x) < (x-1)$ <p>ب- استنتج أن : $\forall x \in]1, +\infty[: f(x) < x$.</p> <p>6. أنشئ (\mathcal{E}_f).</p> <p>التمرين الثاني :</p> <p>نعتبر الدالة العددية f المعرفة كما يلي :</p> $f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} e^{\frac{kx}{n}}$ <p>1. أحسب $f(0)$.</p> <p>2. بين أن : $\forall x \in \mathbb{R}^* : f(x) = \frac{e^x - 1}{x}$.</p> <p>3. هل الدالة متصلة في 0 ؟</p> <p>4. لكل $x \in \mathbb{R}$ ، نضع : $g(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^2} \sum_{k=0}^{n-1} k e^{\frac{kx}{n}}$</p>	

6. أنشئ (\mathcal{E}_f) . (نعطي : $\alpha \approx 1,6$)

الجزء الثاني :

لتكن F الدالة العددية المعرفة على \mathbb{R}^+ بما يلي :

$$\forall x \in \mathbb{R}^+ : F(x) = \int_0^x f(t) dt$$

1. بين أن F متصلة وتزايدية قطعاً على \mathbb{R}^+ .

$$2. \text{ لكل } x \in \mathbb{R}^+ \text{ ، نضع : } G(x) = \int_{\ln 2}^x t^2 e^{-t} dt$$

أ- باستعمال مكاملة بالأجزاء ، أحسب $G(x)$ ، ثم $\lim_{x \rightarrow +\infty} G(x)$.

ب- بين أن : $\forall t \in [\ln 2, +\infty[: f(t) \leq 2 t^2 e^{-t}$

ج- استنتج أن F مكبورة على \mathbb{R}^+ . نقبل أن $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = L$

وأن $L \in \mathbb{R}$

الجزء الثالث :

ليكن $n \in \mathbb{N}^*$

1. بين أن لكل $x > 0$ ، لدينا :

$$\frac{1}{e^x - 1} = e^{-x} + e^{-2x} + \dots + e^{-nx} + \frac{e^{-nx}}{e^x - 1}$$

2. بين أن : $\forall x > 0 : 0 \leq \int_0^x f(t) dt \leq \frac{\alpha(2-\alpha)}{n}$

3. أحسب : $I_n(x) = \int_0^x t^2 e^{-nt} dt$ لكل $x \in [0, +\infty[$

4. استنتج أن : $\lim_{x \rightarrow +\infty} I_n(x) = \frac{2}{n^3}$

1. بين أن لكل $x \in [0, +\infty[$ ، لدينا :

$$F(x) = \sum_{k=1}^{k=n} I_k(x) + \int_0^x f(t) e^{-nt} dt$$

2. لتكن h_n الدالة العددية المعرفة على \mathbb{R}^+ بما يلي :

$$h_n(x) = \int_0^x f(t) e^{-nt} dt$$

بين أن الدالة h_n تقبل نهاية منتهية I_n ، عندنا يؤول x إلى $+\infty$ ،

$$\text{وأن : } L - I_n = 2 \left(1 + \frac{1}{2^3} + \frac{1}{3^3} + \frac{1}{4^3} + \dots + \frac{1}{n^3} \right)$$

3. بين أن $(I_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ متتالية متقاربة وأن : $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$

4. نعتبر المتتالية العددية $(v_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ المعرفة بما يلي :

$$v_n = 1 + \frac{1}{2^3} + \frac{1}{3^3} + \frac{1}{4^3} + \dots + \frac{1}{n^3}$$

بين أن $(v_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ متتالية متقاربة وأن نهايتها L' تحقق ما يلي :

$$L = 2L'$$

التمرين الرابع :

لكل $n \in \mathbb{N}$ ، نعتبر الدالة العددية f_n المعرفة على المجال

$$]0, +\infty[\text{ بما يلي : } f_n(x) = n x + \ln(x)$$

1. بين أن المعادلة $f_n(x) = 0$ تقبل حلاً وحيداً x_n في \mathbb{R} ،

وأن $x_n \in]0, 1]$

2. أ- بين أن : $\forall x \in]0, +\infty[: f_{n+1}(x) > f_n(x)$

ب- استنتج أن : $f_{n+1}(x_n) > 0$ ، وأن $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ متتالية

تناقصية.

3. أ- بين أن $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ متتالية متقاربة.

نضع : $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = l$

ب- بين أن : $l \notin]0, 1]$

ج- استنتج أن : $l = 0$

4. أ- بين أنه إذا كان $n \geq 3 > e$ ، فإن : $x_n > \frac{1}{n}$

ب- أدرس إشارة $x - \ln(x)$ ، واستنتج أن : $x_n < \frac{1}{\sqrt{n}}$

ج- ماذا تستنتج ؟

التمرين الخامس :

ليكن $n \in \mathbb{N}$. نضع :

$$u_0 = \int_0^1 \frac{1}{2+t} dt$$

$$u_n = \int_0^1 \frac{1}{1+t+t^n} dt \text{ و}$$

1. أحسب u_0 و u_1

2. بين أن $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ متتالية تزايدية .

3. أ- بين أن : $\forall n \in \mathbb{N} : u_n \leq \int_0^1 \frac{1}{1+t} dt$

ب- أحسب $\int_0^1 \frac{1}{1+t} dt$. ماذا تستنتج ؟

4. أ- تحقق من أن :

$$\forall n \in \mathbb{N} : \ln 2 - u_n = \int_0^1 \frac{t^n}{(1+t)(1+t+t^n)} dt$$

ب- استنتج أن : $\forall n \in \mathbb{N} : \ln(2) - u_n \leq \frac{1}{1+n}$

ج- أحسب : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مَدِينَةُ الْمَدِينَةِ
مَدِينَةُ الْمَدِينَةِ
مَدِينَةُ الْمَدِينَةِ