

الثاني: بكالوريا
حلوم رياضيات

تصحيح الاستعاة الوطني
المرحز للبيكالوريا
الدورة الاستدراكيث 2009

الاستاذ: محرز طيبان

التتميرة الأولى: (3 نقترا)

تذكير:

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ حلقة واحدية وحدتها المصفوفة } (\mathcal{M}_2(\mathbb{R}), +, \times) \checkmark$$

$$\text{فضاء متجهي حقيقي. } (\mathcal{M}_2(\mathbb{R}), +, \cdot) \checkmark$$

$$V = \left\{ M_{(a,b)} = \begin{pmatrix} a & b \\ 4b & a \end{pmatrix} / (a,b) \in \mathbb{R}^2 \right\} \text{ نضع}$$

1. (*) لدينا:

$$O = M_{(0,0)} \in V \text{ ، لأن } V \neq \emptyset \checkmark$$

$$V \subset \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \checkmark$$

$$\checkmark \text{ لكل عنصرين } M_{(a,b)} \text{ و } M_{(c,d)} \text{ من } V \text{ ولكل } (\alpha, \beta) \text{ من } \mathbb{R}^2 \text{ ، لدينا:}$$

$$\alpha M_{(a,b)} + \beta M_{(c,d)} = \begin{pmatrix} \alpha a + \beta c & \alpha b + \beta d \\ 4(\alpha b + \beta d) & \alpha a + \beta c \end{pmatrix} = M_{(\alpha a + \beta c, \alpha b + \beta d)} \in V$$

ومنه فإن V فضاء متجهي جزئي من $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}), +, \cdot)$.

$$(*) \text{ لكل عنصر } M_{(a,b)} \text{ من } V \text{ ، لدينا: } M_{(a,b)} = \begin{pmatrix} a & b \\ 4b & a \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 4 & 0 \end{pmatrix} = aI + bJ \text{ ، حيث:}$$

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = M_{(1,0)} \in V \text{ و } J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 4 & 0 \end{pmatrix} = M_{(0,4)} \in V \text{ ، إذن } (I, J) \text{ أسرة مولدة للفضاء } V.$$

$$\text{لكل } (\alpha, \beta) \text{ من } \mathbb{R}^2 \text{ ، لدينا: } \alpha I + \beta J = O \Rightarrow \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ 4\beta & \alpha \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \alpha = \beta = 0$$

في V . وبالتالي فإن (I, J) أساس للفضاء المتجهي الحقيقي $(V, +, \cdot)$. (بعده $\dim V = 2$)

2. أ- ليكن $M_{(a,b)}$ و $M_{(c,d)}$ عنصران من V . لدينا:

$$M_{(a,b)} \times M_{(c,d)} = \begin{pmatrix} a & b \\ 4b & a \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} c & d \\ 4d & c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ac + 4bd & ad + bc \\ 4(ad + bc) & ac + 4bd \end{pmatrix} = M_{(ac+4bd, ad+bc)} \in V$$

إذن V جزء مستقر من $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}), \times)$.

2. ب- لدينا:

$$\checkmark (V, +, \cdot) \text{ فضاء متجهي حقيقي. إذن زمرة تبادلية.}$$

$$\checkmark (\mathcal{M}_2(\mathbb{R}), +, \times) \text{ حلقة ، إذن } \times \text{ تجميعي وتوزيحي على } + \text{ في } \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \text{ و بما أن } V \text{ جزء مستقر من } (\mathcal{M}_2(\mathbb{R}), \times) \text{ ،}$$

فإن \times تجميعي وتوزيحي على $+$ في V .

$$\checkmark I \text{ هي وحدة الحلقة } (\mathcal{M}_2(\mathbb{R}), +, \times) \text{ و } I = M_{(1,0)} \in V \text{ ، إذن } I \text{ هي وحدة } V.$$

$$.V \text{ قانون تبادلي في } M_{(a,b)} \times M_{(c,d)} = M_{(ac+4bd, ad+bc)} = M_{(ca+4db, da+cb)} = M_{(c,d)} \times M_{(a,b)} \quad \checkmark$$

خلاصة : (V, +, ×) حلقة واحدة تبادلية.

$$.3 \text{ أ- لدينا : } M_{\left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{4}\right)} \times M_{\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right)} = M_{\left(\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + 4 \left(-\frac{1}{4}\right) \times \frac{1}{4}, \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} + \left(-\frac{1}{4}\right) \times \frac{1}{2}\right)} = M_{(0,0)} = O$$

$$\text{ب- لدينا : } M_{\left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{4}\right)} \times M_{\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right)} = O \text{ و } M_{\left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{4}\right)} \neq O \text{ و } M_{\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right)} \neq O$$

قواسم الصفر ، ومنه فإن الحلقة (V, +, ×) ليست جسما.

$$.4 \text{ لتكن } X \text{ مصفوفة من } V \text{ حيث } X = \begin{pmatrix} a & b \\ 4b & a \end{pmatrix} \text{ مع } (a,b) \in \mathbb{R}^2$$

$$\begin{aligned} \text{أ- لدينا : } X^2 - 2aX + (a^2 - 4b^2)I &= M_{(a,b)}^2 - 2aM_{(a,b)} + (a^2 - 4b^2)M_{(1,0)} \\ &= M_{(a^2+4b^2, 2ab)} - M_{(2a^2, 2ab)} + M_{(a^2-4b^2, 0)} \\ &= M_{(0,0)} \\ &= O \end{aligned}$$

$$\text{ب- نفترض أن } a^2 - 4b^2 \neq 0 \text{ . إذن : } \frac{1}{a^2 - 4b^2} (2aI - X)X = I$$

$$\text{ولدينا : } \frac{1}{a^2 - 4b^2} (2aI - X) = \frac{1}{a^2 - 4b^2} (2aM_{(1,0)} - M_{(a,b)}) = M_{\left(\frac{a}{a^2-4b^2}, \frac{-b}{a^2-4b^2}\right)} \in V$$

$$\text{إذن } X \text{ تقبل مقلوبا في } (V, +, \times) \text{ هو : } X^{-1} = \frac{1}{a^2 - 4b^2} (2aI - X) = M_{\left(\frac{a}{a^2-4b^2}, \frac{-b}{a^2-4b^2}\right)}$$

التسريخ الثاني :

ليكن u عددا عقديا مخالفا للعدد $1-i$.

$$.1 \text{ أ- } (iu - 1 - i)^2 = -u^2 + 2(1-i)u + 2i$$

$$\text{ب- نعتبر في المجموعة } \mathbb{C} \text{ المعادلة } z^2 - 2(u+1-i)z + 2u^2 - 4i = 0 \text{ (*)}$$

لنحسب المميز المختصر للمعادلة (*). حسب السؤال أعلاه ، لدينا :

$$\Delta' = (u+1-i)^2 - (2u^2 - 4i) = -u^2 + 2(1-i)u + 2i = (iu - 1 - i)^2$$

$$z_1 = u + 1 - i + iu - 1 - i = \boxed{(1+i)u - 2i} \text{ : إذن للمعادلة (*) حلين مختلفين هما :}$$

$$z_2 = u + 1 - i - iu + 1 + i = \boxed{2 + (1-i)u} \text{ و}$$

$$.S = \left\{ (1+i)u - 2i , 2 + (1-i)u \right\} \text{ وبالتالي فإن مجموعة حلول المعادلة (*) هي :}$$

$$.2 \text{ في المستوى العقدي المنسوب إلى معلم متعامد ممنظم ومباشر ، نعتبر النقط } A \left((1+i)u - 2i \right) \text{ و } B \left((1-i)u + 2 \right) \text{ و } U(u)$$

$$\text{ و } \Omega(2-2i)$$

$$\text{أ- لدينا } I \text{ منتصف القطعة } [AB] \text{ . إذن لحق النقطة } I \text{ هو :}$$

$$z_I = \frac{z_A + z_B}{2} = \frac{(1+i)u - 2i + (1-i)u + 2}{2} = \boxed{1-i+u}$$

t هي الإزاحة ذات المتجهة \bar{u} التي تحول النقطة U إلى النقطة I . لنحدد لحق المتجهة \bar{u} . لدينا :

$$\bar{u}(1, -1) : \text{إذن } z_{\bar{u}} = z_I - z_U = 1-i+u - u = \boxed{1-i}$$

ب- الكتابة العقدية للدوران R الذي مركزه $\Omega(2-2i)$ وزاويته $\left(-\frac{\pi}{2}\right)$ هي : $z' = e^{-i\frac{\pi}{2}}z + \left(1 - e^{-i\frac{\pi}{2}}\right)z_{\Omega}$ أي :

$$z' = -iz + (1+i)(2-2i) \text{ يكافئ } \boxed{z' = -iz + 4}$$

$$\text{وبما أن } \boxed{R(A) = B} \text{ فإن } -iz_A + 4 = -i((1+i)u - 2i) + 4 = (1-i)u + 2 = z_B$$

ج- لدينا $R\left(\Omega, -\frac{\pi}{2}\right)(A) = B$. إذن : $\left(\overline{\Omega A}, \overline{\Omega B}\right) \equiv -\frac{\pi}{2} [2\pi]$ ومنه فإن ΩAB مثلث قائم

الزاوية في Ω ولدينا I منتصف القطعة $[AB]$. $\boxed{(\Omega I) \perp (AB)}$.

د- إنشاء النقطتين A و B انطلاقا من النقطة U :

✓ لدينا : $t(U) = I$ ، هكذا ننشئ النقطة I بحيث : $\overline{UI} = \bar{u}$

✓ بما أن $(\Omega I) \perp (AB)$ ، فإن النقطتين A و B تنتميان إلى المستقيم (Δ) المار من النقطة I و العمودي على المستقيم


(ΩI)

✓ بما أن ΩAB مثلث قائم الزاوية في Ω و I منتصف القطعة $[AB]$ ، فإن I هو مركز الدائرة \mathcal{C} المحيطة بالمثلث

ΩAB . إذن A و B همل نقطتي تقاطع المستقيم (Δ) والدائرة \mathcal{C} . ويتم اختيار النقطتين A و B بحيث يكون ΩAB

مثلثا غير مباشر $\left(\left(\overline{\Omega A}, \overline{\Omega B}\right) \equiv -\frac{\pi}{2} [2\pi]\right)$

إنشاء الشكل في حالة $U(4+2i)$:



3. نضع : $u = a(1+i) - 2i$ حيث $(a \in \mathbb{R})$.

أ- لنحدد لحقي المتجهتين \overline{AB} و \overline{AU} بدلالة a :

$$\text{Aff}(\overline{AB}) = z_B - z_A = (1-i)u + 2 - (1+i)u + 2i = \boxed{2(1-i)(a-1)}$$


$$\text{Aff}(\overline{AU}) = z_U - z_A = a(1+i) - 2i - (1+i)u + 2i = \boxed{(1-i)(a-2)}$$

ب- بما أن $u \neq 1-i$ ، فإن : $a \neq 1$. إذن : $\text{Aff}(\overline{AU}) = \text{Aff}\left(\frac{a-2}{2(a-1)}\overline{AB}\right)$ ، ومنه فإن :

$$\overline{AU} = \frac{a-2}{2(a-1)}\overline{AB}$$

التمرين الثالث :

ليكن $n \in \mathbb{N}$ و $n \geq 4$.



نعتبر التجربة العشوائية التالية : نختار عشوائيا صندوقا من بين الصناديق الثلاثة، ثم نسحب تائيا كرتين من الصندوق الذي وقع عليه الاختيار. ليكن X المتغير العشوائي الذي يساوي عدد الكرات الحمراء المسحوبة.

1. القيم التي يأخذها المتغير العشوائي هي 0 و 1 و 2 ولدينا مجموعة القيم كما يلي : $X(\Omega) = \{0, 1, 2\}$.

2. نعتبر الأحداث التالية : A_i : « اختيار الصندوق U_i » ، حيث $1 \leq i \leq 3$.

لدينا A_1 و A_2 و A_3 أحداث غير منسجمة مثنى مثنى واتحادهما Ω ، فهي تكون تجزيئا للفضاء Ω .

حسب صيغة الاحتمالات الكلية ، لدينا :

$$p(X = 2) = p(A_1)p_{A_1}(X = 2) + p(A_2)p_{A_2}(X = 2) + p(A_3)p_{A_3}(X = 2) \quad \text{أ-}$$

$$= \frac{1}{3} \times 0 + \frac{1}{3} \times \frac{C_2^2}{C_n^2} + \frac{1}{3} \times \frac{C_3^2}{C_n^2}$$

$$\boxed{p(X = 2) = \frac{8}{3n(n-1)}}$$

$$C_n^2 = \frac{n(n-1)}{2} ; C_2^2 = 1 ; C_3^2 = 3$$

$$p(X = 1) = p(A_1)p_{A_1}(X = 1) + p(A_2)p_{A_2}(X = 1) + p(A_3)p_{A_3}(X = 1) \quad \text{ب- لدينا :}$$

$$= \frac{1}{3} \times \frac{C_1^1 C_{n-1}^1}{C_n^2} + \frac{1}{3} \times \frac{C_2^1 C_{n-2}^1}{C_n^2} + \frac{1}{3} \times \frac{C_3^1 C_{n-3}^1}{C_n^2}$$

$$\boxed{p(X = 1) = \frac{4(3n-7)}{3n(n-1)}}$$

$$C_n^2 = \frac{n(n-1)}{2} ; C_{n-1}^1 = n-1 ; C_{n-2}^1 = n-2 ; C_1^1 = 1 ; C_2^1 = 2 ; C_3^1 = 3$$

$$p(X=0) = 1 - p(X=1) - p(X=2) = 1 - \frac{8}{3n(n-1)} - \frac{4(3n-7)}{3n(n-1)} = \frac{3n^2 - 15n + 20}{3n(n-1)}$$

ومنه نستنتج قانون احتمال X كما يلي :

قيم X : x_k	0	1	2
$p_k = p(X=x_k)$	$\frac{3n^2 - 15n + 20}{3n(n-1)}$	$\frac{4(3n-7)}{3n(n-1)}$	$\frac{8}{3n(n-1)}$

3. علما أننا حصلنا على كرتين حمراوين ، احتمال أن يكون السحب قد تم من الصندوق U_3 هو : $p_{(X=2)}(A_3)$

حسب صيغة الاحتمالات المركبة ، لدينا :

$$p(X=2)p_{(X=2)}(A_3) = p(A_3)p_{A_3}(X=2) \Rightarrow \frac{8}{3n(n-1)}p_{(X=2)}(A_3) = \frac{1}{3} \frac{C_3^2}{C_n^2}$$

$$\Rightarrow p_{(X=2)}(A_3) = \frac{3}{4}$$

المسألة :

1. لدينا : $\forall x \in \mathbb{R}^+ , g(x) = 2(1 - e^{-x}) - x$

1. أ- لكل x من \mathbb{R}^+ ، لدينا : $g'(x) = 2(1 - e^{-x})' - x' = 2e^{-x} - 1$ ، ولدينا :

$$g'(x) = 0 \Leftrightarrow 2e^{-x} - 1 = 0 \Leftrightarrow e^{-x} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow x = -\ln\left(\frac{1}{2}\right) \Leftrightarrow x = \ln 2$$

إذن : $\forall x \in [0, \ln 2]$ ، $g'(x) \geq 0$ و $\forall x \in [\ln 2, +\infty[$ ، $g'(x) \leq 0$

ب- تغيرات الدالة g :

لدينا : $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} 2(1 - e^{-x}) - x = -\infty$ ، لأن $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$. إذن :

x	0	$\ln 2$	$+\infty$
$g'(x)$	+	0	-
$g(x)$	0	$1 - \ln 2$	$-\infty$

2. أ- بما أن g دالة متصلة و تناقصية قطعاً على المجال $[\ln 4, \ln 6]$ و $g(\ln 4) = \frac{3}{2} - 2\ln 2 \approx 0,1$ و $g(\ln 6) = \frac{5}{3} - \ln 6 = \frac{5}{3} - \ln 3 - \ln 2 \approx -0,14$

، فإنه حسب مبرهنة القيم الوسيطة ، المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلاً وحيداً α في المجال $[\ln 4, \ln 6]$.

ب- g دالة تناقصية على المجال $[\ln 2, +\infty[$. إذن : $\forall x \in]\alpha, +\infty[$ ، $x > \alpha \Rightarrow g(x) < g(\alpha) \Rightarrow g(x) < 0$

و $\forall x \in [\ln 2, \alpha[$ ، $x < \alpha \Rightarrow g(x) > g(\alpha) \Rightarrow g(x) > 0$

$\forall x \in]0, \ln 2]$, $\ln 2 \geq x > 0 \Rightarrow g(x) > g(0) \Rightarrow g(x) > 0$: إذن $[0, \ln 2]$ المجال g دالة تزايدية على المجال
 خلاصة : $g(0) = g(\alpha) = 0$ و $\forall x \in]\alpha, +\infty[$, $g(x) < 0$ و $\forall x \in]0, \alpha[$, $g(x) > 0$
 3. نعتبر المتتالية العددية $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ المعرفة كما يلي :

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = 2(1 - e^{-u_n}) , n \in \mathbb{N} \end{cases}$$

أ- لدينا :

✓ من أجل $n = 0$, $u_0 = 1$, إذن : $1 \leq u_0 < \alpha$, لأن : $1 = \ln e < \ln 4 < \alpha$

✓ ليكن $n \in \mathbb{N}$. نفترض أن $1 \leq u_n < \alpha$ ونبين أن $1 \leq u_{n+1} < \alpha$:

$$\begin{aligned} 1 \leq u_n < \alpha &\Rightarrow -\alpha < -u_n \leq -1 \\ &\Rightarrow e^{-\alpha} < e^{-u_n} \leq e^{-1} \\ &\Rightarrow 1 - e^{-1} \leq 1 - e^{-u_n} < 1 - e^{-\alpha} \\ &\Rightarrow 2(1 - e^{-1}) \leq 2(1 - e^{-u_n}) < 2(1 - e^{-\alpha}) \\ &\Rightarrow 1 \leq u_{n+1} < \alpha \end{aligned}$$

لأن : $2(1 - e^{-\alpha}) = \alpha \Rightarrow 2(1 - e^{-\alpha}) - \alpha = 0$ و $g(\alpha) = 0 \Rightarrow 2(1 - e^{-\alpha}) - \alpha = 0$ و $g(1) \geq 0 \Rightarrow 2(1 - e^{-1}) \geq 1$

✓ خلاصة : $\forall n \in \mathbb{N}$, $1 \leq u_n < \alpha$

ب- ليكن $n \in \mathbb{N}$. لدينا : $u_{n+1} - u_n = 2(1 - e^{-u_n}) - u_n = g(u_n)$

ج- ليكن $n \in \mathbb{N}$. لدينا : $u_n \in [1, \alpha[$. إذن $g(u_n) > 0$, ومنه فإن : $u_{n+1} - u_n > 0$. وهذا يعني أن $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ متتالية تزايدية.

د- لدينا : $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ متتالية تزايدية ومكبورة بالعدد α . إذن $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ متتالية متقاربة نهايتها l ينبغي تحديدها ؟

نضع : $\forall x \in \mathbb{R}^+$, $h(x) = 2(1 - e^{-x})$. لدينا :

✓ دالة متصلة على المجال $[1, \alpha]$.

✓ $\forall x \in [1, \alpha]$, $h'(x) = 2(1 - e^{-x})' = 2e^{-x} > 0$. إذن h تزايدية قطعاً على $[1, \alpha]$, ومنه فإن :

لأن : $h([1, \alpha]) = [h(1), h(\alpha)] \subset [1, \alpha]$ و $h(\alpha) = \alpha$, $h(1) = 1$ و $g(1) \geq 0 \Rightarrow 1 \leq h(1)$

✓ $u_0 = 1 \in [1, \alpha]$

✓ $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ متتالية متقاربة نهايتها l .

إذن : $h(l) = l$ و $l \in [1, \alpha]$. حسب السؤال 2.ب. ، لدينا : $l = \alpha$.

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \alpha}$$

II. نعتبر الدالة العددية f للمتغير الحقيقي x المعرفة على \mathbb{R}_+^* بما يلي : $f(x) = \frac{1 - e^x}{x^2}$

1. حساب نهايات : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2} = +\infty$: لأن : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 - e^x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2} (e^{-x} - 1) = -\infty$

و $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0$

$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{-1}{x} \right) = -\infty$ و $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$: لأن : $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - e^x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} \times \left(\frac{-1}{x} \right) = -\infty$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0 \text{ و } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^3} = +\infty : \text{ لأن } , \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1-e^x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^3} (e^{-x} - 1) = \boxed{-\infty}$$

2. أ- نعلم أن : $g(\alpha) = 0 \Rightarrow 2(1-e^{-\alpha}) = \alpha \Rightarrow e^{\alpha} - 1 = \frac{\alpha}{2} e^{\alpha} \Rightarrow \left(1 - \frac{\alpha}{2}\right) e^{\alpha} = 1 \Rightarrow e^{\alpha} = \frac{2}{2-\alpha}$

$$f(\alpha) = \frac{1-e^{\alpha}}{\alpha^2} = \frac{1-\frac{2}{2-\alpha}}{\alpha^2} = \frac{-\alpha}{\alpha^2(2-\alpha)} = \boxed{\frac{1}{\alpha(\alpha-2)}}$$


ب- ليكن $x \in \mathbb{R}_+^*$ لدينا :

$$f'(x) = \left(\frac{1-e^x}{x^2}\right)' = \frac{-e^x x^2 - 2x(1-e^x)}{x^2} = \frac{e^x(-x - 2(e^{-x} - 1))}{x^3} = \boxed{\frac{e^x g(x)}{x^3}}$$

إشارة $f'(x)$ على \mathbb{R}_+^* هي إشارة $g(x)$ ، ومنه نستنتج جدول تغيرات الدالة f كما يلي :

x	0	α	$+\infty$	
$f'(x)$		+	0	-
$f(x)$			1	
			$\frac{1}{\alpha(\alpha-2)}$	
	$-\infty$			$-\infty$

3. إنشاء المنحنى \mathcal{C} :



III. نعتبر الدالة العددية F المعرفة على المجال $[0, +\infty[$ بما يلي :

$$\begin{cases} F(x) = \int_x^{2x} \frac{1-e^t}{t^2} dt, & x > 0 \\ F(0) = -\ln 2 \end{cases}$$

1. أ- ليكن $x > 0$. لدينا : $u : t \mapsto 1-e^t$ و $v : t \mapsto \frac{-1}{t}$ دالتان متصلتان وقابلتان للاشتقاق على المجال $]0, +\infty[$ و

$u' : t \mapsto -e^t$ و $v' : t \mapsto \frac{1}{t^2}$ دالتان متصلتان على المجال $]0, +\infty[$. إذن حسب تقنية المكاملة بالأجزاء ، لدينا :

$$F(x) = \int_x^{2x} \frac{1-e^t}{t^2} dt = \int_x^{2x} (1-e^t) \left(-\frac{1}{t} \right)' dt = \left[\frac{e^t-1}{t} \right]_x^{2x} - \int_x^{2x} \frac{e^t}{t} dt$$

$$F(x) = \boxed{\frac{e^{2x}-1}{2x} - \frac{e^x-1}{x} - \int_x^{2x} \frac{e^t}{t} dt}$$

ب- لكل $x > 0$ ولكل $t \in [x, 2x]$ لدينا : $\frac{e^x}{t} \leq \frac{e^t}{t} \leq \frac{e^{2x}}{t}$ $\Rightarrow e^x \leq e^t \leq e^{2x} \Rightarrow x \leq t \leq 2x$

إذن : $e^x \int_x^{2x} \frac{dt}{t} \leq \int_x^{2x} \frac{e^t}{t} dt \leq e^{2x} \int_x^{2x} \frac{dt}{t}$ أي : $\boxed{e^x \ln 2 \leq \int_x^{2x} \frac{e^t}{t} dt \leq e^{2x} \ln 2}$ ، لأن :

$$\int_x^{2x} \frac{dt}{t} = [\ln t]_x^{2x} = \ln(2x) - \ln x = \ln\left(\frac{2x}{x}\right) = \ln 2$$

ج- بما أن $e^x \ln 2 \leq \int_x^{2x} \frac{e^t}{t} dt \leq e^{2x} \ln 2$ و $\forall x \in]0, +\infty[: e^x \ln 2 \leq \int_x^{2x} \frac{e^t}{t} dt \leq e^{2x} \ln 2$ ، $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} e^x \ln 2 = \ln 2$ و $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} e^{2x} \ln 2 = \ln 2$ ،

$$\boxed{\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \int_x^{2x} \frac{e^t}{t} dt = \ln 2}$$
 فإن :

استنتاج : $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} F(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{e^{2x}-1}{2x} - \frac{e^x-1}{x} - \int_x^{2x} \frac{e^t}{t} dt = -\ln 2 = F(0)$ ، لأن :

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \int_x^{2x} \frac{e^t}{t} dt = \ln 2 \text{ و } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{e^x-1}{x} = 1 \text{ و } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{e^{2x}-1}{2x} = 1$$

ومنه نستنتج أن دالة متصلة على اليمين في الصفر.

2. أ- ليكن $x > 0$ و $t \in [x, 2x]$ لدينا :

$$x \leq t \leq 2x \Rightarrow e^x \leq e^t \leq e^{2x}$$

$$\Rightarrow 1-e^t \leq 1-e^x$$

$$\Rightarrow \frac{1-e^t}{t^2} \leq \frac{1-e^x}{t^2}$$

$$\Rightarrow F(x) \leq (1-e^x) \int_x^{2x} \frac{dt}{t^2}$$

$$\Rightarrow F(x) \leq (1-e^x) \left[\frac{-1}{t} \right]_x^{2x}$$

$$\Rightarrow F(x) \leq \frac{1-e^x}{2x}$$

ومنه فإن : $\forall x \in]0, +\infty[: F(x) \leq \frac{1-e^x}{2x}$

2. ب- بما أن $\forall x \in]0, +\infty[: F(x) \leq \frac{1-e^x}{2x}$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1-e^x}{2x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{2x} (e^{-x} - 1) = -\infty$ ، لأن :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = \boxed{-\infty} \text{ ، فإن : } \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0 \text{ و } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$$

3. لدينا $t \mapsto \frac{1-e^t}{t^2}$ دالة متصلة على المجال $]0, +\infty[$ ، إذن فهي تقبل دالة أصلية φ على المجال $]0, +\infty[$ ولدينا :

$$\forall x \in]0, +\infty[: F(x) = \int_x^{2x} \frac{1-e^t}{t^2} dt = \left[\varphi(t) \right]_x^{2x} = \varphi(2x) - \varphi(x)$$

نعلم أن φ و $w : x \mapsto 2x$ دالتان قابلتان للاشتقاق على المجال $]0, +\infty[$ ، إذن $x \mapsto \varphi(2x)$ قابلة للاشتقاق على المجال

$]0, +\infty[$ ، وعليه فإن F دالة قابلة للاشتقاق على المجال $]0, +\infty[$ ، ولكل x من المجال $]0, +\infty[$ ، لدينا :

$$F'(x) = \left(\varphi(2x) - \varphi(x) \right)' = (2x)' \varphi'(2x) - \varphi'(x) = 2 \frac{1-e^{2x}}{4x^2} - \frac{1-e^x}{x^2} F'(x) = \boxed{-\frac{1}{2} \left(\frac{e^x - 1}{x} \right)^2}$$

4. أ- ليكن $x > 0$

✓ F دالة متصلة على المجال $[0, x]$ وقابلة للاشتقاق على المجال $]0, x[$. حسب مبرهنة التزايد المتناهية ، لدينا :

$$\exists \beta \in]0, x[/ F(x) - F(0) = F'(\beta)(x - 0)$$

$$\text{أي : } \exists \beta \in]0, x[/ F(x) - F(0) = -\frac{1}{2} \left(\frac{e^\beta - 1}{\beta} \right) x$$

✓ \exp دالة متصلة على المجال $[0, \beta]$ وقابلة للاشتقاق على المجال $]0, \beta[$. حسب مبرهنة التزايد المتناهية ، لدينا :

$$\exists c \in]0, \beta[/ e^\beta - 1 = e^c \beta \text{ أي : } \exists c \in]0, \beta[/ \exp(\beta) - \exp(0) = \exp'(c)(\beta - 0)$$

$$\text{وبالتالي فإن : } \exists c \in]0, x[/ F(x) - F(0) = -\frac{1}{2} x e^{2c}$$

ب- لدينا :

$$0 < c < x \Rightarrow 0 < 2c < 2x$$

$$\Rightarrow 1 < e^{2c} < e^{2x}$$

$$\Rightarrow -\frac{1}{2} e^{2x} < -\frac{1}{2} e^{2c} < -\frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow -\frac{1}{2} e^{2x} < \frac{F(x) - F(0)}{x} < -\frac{1}{2}$$

$$\text{إذن : } \forall x \in]0, +\infty[: -\frac{1}{2} e^{2x} < \frac{F(x) - F(0)}{x} < -\frac{1}{2}$$

$$\text{ج- بما أن : } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} -\frac{1}{2} = -\frac{1}{2} \text{ و } \forall x \in]0, +\infty[: -\frac{1}{2} e^{2x} < \frac{F(x) - F(0)}{x} < -\frac{1}{2}$$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{F(x) - F(0)}{x} = -\frac{1}{2} \text{ ، فإن : } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} -\frac{1}{2} e^{2x} = -\frac{1}{2}$$

وبالتالي فإن F دالة قابلة للاشتقاق على اليمين في الصفر ولدينا : $F'_d(0) = -\frac{1}{2}$

إضافات :

لدينا : $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = -\infty$ و $\forall x \in]0, +\infty[: \frac{F(x)}{x} \leq \frac{1-e^x}{2x^2}$

لأن : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1-e^x}{2x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{2x^2} (e^{-x} - 1) = -\infty$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0$

إذن : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{F(x)}{x} = -\infty$. ومنه فإن المنحنى \mathcal{C}_F يقبل فرعاً شلجيمياً بجوار $+\infty$ اتجاهه محور الأرتيب .

جدول تغيرات الدالة F :

x	0	$+\infty$
$F'(x)$	$-\frac{1}{2}$	-
$F(x)$	$-\ln 2$	$-\infty$

إنشاء المنحنى \mathcal{C}_F :

