

الثانية علوم رياضية
مدة الإنجاز: 4 ساعات

متحفظان لجنة التأمين
٢٠١٥

ثانوية أنيس
التائية عز

الصفحة
٤٣

التمر من الأول

٦

$$I_n = \int_0^1 x^n \ln(1+x) dx \quad \text{لكل } n \in \mathbb{N} \text{ نضع}$$

(1) احسب I_0

(2) (a) بين أن $I_n \geq 0$

(b) بين أن المتالية (I_n) تناقصية واستنتج أنها متقاربة.

(3) (a) بين أن $I_n \leq \frac{\ln(2)}{n+1}$

(b) استنتاج $\lim I_n$

$$I_n = \frac{\ln(2)}{n+1} - \frac{1}{n+1} \int_0^1 \frac{x^{n+1}}{1+x} dx \quad (4)$$

(b) بين أن $0 \leq \int_0^1 \frac{x^{n+1}}{1+x} dx \leq \frac{1}{n+2}$

(c) استنتاج $\lim nI_n$

التمر من الثاني

٧

لكل دالة متصلة على $[-1, +\infty]$ نعتبر الدالة $T(f)$ المعرفة على $[-1, +\infty]$ بما يلي

$$T(f)(x) = \int_0^x \frac{f(t)}{1+t} dt$$

الجزء الأول

(1) حدد الدالة $T(f)$ إذا كانت f ثابتة يعني $f(t) = a$

(2) حدد الدالة $T(f)$ إذا كانت f معرفة بـ $f(t) = \frac{t(t+1)}{(t+2)^2}$

الجزء الثاني

نفترض في هذا الجزء أن الدالة f معرفة بما يلي: $f(t) = e^{-t}$

(1) (a) بين أن الدالة $T(f)$ قابلة للاشتقاق على $[-1, +\infty]$ واحسب $(T(f))'(x)$

b) وضع جدول تغيرات الدالة $T(f)$ على $[-1, +\infty]$.

(a) بين أن $\forall x \geq 0 : T(f)(x) \leq 1 - e^{-x}$ (2)

b) استنتج أن الدالة $T(f)$ تقبل نهاية منتهية l في $+\infty$ وأن $l \leq 1$.

(a) بين أن $\forall -1 < x < 0 : T(f)(x) \leq \ln(1+x)$ (3)

(b) استنتاج $\lim_{x \rightarrow -1^+} T(f)(x)$ وأول هندسياً النتيجة المحصل عليها.

4) أنشى المنحني $(C_{T(f)})$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1+\ln(x))}{\ln(x)} = 0 \quad \text{وأن} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1+x)}{\ln(x)} = 1 \quad (a) \quad (5)$$

(b) بين أن $\forall x \geq 1 : 0 \leq T(f)(x) \leq \int_0^{\ln(x)} \frac{1}{1+t} dt + \frac{1}{x} \int_{\ln(x)}^x \frac{1}{1+t} dt$

c) استنتاج أن

$$(\forall x \geq 1) : 0 \leq T(f)(x) \leq \ln(1 + \ln(x)) + \frac{1}{x} [\ln(1+x) - \ln(1 + \ln(x))]$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{T(f)(x)}{\ln(x)} \quad \text{استنتاج} \quad (d)$$

الجزء الثالث

نعتبر في هذا الجزء الدالة f_n المعرفة بما يلي: مع $n \in \mathbb{N}^*$ ($\forall t \in [-1, +\infty)$) : $f_n(t) = t^n$. ليكن $x > -1$ (1)

$$(\forall n \in \mathbb{N}^*) : T(f_n)(x) + T(f_{n+1})(x) = \frac{x^{n+1}}{n+1} \quad (a)$$

. أحسب $T(f_1)(x)$ (b)

$$(\forall n \in \mathbb{N}^*) : T(f_n)(x) = (-1)^n \left[\ln(1+x) + \sum_{k=1}^n (-1)^k \frac{x^k}{k} \right] \quad \text{استنتاج أن:} \quad (c)$$

2) ليكن $x \in [-1, 1]$ (2)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} T(f_n)(x) = 0 \quad (a)$$

$$\ln(1+x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} \frac{x^k}{k} \quad \text{استنتاج أن} \quad (b)$$

المستوى مناسب إلى معلم معتمد منظم ومبادر (I; O). A هي النقطة ذات اللحق 2 ليكن التطبيق φ من \mathbb{C} نحو \mathbb{C} الذي يربط كل نقطة M ذات اللحق z بالنقطة M' ذات اللحق z' بحيث:

$$z' = \frac{3+\sqrt{3}i}{4}z + \frac{1-\sqrt{3}i}{2}$$

- 1- بين أن A هي النقطة الصامدة الوحيدة بالتطبيق φ .
- 2- لكن M نقطة من \mathbb{C} تختلف A و M' صورتها بالتطبيق φ .

$$\text{أ) بين أن } (z-2) - \frac{\sqrt{3}}{2} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i \right) (z-2) = 0.$$

ب) استنتج M' بدلالة AM وحدد قياساً للزاوية $(AM; AM')$.

ج) بين أن المثلث AMM' قائم الزاوية في M'.

د) أنشئ M' في حالة $z=4+i$.

3- أ) بين أن $\varphi = h \circ r$ حيث r هو الدوران ذو المركز A والزاوية $\frac{\pi}{6}$ و h هو التحافي ذو المركز A والنسبة $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

ب) حدد صورة الدائرة (C) ذات المركز O والشعاع 1 بالتطبيق φ .

4- لكن n عدداً من \mathbb{N} ونعتبر التطبيقات φ_n من \mathbb{C} نحو \mathbb{C} المعرفة بما يلي: $\varphi_n = \varphi \circ \varphi_{n-1}$ و $\varphi_0 = \varphi$.
نضع $M_n = M_{n-1} \varphi_n$ ولتكن z_n لحق النقطة M_n .

أ) احسب z_n .

$$\text{ب) تحقق } M_n = \varphi(M_{n-1}) \text{ واستنتج أن: } z_n = \frac{3+\sqrt{3}i}{4}(z_{n-1} - 2) = \frac{3+\sqrt{3}i}{4}(z_{n-1} - 2) = \frac{3+\sqrt{3}i}{4}(z_{n-1} - 2) = \dots$$

$$\text{ج) نفع } z_n = t_n. \text{ بين بالترجع أن: } t_n = -2 \left(\frac{3+\sqrt{3}i}{4} \right)^n. \text{ ثم حدد } z_n \text{ بدلالة } n.$$

د) اكتب العدد $\left(\frac{3+\sqrt{3}i}{4} \right)^n$ على شكله الجبري ثم حدد قيم n التي من أجلها النقطة M_n تتنبئ إلى المحور (I; O).

a و b عدوان صحيحان طبيعيان بحيث $a > b$. نعتبر العدد $N = ab(a^{30} - b^{30})$.

1- ليكن p عدداً أولياً موجباً بحيث $1-p$ يقسم العدد 30.

أ) بين أن العدد p يقسم N (يمكنك استعمال مبرهنة فيرما)

ب) حدد قيم p واستنتاج أن N يقبل القسمة على 14 322.

$$\text{نفترض أن: } \begin{cases} a^9 + b^9 = 1953637 \\ a^{13} - b^{13} = 1220694933 \end{cases}$$

أ) تتحقق أن $10 < a < b$.

ب) بين أن: $x^{13} = x[5]x^9$ و $x^9 = x[5]$ و $x^9 \equiv x[5]$ (forall $x \in \mathbb{N}$)

ج) استنتاج أن $\begin{cases} a+b \equiv 2[5] \\ a-b \equiv 3[5] \end{cases}$ وحدد قيمة كل من a و b ثم بين أن N يقبل القسمة على 71 610.