

التمرين الأول

3,1

المستوى P منسوب إلى معلم متعامد ممنظم ومباشر $(O; \bar{1}; \bar{i})$. نعتبر التطبيق φ الذي يربط كل نقطة M من P لحقها z بالنقطة M' ذات اللق z' بحيث : $z' = -i\bar{z} + 2i$

فيما يلي نعتبر النقط : A و B و C التي ألقها على التوالي $z_A = 2i$ و $z_B = 2$ و $z_C = \sqrt{2} + \sqrt{2}i$ والنقط M و N و M' و M'' التي ألقها على التوالي z و \bar{z} و z' و \bar{z}' بحيث M' هي صورة M بالتطبيق φ و $z \in \mathbb{C}^* - \{-2\}$.

1- حدد النقطة C' صورة C بالتطبيق φ . 0,50

2- أ) بين أن المستقيمين (ON) و (AM') متعامدان. 0,50

ب) لتكن (S) الدائرة التي مركزها O وشعاعها 2 و (S') الدائرة التي مركزها A وشعاعها 2.

احسب $|z' - 2i|$ بدلالة $|z|$ واستنتج أن : $M \in (S) \Leftrightarrow M' \in (S')$ 0,50

ج) تحقق أن $C \in (S)$ واكتب z_C على الشكل المثلثي ثم أنشئ (S) و (S') و C و C'. 0,50

3- لتكن M نقطة من (S) تخالف B. بين أن : $z = 2e^{i\theta}$ $\exists \theta \in]0; 2\pi[$ ثم حدد معيار وعمدة z' بدلالة θ . 0,50

4- أ) بين أن M' هي صورة M بالدوران r الذي مركزه $\Omega(1-i)$ وزاويته $\frac{\pi}{2}$ 0,50

ب) ليكن n من $\mathbb{N}^* - \{1\}$ ونعتبر النقطة M_n ذات اللق z^n . حدد z إذا علمت أن $r(M_n) = B$. 0,50

التمرين الثاني

3,1

1) بين أن 163 عدد أولي 0,25

2) نعتبر في \mathbb{Z}^2 المعادلة: $13x - 162y = 1$ (E)

أ- حدد حلا خاصا للمعادلة (E) 0,25

ب- حل المعادلة (E) 0,25

3) نعتبر في \mathbb{Z} النظمة : $(S) : \begin{cases} x \equiv a [13] \\ x \equiv b [162] \end{cases}$ حيث a و b عددان من \mathbb{Z}

أ- تحقق من أن العدد $x_0 = 325b - 324a$ هو حل للنظمة (S) 0,25

ب- بين أن : $(S) \Leftrightarrow x \equiv x_0 [2106]$ 0,50

ج- حل في \mathbb{Z} النظمة (S) في الحالة $a = 2$ و $b = 3$ 0,50

4) ليكن x عددا من \mathbb{Z} بحيث : $x^{25} \equiv 3 [163]$

أ- بين أن : $x \wedge 163 = 1$ ثم أن : $x \equiv 3^{13} [163]$ 0,75

ب- استنتج أن : $x \equiv 3^{13} [163] \Leftrightarrow x^{25} \equiv 3 [163]$ 0,75

مسألة كرون

A - 1 - نعتبر الدالة العددية g المعرفة على المجال $[0, +\infty[$ بما يلي : $g(x) = \frac{x}{x+1} - \ln(1+x)$

(أ) ادرس تغيرات الدالة g على المجال $[0, +\infty[$

(ب) استنتج إشارة $g(x)$ على المجال $[0, +\infty[$

2 - نعتبر الدالة العددية f المعرفة على \mathbb{R} بما يلي : $f(x) = e^{-x} \ln(1+e^x)$

(أ) احسب $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$

(ب) احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$

(ج) بين أن f قابلة للاشتقاق على \mathbb{R} وأن : $f'(x) = e^{-x} \left(\frac{e^x}{1+e^x} - \ln(1+e^x) \right)$

(د) ادرس تغيرات الدالة f على \mathbb{R}

3 - ارسم المنحنى الممثل للدالة f في م. م. م (ناخذ $\| \vec{i} \| = \| \vec{j} \| = 2cm$)

4 - بين أن f تقابل من \mathbb{R} نحو مجال J يتم تحديده

(ب) حدد تغيرات التقابل العكسي f^{-1} على المجال J

(ج) ارسم في نفس المعلم المنحنى (C) الممثل للدالة f^{-1}

B - نعتبر المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ المعرفة بما يلي : $u_0 = \frac{1}{2}$ و $u_{n+1} = f(u_n)$ ($\forall n \geq 0$)

1 - بين أنه إذا كان x من المجال $\left[\frac{1}{2}, \frac{3}{5} \right]$ فإن $f(x) \in \left[\frac{1}{2}, \frac{3}{5} \right]$

(ب) بين أن المعادلة $f(x) = x$ تقبل حلا وحيدا α وأن : $\frac{1}{2} \leq \alpha \leq \frac{3}{5}$

2 - ادرس إشارة : $f(x) - x$

3 - لكل عدد صحيح طبيعي n نضع : $v_n = u_{2n}$ و $w_n = u_{2n+1}$

(أ) بين أن المتتاليتين $(v_n)_n$ و $(w_n)_n$ متحاديتين (لاحظ أن $u_0 \leq \alpha$)

(ب) استنتج أن المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ متقاربة وأن $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \alpha$

C - 1 - بين أن : $(\forall x \in \mathbb{R}) f'(x) + f(x) = \frac{1}{1+e^x}$

(ب) استنتج الدالة الأصلية F للدالة f على المجال \mathbb{R} التي تنعدم في 0

2 - بين أنه لكل عدد صحيح طبيعي $n \geq 2$ يوجد عدد حقيقي وحيد x_n من \mathbb{R}_+^* بحيث : $f(x_n) = \frac{1}{n}$

(ب) بين أن المتتالية $(x_n)_{n \geq 2}$ تزايدية

(ج) بين أن $(x_n)_{n \geq 2}$ غير مكبورة ثم استنتج أن $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = +\infty$

3 - نعتبر المتتالية $(v_n)_{n \geq 2}$ المعرفة بما يلي : $v_n = \int_0^{x_n} f(x) dx$

(أ) بين أن $(v_n)_{n \geq 2}$ تزايدية وأن : $(\forall n \geq 2); 0 \leq v_n \leq 2 \ln(2)$

(ب) بين أن $(v_n)_{n \geq 2}$ متقاربة وأن $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 2 \ln(2)$

التمرين الثالث: (3,5 ن)

تذكير: $(M_3(\mathbb{R}), +, \times)$ حلقة واحدة و $(M_3(\mathbb{R}), +, 0)$ فضاء متجهي حقيقي.
 (1) نرود المجموعة $G = \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$ بقانون التركيب الداخلي T المعروف بما يلي:

$$(\forall (a;b) \in G)(\forall (c;d) \in G) \quad (a;b)T(c;d) = (ac; ad+bc)$$

أ- بين أن القانون T تبادلي وتجميعي

ب- تحقق من أن $(1;0)$ هو العنصر المحايد للقانون T

ج- بين أن (G, T) زمرة تبادلية

د- ليكن n من $\mathbb{N}^* - \{1\}$ ، بين أن: $\underbrace{(-1;1)T \dots T(-1;1)}_{n \text{ مرات}} = ((-1)^n; n(-1)^{n+1})$

(2) لكل $(a;b)$ من \mathbb{R}^2 ، نضع: $M_{(a;b)} = \begin{pmatrix} a & b & 0 \\ 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix}$ ونعتبر المجموعة $E = \{M_{(a;b)} / (a;b) \in G\}$

أ- بين أن E جزء مستقر من $(M_3(\mathbb{R}), \times)$

ب- بين أن التطبيق: $f: G \rightarrow E$
 $(a;b) \mapsto M_{(a;b)}$ تشاكل تقابلي من (G, T) نحو (E, \times)

ج- استنتج بنية $(E; \times)$ ثم حدد مقلوب كل مصفوفة $M_{(a;b)}$ من E

د- نضع: $A = M_{(-1;1)}$ ، احسب: A^n لكل n من $\mathbb{N}^* - \{1\}$

(3) نعتبر المجموعة $F = \{M_{(a;b)} / (a;b) \in \mathbb{R}^2\}$

أ- بين أن $(F; +, 0)$ فضاء متجهي حقيقي

ب- حدد $\dim F$