


التحكم في المجموعات الكيميائية بتغيير متفاعل


1 (استبدال الحمض بأحد مشتقاته (أندريد الحمض) .

الاسترة تفاعل محدود و بطيء ، لكن يمكن جعله سريعا و كليا بتعويض الحمض الكربوكسيلبي بأندريد الحمض الموافق .
نحصل على أندريد الحمض بإزالة الماء من الحمض الكربوكسيلبي و فق المعادلة التالية :




لتسمية أندريد الحمض يكفي استبدال كلمة حمض بكلمة أندريد من إسم الحمض الكربوكسيلبي الموافق

أمثلة :




غالبا توجد الأندريدات في الحالة السائلة أو الصلبة ، شديدة التفاعل مع الماء . لذلك يجب تفادي لمسها (استعمال قفازات ، نظارات و الاحتعال في مكان معزول به مدخنة) .
مثال لتفاعل الأسترة باستعمال أندريد الحمض : تصنيع إيتانوات البوتيل



بالنسبة لهذه الاسترة ، تعويض حمض الإيتانويك بأندريد الإيتانويك أحد الطرق التي تمكن من رفع مردود الأسترة .


مثال تطبيقي : تصنيع الأسبرين .

الأسبرين ، أو حمض الأسيتيل ساليسيليك ، إستر نحصل عليه انطلاقا من حمض الساليسيليك . استعمال حمض الإيتانويك يؤدي إلى الحصول على مردود ضعيف غير مفيد بالنسبة للصناعة : لذا يستعمل عوضه أندريد الإيتانويك .




(2) الحلمة القاعدية لإستر : تفاعل التصبن .


تفاعل إستر مع أيونات الهيدروكسيد (HO^-) يؤدي إلى تكزن كحول و أيونات الكربوكسيلات القاعدة المرافقة للحمض الكربوكسيلي . هذا التفاعل الذي هو حلمة قاعدية للإستر (نعوض الماء ب HO^-) تسمى تصبن . و هو تفاعل كلي ، سريع و ناشر للحرارة .



نحصل على الصابون انطلاقا من ثلاثي الغليسيريدي (مادة دهنية : زيت ، شحم ...) . و هو ثلاثي إستر ناتج عن تفاعل أسترة بين البروبانول - 1,2 ، 3 ثلاثي أول (غليسول) و أحماض دهنية (أحماض ذات سلسلة كربونية طويلة غير متفرعة) .



الأولييين ثلاثي غليسريد يدخل في تركيب زيت الزيتون .
أحماض دهنية أخرى : حمض اللوريك ، حمض البالميتيك ، بعض الأحماض الدهنية تكون غير مشبعة (تحتوي على رابطة مزدوجة) .
تصبن جسم دهني يتحقق بواسطة أيونات الهيدروكسيد $HO^-_{(aq)}$ لمحلول الصودا (صابون صلب) أو لمحلول البوتاس (صابون رطب) .





* ملحوظات :

- إن خصائص الصابون الناتج تتعلق بطبيعة الأحماض الدهنية التي تدخل في تحضير الغستر الدهني (ثلاثي الغليسريد) وكذلك بالملونات و المعطرات أو بعض الأدوية المضافة للصابون عند تصنيعه .
- تتجه الصناعة حاليا إلى التفكير في استعمال الغستر المتواجد في زيت نبات الكولزا (Colza) كوقود للسيارات ، لأن له خصائص مماثلة لوقود المازوت بالإضافة إلى كونه أقل تلوثا لعدم احتوائه على الكبريت .

* تجربة :

- تحضير خليط يتكون من : 20mL من هيدروكسيد الصوديوم تركيزه المولي $C = 10 \text{ mol/L}$ - 20mL من الإيتانول 90° - 20mL من زيت المائدة
- نضيف لهذا الخليط بعض الحبيبات من حجر خفان .
- نضع الخليط في حوجلة و نصلها بمبرد مقبب ثم نسخن الحوجلة مدة 20 min (التسخين بالإرتداد) .
- نفرغ الخليط في كأس يحتوي على محلول كلورور الصوديوم ، فنلاحظ توضع الصابون الشكل أسفله:
- الإيتانول يعمل على تجانس الخليط التفاعلي . في نهاية التفاعل نستعمل الملح لفصل الصابون عن الطور المائي .



Après quelques minutes

الصابون المحل عليه هو أولييات الصوديوم .

- حساب كميات المادة البدئية للزيت و الصودا :

$$n_1(\text{huile}) = \rho_h \cdot \frac{V_h}{M_h} = 0,92 \cdot \frac{20 \cdot 10^{-3}}{884} = 2,1 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$$

$$n_2(\text{soude}) = C \cdot V = 10 \cdot 20 \cdot 10^{-3} = 2,0 \cdot 10^{-1} \text{ mol}$$

أولييين	هيدروكسيد الصوديوم	صابون	جليسرول	
n_1	n_2	0	0	الحالة البدئية
$n_1 - x$	$n_2 - 3x$	$3x$	x	خلال التفاعل
$n_1 - x_{\max}$	$n_2 - 3x_{\max}$	$3x_{\max}$	x_{\max}	الحالة النهائية

إذا كان الزيت هو المتفاعل المحد فإن : $x_{\max} = 2,1 \cdot 10^{-2} \text{ molL}$ $n_1 - x_{\max} = 0 \Rightarrow$

إذا كانت الصودا هي المتفاعل المحد فإن : $x_{\max} = \frac{n_2}{3} = 6,7 \cdot 10^{-2} \text{ molL}$ $n_2 - 3x_{\max} = 0 \Rightarrow$

إذن الزيت هو المتفاعل المحد (أصغر قيمة ل x_{\max}) و $x_{\max} = n_1 = 2,1 \cdot 10^{-2} \text{ molL}$


• كتلة الصابون القصوية الممكن الحصول عليها :

$m_{\max}(\text{savon}) = n_{\max}(\text{savon}) \cdot M(\text{savon}) = 6,3 \cdot 10^{-2} \times 302 = 19\text{g}$ و منه $n_{\max}(\text{savon}) = 3x_{\max} = 6,3 \cdot 10^{-2} \text{ molL}$

*** الخصائص المنظفة للصابون :**

الصابون قابل للذوبان في الماء المقطر (إلى حدود 100g/L) ، لكن قليل الذوبان في الماء المالح أو المياه التي تحتوي على أيونات $\text{Ca}_{(\text{aq})}^{2+}$ أو $\text{Mg}_{(\text{aq})}^{2+}$ حيث يترسب .

أيونات الكربوكسيلات التي تنتج عن أحماض دهنية لها سلسلة كربونية طويلة . و هذا يجعلها تكسب الخاصية :



- رأس أيوني قطبي هيدروفيلي قابل للذوبان في الماء ز
- سلسلة كربونية طويلة غير قطبية هيدروفوبية غير قابلة للذوبان في الماء ، لكنها تقبل التماس من الدهون لذا نقول بأنها جزء ليوفيلي .

في محلول مائي ، أيونات الكربوكسيلات تكون مجموعات خاصة تسمى الميسيلات (micelles)

