

## تصحيح تمارين الموجات الميكانيكية المتوالية الجيبية

### التمرين 1:

1-الموجة التي تنتشر على سطح الماء مستعرضة.

2-لحساب طول الموجة  $\lambda$  نستعمل العلاقة:

$$V = \lambda N \quad \text{وبالتالي: } \lambda = \frac{V}{N}$$

$$\lambda = \frac{12}{200} \quad \text{ت.ع:}$$

$$\lambda = 0,06\text{m} = 6\text{cm}$$

3- نحسب النسبة  $SM_1/\lambda$  نجد:

$$SM_1 = \lambda + \lambda/2 \quad \text{أي} \quad SM_1 = (2K+1)\frac{\lambda}{2} \quad \text{مع } K=1 \quad \frac{9}{6} = 1,5$$

$S$  و  $M_1$  تهتزتان على تعاكس في الطور.

نحسب النسبة  $SM_2/\lambda$  نجد:

$$SM_2 = 3\lambda \quad \text{اذن } \frac{18}{6} = 3$$

$S$  و  $M_2$  تهتزتان على توافق في الطور.

لمقارنة حركة  $M_1$  و  $M_2$  نقارن بين المسافة  $M_1M_2$  و  $\lambda$

$$M_1M_2 = SM_2 - SM_1 \quad \text{لدينا:}$$

$$= 18 - 9 = 9\text{cm}$$

$$M_1M_2/\lambda = 1,5 \quad \text{نكتب على الشكل:} \quad M_1M_2 = (2K+1)\frac{\lambda}{2} \quad \text{مع } k=1 \in \mathbb{Z}$$

$M_1$  و  $M_2$  تهتزتان على تعاكس في الطور.

4-استطالتي  $M_1$  و  $M_2$  متقابلتان نكتب:

$$Y_{M_2} = -Y_{M_1}$$

$$Y_{M_2} = -(-3\text{mm}) = 3\text{mm} \quad \text{فان:}$$

$$Y_{M_1} = -3\text{mm} \quad \text{بما أن}$$

موضع النقطة  $M_2$  على مسافة 3mm فوق موضع سكونها.

## التمرين 2:

1- إذا كان الحبل يبدو ساكنا عند اضاءته بوماض تردد ومضاته  $N_S=25\text{Hz}$  فإن  $N$  و  $N_S$  تردد الموجات يحققان العلاقة:  
مع  $N=kN_S$   $k \in \mathbb{N}^*$

$$\text{اذن: } N_S = \frac{N}{k}$$

اكبر قيمة ل  $N_S$  توافقتها اصغر قيمة ل  $k$  أي  $k=1$

$$\text{اذن: } N_S = N = 25\text{Hz}$$

نستنتج الدور  $T$ :

$$T = \frac{1}{N} \text{ ت.ع } T = \frac{1}{25} \text{ وبالتالي: } T = 0,01\text{s}$$

2-1- مبيانيا طول الموجة هي:  $\lambda = 4\text{cm}$

$$\text{لدينا العلاقة } v = \lambda N$$

$$\text{ت.ع: } v = 4 \cdot 10^{-2} \times 25$$

$$v = 1\text{m.s}^{-1}$$

2-2- تقطع الموجة خلال المدة  $\Delta t = t_1 - t_0$  المسافة  $d$  بسرعة  $v$ .

$$\text{نكتب: } v = \frac{d}{\Delta t} = \frac{d}{t_1 - t_0} \text{ ومنه: } t_1 - t_0 = \frac{d}{v}$$

$$\text{نستنتج: } t_1 = \frac{d}{v} + t_0$$

$$\text{ت.ع: } t_1 = \frac{0,06}{1} + 1$$


2-3- لتمثيل مظهر الحبل عند اللحظة  $t_2$  نحدد المسافة التي قطعتها الموجة خلال المدة  $\Delta t = t_2 - t_0 = t_2$

$$d = vt_2$$

ت.ع:

$$d = 2\lambda + \lambda/4 \text{ نلاحظ أن: } d = 0,09\text{m} = 9\text{cm}$$

مظهر الحبل عند اللحظة  $t_2$




2-2- النقطة M تعيد نفس حركة المنبع بعد تأخر زمني  $\tau$  حيث :

$$\tau = \frac{SM}{v} = 4.10^{-2} \text{ s} \quad \text{ت.ع.}$$

نكتب:  $Y_M(t) = Y_S(t - \tau)$  مع  $t \geq \tau$  نستنتج استطالة النقطة M من استطالة المنبع S بازاحة قدرها  $\tau = T$

نحصل على المبيان التالي :



4-2- النقطة التي تهتز على توافق في الطور مع المنبع هي التي تحقق العلاقة:  $SM = k\lambda$  مع  $k \in \mathbb{N}^*$

$$0 < SM \leq L$$

$$0 < k\lambda \leq L$$

$$0 < k \leq \frac{L}{\lambda}$$

ت.ع.

$$0 < k \leq 12,5$$

$$0 < k \leq \frac{0,5}{0,04}$$

يوجد 12 نقطة تهتز على توافق في الطور مع المنبع S .

### تمرين 3:

1 - لحساب التردد  $\nu$  نحدد دور الموجة الصوتية .

$$T = 3 \text{ div } \frac{1}{6}$$

$$T = 0,5 \text{ ms} = 5.10^{-4} \text{ s}$$

$$\nu = \frac{1}{0,0005} = 2000 \text{ Hz}$$

$$\nu = 2 \text{ kHz}$$

1-2- المسافة بين نقطتين متتاليتين على توافق في الطور تساوي طول الموجة  $\lambda$ .

$$x_{i+1} - x_i = \lambda_i$$

متوسط طول الموجة :

$$\lambda = \frac{(34,2 - 17,0) + (51,0 - 34,2) + (67,9 - 51,0) + (85,0 - 67,9)}{4}$$

$$\lambda = 17 \text{ cm}$$

2-2- سرعة انتشار الموجة الصوتية :

$$v = \lambda \nu$$

$$\nu = 0,17 \times 2000$$

$$v = 340 \text{ m.s}^{-1}$$