



الثانية باكوريا  
الفيزياء

الجزء الثاني :  
التحولات النووية  
الوحدة 2  
10 س / 5 س

# النوى - الكتلة والطاقة

## Noyaux - masse & énergie



### 1- التكافؤ " كتلة - طاقة " :

#### 1-1- علاقة أينشتاين :

توصل أينشتاين من خلال الميكانيك النسبوية الخاصة سنة 1905 م ، إلى أن هناك تكافؤ بين الكتلة والطاقة .

تمتلك كل مجموعة كتلتها ، في حالة سكون ، طاقة  $E$  تسمى **طاقة الكتلة** .  
تعبيرها هو :  $E = m \cdot c^2$  وحدتها هي الجول  $J$  حيث  $c$  : سرعة الضوء في الفراغ  $c = 299792458 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} \approx 3 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$

تبين هذه العلاقة أنه عندما تتغير كتلة مجموعة بالمقدار  $\Delta m$  خلال تحول ما ، يكون تغير الطاقة الكتلية لهذه المجموعة هو :  $\Delta E = \Delta m \cdot c^2$  .

عندما تنقص كتلة مجموعة في سكون ( $\Delta m < 0$ ) ، فإن طاقتها الكتلية تنقص كذلك ( $\Delta E < 0$ ) :  
تمنح المجموعة طاقة للوسط الخارجي . وعندما تزداد الكتلة ( $\Delta m > 0$ ) ، فإن المجموعة تستقبل طاقة من الوسط الخارجي ( $\Delta E > 0$ ) .

#### 1-2- وحدات الكتلة والطاقة :

وحدة الطاقة في (ن.ع) هي الجول  $J$  ، لكن في الفيزياء النووية يفضل استعمال **الإلكترون-فولط (eV)** ومضاعفاته حيث  $1 \text{ eV} = 1,602177 \cdot 10^{-19} \text{ J}$  و  $1 \text{ MeV} = 10^6 \text{ eV}$

أما بالنسبة للكتلة الذرية نستعمل **وحدة الكتلة الذرية  $u$**  وهي تساوي  $\frac{1}{12}$  من كتلة ذرة الكربون 12 .  
نعلم أن مولا واحدا من ذرات الكربون 12 يتكون من  $\mathcal{N} = 6,02 \cdot 10^{23}$  ذرة وكتلته هي 12g . وبالتالي :

$$1u = 1,66054 \cdot 10^{-27} \text{ kg} \quad \text{فنجذ} \quad 1u = \frac{1}{12} m(^{12}_6\text{C}) = \frac{M(^{12}_6\text{C})}{12 \cdot N_A} = \frac{12}{12 \times 6,02 \cdot 10^{23}}$$

الطاقة المكافئة لوحدة الكتلة الذرية هي :


$$E = m \cdot c^2 = 1u \cdot c^2 = 1,66054 \cdot 10^{-27} \times (299792458)^2 = 1,49242 \cdot 10^{-10} \text{ J}$$

أي  $E = \frac{1,49242 \cdot 10^{-10}}{1,602177 \cdot 10^{-13}} = 931,5 \text{ MeV}$  ومنه فإن  $1u = 931,5 \frac{\text{MeV}}{c^2}$

### 2- طاقة الربط :

#### 1-2-1- النقص الكتلي :

بينت القياسات الدقيقة أن كتلة النواة تكون دائما أقل من مجموع كتل الدقائق المكونة لها .



فمثلا كتلة نواة الهيليوم  $^4_2\text{He}$  هو  $m(^4_2\text{He}) = 6,6447 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$  أما مجموع كتل نوياتها فيساوي  $2m_p + 2m_n = 2 \times 1,6726 \cdot 10^{-27} + 2 \times 1,6750 \cdot 10^{-27} = 6,6952 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$   
نستخلص إذن أن كتلة نواة الهيليوم أصغر من مجموع كتل نوياتها .


نسمي **النقص الكتلي  $\Delta m$**  لنواة رمزها  $^A_Z X$  هو الفرق بين مجموع كتل النويات وكتلة النواة  $\Delta m = [Zm_p + (A - Z)m_n] - m$  مع  $\Delta m > 0$  و  $m$  كتلة النواة

**مثال :** النقص الكتلي لنواة الهيليوم هو :

$$\Delta m = 6,6952 \cdot 10^{-27} - 6,6447 \cdot 10^{-27} = 5,0520 \cdot 10^{-29} \text{ kg}$$

**2-2- طاقة الربط :**

تتماسك النواة نظرا لوجود قوى التأثيرات البينية القوية ، و لفصل نوياتها يجب إعطائها طاقة تسمى طاقة الربط .



طاقة الربط  $E_l$  لنواة هي الطاقة التي يجب إعطائها للنواة ، في حالة سكون ، لفصل نوياتها وتبقى في حالة سكون :

$$E_l = \Delta m \cdot c^2 = [Zm_p + (A - Z)m_n - m(\frac{A}{Z}X)] \cdot c^2$$

مع  $\Delta m$  النقص الكتلي

**مثال :** طاقة الربط بالنسبة لنواة الهيليوم هو :

$$E_l = \Delta m \cdot c^2 = 5,0520 \cdot 10^{-29} \times (3 \cdot 10^8)^2 = 4,55 \cdot 10^{-12} \text{ J}$$

$$E_l = \frac{4,55 \cdot 10^{-12}}{1,6 \cdot 10^{-19}} = 2,84 \cdot 10^7 \text{ eV} = 28,4 \text{ MeV}$$

**3-2- طاقة الربط بالنسبة لنوية :**

تعرف  $\xi$  طاقة الربط بالنسبة لنوية بالعلاقة :  $\xi = \frac{E_l}{A}$  حيث  $E_l$  طاقة الربط للنواة و  $A$  عدد النويات


وحدة  $\xi$  هي  $\text{MeV/nucleon}$

كلما كانت طاقة الربط بالنسبة لنوية كبيرة ، كلما كانت النواة أكثر استقرارا .

**مثال :** طاقة الربط بالنسبة لنوية الهيليوم هو :

$$\xi(\frac{4}{2}\text{He}) = \frac{E_l}{A} = \frac{28,4}{4} = 7,1 \text{ MeV/nucleon}$$

**4-2- منحني أسطون :**



يمكن مقارنة استقرار مختلف النوى وذلك بخط منحني (ξ-) بدلالة A (منحني أسطون) . انطلاقا من المنحني نلاحظ بالنسبة لـ :

■  $20 < A < 195$  : نلاحظ على المنحني قيما دنيا لـ (ξ-) ، تقارب قيمتها المطلقة

. وتضم هذه المنطقة النوى الأكثر استقرارا .  $8MeV/nucleon$

■  $A < 20$  و  $A > 195$  : نلاحظ أن (ξ-) ضعيفة بالنسبة لهذه النوى ، وهذا ما يؤكد أنها

غير مستقرة بحيث يمكنها أن تتحول إلى نوى مستقرة عن طريق الانشطار النووي بالنسبة للنوى الثقيلة ( $A > 195$ ) أو عن طريق الاندماج النووي بالنسبة للنوى الخفيفة ( $A < 20$ ) .

### 3- الانشطار و الاندماج النوويان : ( خاص بـ : ع.ف / ع.ر )

#### 1-3-1- الانشطار النووي :

##### 1-1-3- تعريف :

الانشطار النووي تفاعل نووي تنقسم خلاله نواة ثقيلة شظورة ( قابلة للانشطار ) ، بعد التقاطها لنيوترون حراري إلى نواتين خفيفتين

##### مثال :



##### 1-3-2- تفاعل متسلسل :

يمكن للنيوترونات الناتجة عن الانشطار النووي أن :

☞ تقلت من وسط التفاعل .

☞ تلتقطها نوى غير شظورة .

☞ تتسبب في انشطار نوى أخرى ، مساهمة في حدوث تفاعل متسلسل قد يتم بكيفية تفجيرية ، إذا كان غير متحكم فيه ، وهذا ما يحدث في القنبلة النووية A . أما في المفاعلات النووية فيتم التحكم في التفاعل المتسلسل بحيث تنتج الطاقة بكيفية منتظمة ( عن طريق امتصاص النيوترونات بواسطة قضبان من الكاديوم ) .

##### 1-3-2- الاندماج النووي :

##### 1-2-3- تعريف :

الاندماج النووي تفاعل يتم فيه انضمام نواتين خفيفتين لتكوين نواة أكثر ثقلا

##### مثال :




تقع تفاعلات الاندماج داخل الشمس حيث يتم خلالها تكون الهيليوم انطلاقا من الهيدروجين ، وفق ثلاث مراحل :



##### 1-2-3- شروط تحقيق الاندماج النووي :

لايتحقق الاندماج النووي إلا إذا كان للنواتين الخفيفتين طاقة تمكنهما من

التغلب على قوى التأثيرات البينية التنافرية . ويتطلب توفير هذه الطاقة درجة حرارة عالية . ولهذا السبب ينعى الاندماج بالتفاعل النووي الحراري .




● بروتون ● نيوترون

#### 4- الحصيلة الكتلية والطاقة لتفاعل نووي :

##### 1-4- الحالة العامة :

نعتبر المعادلة العامة لتفاعل نووي



حيث  $X$  رمز نواة أو ذريرة .  
الحصيلة الطاقة لهذا التفاعل هي

$$E_l(X_1) + E_l(X_2) = E_l(X_3) + E_l(X_4) + \Delta E$$

مع  $E_l$  طاقة الربط للنواة  $\Delta E$  طاقة التفاعل وهي مقدار جبري

$\Delta E < 0$  يكون التفاعل ناشرا للطاقة

$\Delta E > 0$  يكون التفاعل ماصا للطاقة

$$\Delta E = [E_l(X_1) + E_l(X_2) - E_l(X_3) - E_l(X_4)]$$

حسب تعريف طاقة الربط

$$E_l({}_Z^AX) = [Zm_p + (A - Z)m_n - m({}_Z^AX)].c^2$$

وباستعمال قانوني سودي  $Z_1 + Z_2 = Z_3 + Z_4$

و  $A_1 + A_2 = A_3 + A_4$

$$\Delta E = [m(X_3) + m(X_4) - m(X_1) - m(X_2)].c^2$$

$$\Delta E = \Delta m.c^2 = [m(\text{الناتج}) - m(\text{المتفاعلات})].c^2$$

**ملحوظة :** الطاقة المحررة خلال تفاعل ناشر للطاقة هي  $\xi_l = -\Delta E > 0$

#### 2-4- تطبيقات على الانشطار والاندماج النوويين : (خاص ب: ع.ف / ع.ر.)

##### 1-2-4- الانشطار النووي :

نعتبر معادلة الانشطار النووي التالية :



$$\Delta E = \Delta m.c^2 = [m(\text{الناتج}) - m(\text{المتفاعلات})].c^2$$

$$\Delta E = [m({}_{55}^{140}\text{Cs}) + m({}_{37}^{93}\text{Rb}) + 3m({}_0^1n) - m({}_{92}^{235}\text{U}) - m({}_0^1n)].c^2$$

${}_{92}^{235}\text{U}$	${}_{55}^{140}\text{Cs}$	${}_{37}^{93}\text{Rb}$	${}_0^1n$
234,99346	139,88711	92,90174	1,00866
<b>كتل النوى المتدخلة في تفاعل الانشطار (u)</b>			

$$\Delta E = \Delta m.c^2 = -2,7952.10^{-11}\text{J} = -174,46\text{MeV}$$

إذن انشطار نواة واحدة من الأورانيوم 235 يحترق طاقة  $\xi_l = -\Delta E = 174,46\text{MeV}$


##### 2-2-4- الاندماج النووي :



$$\Delta E = \Delta m.c^2 = [m(\text{الناتج}) - m(\text{المتفاعلات})].c^2$$

$$\Delta E = [m({}_2^4\text{He}) + m({}_0^1n) - m({}_1^2\text{H}) - m({}_1^3\text{H})].c^2$$

${}_1^2\text{H}$	${}_1^3\text{H}$	${}_2^4\text{He}$	${}_0^1n$
2,01355	3,01550	4,00150	1,00866
<b>كتل النوى المتدخلة في تفاعل الانشطار (u)</b>			



مخطط الطاقة لتفاعل نووي عام :

$E_i$  : الطاقة البدنية للمجموعة ( المتفاعلات )

$E_f$  : الطاقة النهائية للمجموعة ( الناتج )

الطاقة التي تكتسبها

المجموعة لتفكيك النواتين  $X_2$  و  $X_1$  إلى

نويات

الطاقة التي  $-[E_l(X_3) + E_l(X_4)]$


تحررها المجموعة عند تكون النواتين  $X_3$  و

$X_4$  انطلاقا من نويات


$\Delta E < 0$  : إجمالا ، المجموعة تحرر الطاقة

أثناء هذا التفاعل النووي ، وبذلك تصبح أكثر

استقرارا .



مخطط الطاقة لتفاعل انشطار



تفاعل الاندماج النووي داخل الشمس

إذن  $\Delta E = \Delta m \cdot c^2 = -17,585 \text{ MeV} = -17,6 \text{ MeV}$

إذن تفاعل الاندماج يحرر طاقة  $\xi_l = -\Delta E = 17,6 \text{ MeV}$

**3-4- تطبيقات على التحولات النووية التلقائية:**

تدل إشارة  $\Delta E$  على أن المجموعة تكون إما ناشرة للطاقة (تحرر الطاقة للوسط الخارجي) :  $\Delta E < 0$

، أو ماصة للطاقة (تكتسب الطاقة من المحيط الخارجي) :  $\Delta E > 0$ .

بالنسبة للتحولات النووية التلقائية، تكون  $\Delta E$  دائما سالبة ( $\Delta E < 0$ ) ونرمز لها بالحرف  $\xi_l$ ، وتسمى الطاقة المتحررة. وتظهر هذه الطاقة على شكل طاقة حركية تكتسبها على الخصوص الدقائق المنبعثة.

**1-3-4- النشاط الإشعاعي  $\alpha$ :**




الطاقة المتحررة خلال النشاط الإشعاعي  $\alpha$  هي :

$E = \Delta m \cdot c^2 = [m({}^4_2\text{He}) + m({}^{A-4}_{Z-2}Y) - m({}^A_ZX)].c^2$

**مثال:**  ${}^{226}_{88}\text{Ra} \rightarrow {}^{222}_{86}\text{Rn} + {}^4_2\text{He}$ . كتل النوى (u) هي :

${}^{226}_{88}\text{Ra}$	${}^{222}_{86}\text{Rn}$	${}^4_2\text{He}$
225,9770	221,9702	4,0015



$E = [m({}^4_2\text{He}) + m({}^{222}_{86}\text{Rn}) - m({}^{226}_{88}\text{Ra})].c^2 = -4,94 \text{ MeV}$

**2-3-4- النشاط الإشعاعي  $\beta^-$ :**




الطاقة المتحررة خلال النشاط الإشعاعي  $\beta^-$  هي :

$E = \Delta m \cdot c^2 = [m({}^0_{-1}e^-) + m({}^A_{Z+1}Y) - m({}^A_ZX)].c^2$

**مثال:**  ${}^{60}_{27}\text{Co} \rightarrow {}^{60}_{28}\text{Ni} + {}^0_{-1}e^-$ . كتل النوى (u) هي :

${}^{60}_{27}\text{Co}$	${}^{60}_{28}\text{Ni}$	${}^0_{-1}e^-$
59,9190	59,915	$5,49 \cdot 10^{-4}$



$E = [m({}^0_{-1}e^-) + m({}^{60}_{28}\text{Ni}) - m({}^{60}_{27}\text{Co})].c^2 = -2,84 \text{ MeV}$

**3-3-4- النشاط الإشعاعي  $\beta^+$ :**




الطاقة المتحررة خلال النشاط الإشعاعي  $\beta^+$  هي :

$E = \Delta m \cdot c^2 = [m({}^0_1e^+) + m({}^A_{Z-1}Y) - m({}^A_ZX)].c^2$

**مثال:**  ${}^{13}_7\text{N} \rightarrow {}^{13}_6\text{C} + {}^0_1e^+$ . كتل النوى (u) هي :

${}^{13}_6\text{C}$	${}^{13}_7\text{N}$	${}^0_1e^+$
13,000062	13,001898	$5,49 \cdot 10^{-4}$



$E = [m({}^0_1e^+) + m({}^{13}_6\text{C}) - m({}^{13}_7\text{N})].c^2 = -1,999 \text{ MeV}$

**5- استعمالات وأخطار النشاط الإشعاعي :****5-1- المفعول البيولوجي للإشعاعات :**

عند اختراقها للمادة تحدث الدقائق ، الناتجة عن الأنشطة الإشعاعية وكذلك الإشعاع  $\gamma$  ، تأينا في مسارها ويمكنها بذلك أن تحدث تفاعلات كيميائية في جزيئة المادة الحية . وقد تتسبب في طفرة وراثية إذا ما غيرت بنية جزيئة **ADN** . ويرتبط تأثير الإشعاعات على الأنسجة الحية بـ :


⊕ عدد الدقائق التي يتلقاها النسيج الحي ، وهذا يتعلق بنشاط

العينة وبعها ومدة التعرض للإشعاع .

⊕ الطاقة التي تودعها في النسيج .

⊕ نوع النشاط الإشعاعي ( $\alpha$  ،  $\beta^-$  ،  $\beta^+$  ،  $\gamma$ ) .

⊕ طبيعة النسيج الذي أصيب .



القدرة الإخترافية للدقائق  $\alpha$  و  $\beta$  و  $\gamma$

**5-2- استعمالات النشاط الإشعاعي :**

للطاقة النووية استعمالات متعددة وفي مجالات مختلفة ، منها :

✍ **الصناعة :** إنتاج الطاقة الكهربائية ، إنجاز اختبارات الجودة والكشف عن العيوب الصناعية و إنتاج أشباه الموصلات .....

✍ **الفلحة :** مقاومة الآفات و الحشرات ، زيادة مدة تخزين المنتجات الزراعية ، انتقاء نوعيات معينة من البذور ، استنباط أنواع جديدة من المحاصيل ذات إنتاجية عالية .....

✍ **الطب :** معالجة الأورام السرطانية ، تعقيم الأدوات الطبية ، استعمال المواد الاستشفائية للتعرف على بعض الأمراض .....

**5-3- أخطار النشاط الإشعاعي :**

على غرار مصادر الطاقة جميعها ، للطاقة النووية أضرار يمكن إيجازها في :

⊕ **الإنفجارات النووية** ذات القوة التدميرية الكبيرة التي تنتج إشعاعات بكميات كبيرة ، تؤدي إلى وفاة الكائنات الحية أو إصابتها بسرطانات أو حروق و إلحاق أضرار جسيمة بالبيئة ولمدة طويلة كما حدث عند تفجير أولى القنابل النووية بهيروشيما و ناكازاكي باليابان سنة 1945 .

⊕ **المفاعلات النووية** تتعرض لبعض الأعطال التي تؤدي إلى تسرب الوقود النووي المشع كما حدث في تشرنوبيل بأوكرانيا سنة 1986 . وتخليقها لنفايات مشعة تطرح مشكل التخلص منها .