

1-1: وحدة الكتلة الذرية ($u.m.a$)

$$1u = \frac{1}{12} \cdot \frac{12 \cdot 10^{-3}}{6,03 \cdot 10^{23}} = 1,66 \cdot 10^{-27} kg$$

وحدة الكتلة الذرية هي: $1/12$ من كتلة ذرة الكربون 12 :
 $1\mu = \frac{1}{12} \cdot \frac{M}{N_A} \Leftrightarrow m = \frac{M}{N_A}$

2- وحدة الطاقة : الإلكترون- فولط.

$$1eV = 1,602177 \cdot 10^{-19} J$$

في الفيزياء النووية يسْتَعْمِلُ الـ إلكترون - الفولط (eV) ومصاعفه
كوحدة لطاقة عوض الجول (J).

3- الطاقة المكافئة لوحدة الكتلة الذرية:

علاقة التكافؤ " كتلة – طاقة " لأينشتاين: تمتلك كل مجموعة كتلتها m ، في حالة سكون ، طاقة E تسمى طاقة الكتلة :
 حيث $c = 3.10^8 m.s^{-1}$: سرعة الضوء.
 حسب علاقة اينشتاين الطاقة التي تكافئ $1u$ هي :


$$E = m_u \cdot c^2 = 1,6605 \cdot 10^{-27} \cdot (3.10^8)^2 = 1,49445 \cdot 10^{-10} J$$

$$1u = 931,5 MeV / c^2 \Leftrightarrow$$

$$E = \frac{1,49445 \cdot 10^{-10}}{1,6 \cdot 10^{-13}} = 931,5 MeV$$


2- طاقة الرابط - Energie de liaison -

2-1: النقص الكتلي - Défaut de masse



نسمى النقص الكتائي Δm الفرق بين مجموع كتل النويات منفصلة و كتلة النواة متماضكة : $(\Delta m > 0)$
 ملحوظة " كتلة النواة تكون دائما أقل من مجموع كتل النويات المكونة لها "

2-2: طاقة الرابط



نسمى طاقة الرابط E_l لنواة ${}_Z^A X$ ، الطاقة اللازم منحها للنواة في حالة سكون لفصل نوياتها و تبقى في حالة سكون "

$$E_l = E_f - E_i$$

$$E_l = [Z \cdot m_p + (A - Z) m_n - m ({}^A_Z X)] \cdot c^2$$

$$E_l = \Delta m \cdot c^2 > 0$$

ملحوظة: عندما تتغير كتلة المجموعة بالمقدار Δm ، يصاحب هذا التغير تغير في الطاقة الكتيلية $\Delta E = \Delta m \cdot c^2$.
 (تنقص كتلة المجموعة في سكون) ; $\Delta E < 0$ * : فقد المجموعة طاقة .

2-3: طاقة الرابط بالنسبة لنوية – Energie de liaison par nucléon


تعرف طاقة الرابط بالنسبة لنوية بالعلاقة : $\frac{E_l}{A}$ وحدتها هي : MeV/nucléon

حيث E_l طاقة الرابط للنواة و A عدد النويات .

ملحوظة: أهمية طاقة الرابط بالنسبة لنوية ؟

تعطي فكرة عن مدى استقرار النواة : كلما كانت E كبيرة كلما كانت النواة أكثر استقرارا

حسب منحنى يسمى منحنى أستون $(A \rightarrow f(A))$ و يستعمل لمقارنة استقرار مختلف النوى .



في المجال $20 < A < 195$: $\frac{E_l}{A} \approx 8 MeV / nucléon$

تضمن هذه المنطقة الأنوية الأكثر استقرارا

في المجال $20 < A < 195$: $\frac{E_l}{A}$ ضعيفة جدا أي أن هذه النوى غير

مستقرة و بذلك تسعى لكي تحول إلى نوى أكثر استقرارا ، وفق نوعين من التحولات:



- الاندماج النووي: $(A < 20)$ نوى خفيفة تتحدد فيما بينها لتعطي نواة أكثر ثقلًا .

- الانشطار النووي: $(A > 195)$ نواة ثقيلة تتشطر إلى نوتين خفيفتين .

ملحوظة: الاندماج و الانشطار النوويين تفاعلان محرّضان.

3-1: الانشطار النووي - Fission nucléaire

تفاعل نووي تنقسم خلاله نواة ثقيلة "سطورة Fissile" ، بعد قذفها بنوترون حراري إلى نواتين خفيقتين . أمثلة:



- تفاعل متسلسل:

"انشطارات متتالية لنويدات سطورة تُسبِّبُ النوترونات الناتجة عن الانشطار النووي ، مبدأ القنبلة النووية A"

انشطار نووي

تفاعل متسلسل

3-2: الاندماج النووي - Fusion




- تفاعل نووي يتم خلاله اندماج نواعتين خفيقتين لتكوين نواة أكثر ثقلًا ، محوراً الطاقة.

مثال: معادلة تفاعل الاندماج النووي الذي تمثله الوثيقة المقابلة :



: شروط تحقيق الاندماج النووي :

لتحقيق الاندماج النووي ينبغي للنواعتين المندمجتين ، أن تكون لهما طاقة تُمكِّنُهما من التغلب على قوى التأثيرات البينية التنازفية ؛ و لا تتوفر هذه الطاقة إلا بدرجة حرارة عالية ، ولها ، تسمى تفاعلات الاندماج بالتفاعلات النووية الحرارية .



الحصيلة: $4^1_1 H \rightarrow ^4_2 He + 2^0_1 e$

حيث في كل ثانية ، يتحول أكثر من 600 مليون طن من ذرات

الهيدروجين إلى ذرات الهيليوم و ذلك وفق ثلاثة مراحل :

4- الحصيلة ، الكتلة و الطاقة لتفاعل نووي

مخطط الطاقة لتفاعل نووي عام

نعتبر معادلة تفاعل نووي : $A_1 X_1 + A_2 X_2 \rightarrow A_3 X_3 + A_4 X_4$ ينتج عن هذا التفاعل تغير في الطاقة تعبر عنها بدلالة طاقة الرابط النووي

$$\Delta E = [E_l(X_1) + E_l(X_2)] - [E_l(X_3) + E_l(X_4)]$$

$$\Delta E = \sum E_l(\text{نواتج}) - \sum E_l(\text{متفاعلات})$$

بدلالة كتل النوى

$$\Delta E = [(m_3 + m_4) - (m_1 + m_2)].c^2$$

$$\Delta E = [\sum m(\text{نواتج}) - \sum m(\text{متفاعلات})].c^2$$

5: التأثير البيولوجي للنشاط الإشعاعي

للإشعاعات النووية تأثير على جسم الإنسان و ذلك حسب طبيعتها و الكمية التي يمتصلها الجسم.


- الإشعاعات α ، تخترق المادة بصعوبة، إذ تكفي ورقة لإيقافها ، و تحدث حروقاً سطحية على الجلد .

• الإشعاعات β ، أكثر نفاذية من α ، بعض المليمترات من الألومنيوم توقفها. تستعمل الإشعاعات β لعلاج الخلايا السرطانية.

• الإشعاعات γ ، نافذة بقدر كبير ، بعض السنتمترات من الرصاص توقفها. تستعمل في تشخيص الأمراض بالصور.

• تستعمل الإشعاعات النووية في الطب بكميات ضئيلة جداً كعنصر لاستشفاء و لتشخيص الأمراض أو لمعالجتها

- كيف تؤثر الإشعاعات النووية على الإنسان؟



تفاعل الإشعاعات النووية ذات الطاقة العالية مع المادة المكونة للجسم ؛ إذ يمكنها انتزاع إلكترونات ذرات خلايا بعض الأعضاء محدثة بعض التشوّهات بيوكيميائية .