

(انتشار موجة ضوئية)
Propagation d'une onde lumineuse

*ينتقل الضوء ، من نقطة إلى أخرى في وسط الانتشار (فراغ أو وسط مادي) ، وفق خطوط مستقيمة .

*نعتبر الضوء موجة مستعرضة كهرمغناطيسية لأنه يتعرض لظاهرة الحيود إذا كان $10 \lambda \leq a \leq 100 \lambda$.

*خلال حيود موجة ضوئية أحادية اللون ، بواسطة شق عرضه a ، يكون الفرق

الزاوي θ بين وسط البقعة المركزية وأول بقعة مظلمة هو : $\theta = \frac{\lambda}{a}$ و $\theta = \frac{L}{2D}$

*نسمي ضوءا أحادي اللون كل ضوء لا يتبدد بعد اجتيازه لموشور ، وهو عبارة


عن موجة متوالية جيئية مع : $c = \frac{\lambda_0}{T} = \lambda_0 \cdot \nu$ و $V = \frac{\lambda}{T} = \lambda \cdot \nu$

*معامل انكسار وسط ما هو $n = \frac{c}{V} = \frac{\lambda_0}{\lambda} = \frac{c}{\lambda \nu}$ إذن n يتعلق بتردد الموجة الضوئية التي تنتشر فيه .

*الموشور وسط شفاف ومتجانس ، محصور بين مستويين مائلين يحددان زاوية A تسمى زاوية الموشور .

*الموشور يتميز بالعلاقات التالية : $\sin i = n \sin r$ و $\sin i' = n \sin r'$ و $A = r + r'$ و $D = i + i' - A$

*عند إرسال حزمة من الضوء الأبيض على وجه موشور يلاحظ على الشاشة تكون بقع ملونة يسمى طيف الضوء الأبيض ، ونسمي هاته الظاهرة بتبدد الضوء ، ونسمي الموشور وسطا مبددا للضوء .



تمرين 4 :

نضيء شقا عرضه a بواسطة ضوء أحادي اللون الأحمر طول موجته في الفراغ $\lambda_1 = 633nm$ ، ثم بواسطة ضوء أصفر طول موجته λ_2 مجهول .

على شاشة ، توجد على بعد مسافة D من الشق ، نعاين بالتتابع أشكال الحيود المحصل عليها :

بالنسبة للضوء الأحمر: عرض البقعة المركزية $L_1=8cm$

بالنسبة للضوء الأصفر: عرض البقعة المركزية

$L_2=7,5cm$

1- اعط العلاقة بين طول الموجة λ و عرض الشق a والفرق الزاوي θ للبقعة المركزية .

2- لنقبل أن $\theta(rad) = \frac{L}{2D}$

1-2- بين أنه بالنسبة لجهاز معين ، تبقى النسبة $\frac{\lambda}{L}$ ثابتة .

2-2- احسب طول الموجة λ_2 .

تمرين 5 :

نضيء شقا عرضه a بواسطة ضوء أحادي اللون الأحمر طول موجته في الفراغ $\lambda = 633nm$. وعلى شاشة توجد على مسافة $D=3m$ من الشق نعاين شكل الحيود .

1- صف وارسم شكل الحيود المحصل عليه .

2- عرف بواسطة تبيانة الفرق الزاوي θ للهدب المركزي .

3- ما هي العلاقة بين الفرق الزاوي θ و عرض الشق a .

4- أوجد العلاقة بين θ والمسافة D و عرض البقعة

المركزية L علما أن $\tan \theta \approx \theta(rad)$

5- احسب عرض الشق a إذا كان عرض البقعة المركزية

للحيود هو $L = 12,0cm$

تمرين 1 :

سرعة انتشار الضوء في الفراغ $C = 3.10^8 m/s$. يتميز الضوء المرئي ، بطيف ترددات موجاته بين القيمتين

$\nu_1 = 3,75.10^{14} Hz$ و $\nu_2 = 7,5.10^{14} Hz$

1- حدد مجال تغيرات أطوال الموجات للضوء المرئي في الفراغ .

2- حدد مجال تغير أطوال الموجات للضوء المرئي في

الزجاج ، علما أن معامل انكسار الزجاج هو $n = 1,5$

تمرين 2 :

1- تبعث حبابة غاز الهيدروجين إشعاعا ضوئيا طول

موجته في الفراغ هو $\lambda = 410 nm$

1-1- احسب تردد هذا الإشعاع .

1-2- هل هذا الإشعاع مرئي؟ إذا كان الجواب نعم ما لونه؟

2- يمر هذا الإشعاع من الفراغ إلى داخل ليف بصري

معامل انكساره $n = 1,875$

1-2- احسب سرعة انتشار الإشعاع داخل الليف البصري .

2-2- احسب تردد الإشعاع في الليف البصري .

2-3- احسب طول موجة الإشعاع في هذا الوسط .

2-4- هل ينتمي هذا الإشعاع للمجال المرئي؟ إذا كان

الجواب نعم ، ما لونه؟ نعطي $C = 3.10^8 m/s$

تمرين 3 :

معامل انكسار الزجاج بالنسبة للإشعاع الأحمر هو

$n_R = 1,618$ وبالنسبة للإشعاع الأزرق هو

$n_B = 1,675$. نعطي $C = 3.10^8 m/s$

احسب سرعة انتشار كل من الإشعاعين في الزجاج .


انتشار موجة ضوئية
Propagation d'une onde
lumineuse

4-3- احسب طول موجات $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ لهذه الحزات في الموشور .

3-5- استنتج المقادير التي تميز الموجات الضوئية .

تمرين 8 :

ترد حزمة ضوئية مكونة من شعاعين أحمر طول موجته $\lambda_R = 0,6\mu m$ و بنفسجي طول موجته $\lambda_V = 0,6\mu m$ عموديا على موشور زاويته $A=30^\circ$.



تعبّر علاقة كوشي $n = a + \frac{b}{\lambda^2}$ عن تغير معامل

انكسار الوسط بدلالة λ طول الموجة الضوئية حيث a و

b ثابتتان . نعطي معامل انكسار الموشور بالنسبة

للشعاع الأحمر $n_R = 1,65$.

1- ما اسم الظاهرة التي تحدث ؟ ثم تعرف مع التعليل على الشعاعين (1) و (2) .

2- احسب قيمة D_R زاوية انحراف الشعاع الأحمر .

3- نضع أمام الشعاعين (1) و (2) عدسة مجمعة L

مسافتها البؤرية $f' = 100cm$ بحيث ينطبق

محورها البصري الرئيسي مع الشعاع (1) فتكون المسافة

d الفاصلة بين الحزمتين الحمراء و البنفسجية المحصل

عليها على شاشة متواجدة في المستوى البؤري الصورة

للعدسة هي $d=2,47cm$.

1-3 أثبت أن $d = f' \tan(D_V - D_R)$.

2-3 استنتج قيم D_V زاوية انحراف الشعاع البنفسجي و


معامل انكسار الموشور بالنسبة للشعاع البنفسجي .

4- احسب قيمتي الثابتين a و b .

تمرين 6 :

نضيء فتحة عرضها $a=120\mu m$ بواسطة ضوء لآزر طول موجته λ .

يمثل الشكل جانبه تبيانة لما نشاهده على شاشة



توجد على مسافة $D=1,8m$ من الفتحة .

1- ما الظاهرة التي مكنت من الحصول على هذا الشكل ؟

وما شروط الحصول على هذا الشكل ؟

2- ما طبيعة الفتحة (شق أفقي- شق عمودي- فتحة دائرية) ؟

3- عرف بواسطة تبيانة الفرق الزاوي θ .

4- اعط العلاقة بين الفرق الزاوي θ و λ و a .

5- أوجد العلاقة بين a والطول L للبقعة المركزية المشاهدة

على الشاشة والمسافة D ، في حالة θ صغيرة .

6- احسب طول الموجة λ ، في الفراغ ، لضوء اللآزر

المستعمل .

7- كيف هي البقعة المركزية عند استعمال الضوء الأبيض ؟

تمرين 7 :

نوجه حزمة من الضوء المنبعث من مصباح نحو موشور فنحصل على الشاشة على ثلاث حزات طول موجاتها في

الفراغ : $\lambda_1 = 434 nm$ و $\lambda_2 = 589 nm$ و $\lambda_3 = 768 nm$.

نعطي زاوية الموشور $A = 60^\circ$ و $C = 3.10^8 m/s$.

1- ماذا تشكل الصورة المحصل عليها على الشاشة ، وما

اسم الظاهرة التي تحدث للضوء .

2- ندير الموشور فتتغير زاوية الانحراف فنلاحظ أنها تأخذ

قيمتها الدنياوية D_m في الحالة التي تكون فيها زاوية الورود i

تساوي زاوية الانبثاق i' ($i = i'$) .

بين في هذه الحالة أن $\sin\left(\frac{D_m+A}{2}\right) = n(\lambda) \cdot \sin\left(\frac{A}{2}\right)$

حيث $n(\lambda)$ معامل انكسار الموشور .

3- بالنسبة للحزات الثلاث ، أعطت القياسات النتائج التالية :

D_m (°)	93	82	78
λ (nm)	434	589	768
$n(\lambda)$			

1-3- أتمم الجدول أعلاه .

2-3- احسب قيم السرعات V_1, V_2, V_3 للحزات الثلاث

في الموشور .

3-3- احسب الترددات ν_1, ν_2, ν_3 ثم الأدوار T_1 ،

T_2 و T_3 للحزات .