


9

I. الإسْتِرَاتِيجِيَّاتُ

• تعريف الإستر




الإستر مركب عضوي أكسجيني تشمل جزيئته على المجموعة:

تعريف



RCOOR' أو  وصيغته العامة:





R ذرة هيدروجين أو سلسلة كربونية و R' سلسلة كربونية.

• تسمية الإستر

يتكون اسم إستر من طرفين:

الأول مشتق من اسم الحمض الكربوكسيلي الموافق مع حذف
البادئة حمض و تعويض اللاحقة "ويك" باللاحقة "وات"،
و الثاني يوافق اسم الجذر الألكيلي المرتبط بذرة الأكسجين.

▪ مثال:



اسم هذا الإستر هو اذن: بروبانوات 2- مثيل بروبيل

 في حالة تفرع، ترقم السلسلة الكربونية R انطلاقاً من ذرة الكربون الوظيفي و ترقم السلسلة الكربونية' R انطلاقاً من ذرة الكربون المرتبطة بذرة الأكسجين.

• خصائص الإستر

عند درجة حرارة و تحت ضغط اعتياديين توجد الإسترات على الحالة السائلة و هي متطايرة و تتميز برائحة طيبة بنكهة الفواكه و ذوبانيتها في الماء قليلة على عكس الأحماض و الكحولات التي تشق منها. توجد الإسترات الطبيعية في الزيوت الأساسية ذات أصل نباتي و هي تستعمل في صناعة العطور و النكهات الغذائية و تستعمل في الصيدلة كمذيبات.

9 تفاعلات الأسترة و الحلماء

II. الأسترة و حلماء الإستر

• الأسترة

الأسترة هي تفاعل بين كحول و حمض كربوكسيلي ينتج إسترا و الماء.
المعادلة الكيميائية لتفاعل الأسترة هي:




تعريف

• الحلماء

حلماء إستر هي التفاعل المعاكس لتفاعل الأسترة.

المعادلة الكيميائية لتفاعل الحلماء هي:




تعريف

• التوازن الكيميائي أسترة - حلماء

تبين التجربة أن تفاعلي الأسترة و الحلماء يشكلان توازنًا كيميائيًا في الحالة النهائية:



• التتبع الزمني للتفاعل:



يحتوي كل أنبوب على خليط متساوي المولات من حمض الإيثانوليك و الإيتانول وبضع قطرات من حمض الكبرتيك.
تعابر الأنابيب عند لحظات معينة(يعاير الأنبوب 0 عند $t=0$) بعيد تبريدها قصد تحديد كمية الحمض المتبقية.

يمكن التتبع الزمني لتفاعل الأسترة من خط التمثيل المباني الذي يمثل تطور كمية المادة للإستر الناتج(المبيان 1). و بنفس الطريقة يمكن التتبع الزمني لتفاعل حلماء الإستر من خط التمثيل المباني الذي يمثل تطور كمية المادة للإستر المتبقى(المبيان 2).

9 تفاعلات الأسترة و الحلماء



$$\tau = \frac{x_{\text{eq}}}{x_{\text{max}}} = \frac{n_{\text{eq}}(\text{ester})}{n_{\text{max}}(\text{ester})}$$

نسبة التقدم النهائي لتفاعل الأسترة هي:

$$\tau = \frac{0,67}{1} = 67\%$$

$$\tau' = \frac{x'_{\text{eq}}}{x'_{\text{max}}} = \frac{n_{\text{eq}}(\text{acide})}{n_{\text{max}}(\text{acide})}$$

و نسبة التقدم النهائي لتفاعل الحلماء هي:

$$\tau' = \frac{0,33}{1} = 33\%$$

تفاعلاً للأسترة و الحلماء تحولان بطيئاً و غير كليين.

خاصية

• حالة التوازن:

الأسترة و الحلماء تفاعلان متزامنان أحدهما يحد الآخر يؤديان إلى توازن كيميائي ديناميكي



معادله العامة:

تصل المجموعة الكيميائية حالة التوازن عند تساوي سرعتي تفاعلي الأسترة و الحلماء ،
عندئذ تتوارد الأنواع الأربع في الخليط المتفاعل بنسب تبقى ثابتة.


ثابتة التوازن لتفاعل الأسترة هي:

$$K = \frac{[\text{RCOO}']_{\text{eq}} \cdot [\text{H}_2\text{O}]_{\text{eq}}}{[\text{RCOOH}]_{\text{eq}} \cdot [\text{R}'\text{OH}]_{\text{eq}}}$$

$$K' = \frac{1}{K}$$

و في حالة الحلماء:

في حالة الأسترة و الحلماء المدروسين معادلة التوازن هي:



• مثال:

9 تفاعلات الأسترة و الحلماء

$$K = \frac{[CH_3CO_2C_2H_5]_{eq} \cdot [H_2O]_{eq}}{[CH_3CO_2H]_{eq} \cdot [C_2H_5OH]_{eq}}$$

و ثابتة التوازن الموافقة هي:

$$K = \frac{\frac{n_{ester} \cdot n_{eau}}{V}}{\frac{n_{acide} \cdot n_{alcool}}{V}} = \frac{n_{ester} \cdot n_{eau}}{n_{acide} \cdot n_{alcool}}$$

$$K = \frac{0,67 \times 0,67}{0,33 \times 0,33} = 4,0$$

III. التحكم في التفاعل أسترة - حلماء

• التحكم في سرعة التفاعل

▪ تأثير درجة الحرارة (مبيان 3)

لا تؤثر درجة الحرارة على التركيبة النهائية أي على نسبة التقدم النهائي بل تؤثر فقط على سرعة التفاعل: يمكن الرفع من درجة الحرارة من وصول حالة التوازن بسرعة أكبر.

▪ تأثير الحفاز (مبيان 3)

الحفاز نوع كيميائي (في هذه الحالة الأيونات H_3O^+) يسرع التفاعل الكيميائي دون أن يظهر في المعادلة الحصيلة. ليس له تأثير على ثابتة التوازن ولا على نسبة التقدم النهائي. الأيونات H_3O^+ تسرع الأسترة و الحلماء على حد سواء.

• التحكم في التركيب النهائي

يمكن تغيير التركيب النهائي أي نسبة التقدم النهائي :



✓ باستعمال أحد المتفاعلات بوفرة (مبيان 3)،

✓ بإزالة أحد النواتج أثناء تكونه:


لإزالة الإستر تستعمل عملية التقطر(ش. 1)

لإزالة الماء يستعمل تركيب "دين ستارك"(ش. 2)

وفرة متفاعل أو إزالة ناتج تزيح التوازن في منحى التطور التلقائي.



9 تفاعلات الأسترة و الحلمأة



• مردود تفاعل

$$(0 < r < 1)$$

$$r = \frac{n_{\text{exp}}}{n_{\text{th}}}$$

يعرف مردود تفاعل بالكسر التالي:

تعريف

كمية مادة ناتج التفاعل المحصل عليها تجريبياً n_{exp}

كمية مادة ناتج التفاعل النظرية (تحدد باعتبار التفاعل كلياً) n_{th}

$$r = \frac{m_{\text{exp}}}{m_{\text{th}}}$$

- يمكن التعبير عن مردود تفاعل باستعمال الكتلة:

- يمكن التعبير عن مردود تفاعل بنسبة مئوية.

