



الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا
الدورة العادية 2011
عناصر الإجابة

الصفحة
1
3



3	المعامل	NR36	علوم الحياة والأرض	المادة
2	مادة الإعجاز		شعبة العلوم الرياضية (أ)	الشعب (ة) أو المسلك

التمرين الأول (4 نقط)

النقطة	عناصر الإجابة	السؤال
0.5 ن 0.5 ن	<p>التعريف</p> <p>- الشذوذ الصبغي: تغير يصيب بنية الصبغيات (ضيق أو انتقال صبغيات أو قطع منها) أو عدد الصبغيات (زيادة أو نقصان أحد الصبغيات).....</p> <p>- الوراثة المرتبطة بالجنس هي مجموع الصفات الوراثية المنقولة بواسطة الصبغيات الجنسية.....</p>	
1 ن 0.5 ن	<p>انتقال الأمراض الوراثية المرتبطة بالصبغي الجنسي X في حالة التنحي</p> <p>تكون الأم مختلفة الاقتران ناقلة للمرض، ويظهر المرض عند الذكور دون الإناث (أو يكون أكثر انتشارا عند الذكور)، لكونهم يتلقون الصبغي X الحامل للخليل المسؤول عن المرض من الأم، ويكون احتمال ظهور المرض لذيهم هو 1/2.....</p> <p>يساهم الذكور في نقل المرض إلى الخلف في حالة أب مصاب وأم مصابة متشابهة الاقتران أو أم سليمة مختلفة الاقتران.....</p>	
0.75 ن 0.75 ن	<p>ظهور مرض وراثي مرتبط بشذوذ في الصبغيات الجنسية: حالة مرض Turner</p> <p>في هذه الحالة يكون الأبوان سليمين، وإثر الافتراق غير السليم لأزواج الصبغيات الجنسية أثناء الانقسام الاختزالي عند تشكل الأمشاج لدى أحد الأبوين نحصل على مشيج بدون صبغي جنسي، وعند الإخصاب مع مشيج عادي يحمل الصبغي الجنسي X تحدث حالة أحادي الصبغي X المؤدية لمرض Turner.....</p> <p>رسم تفسيري صحيح مصحوب بالتعليق.....</p>	

التمرين الثاني (6 نقط)

النقطة	عناصر الإجابة	السؤال												
1 ن	<p>- تفسير نتائج التزاوج الأول:</p> <p>أعطى تزاوج ذبابتين بمظهر خارجي سائد $[cu^+]$ جيلا غير متجانس مما يدل على أن الأبوين مختلفا الاقتران: $cu^+//cu$.</p> <p>نسب المظاهر الخارجية المحصل عليها هي $[cu^+]$ بنسبة 3/4 و $[cu]$ بنسبة 1/4 .</p> <p>شبكة التزاوج:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td>♂</td> <td>$cu^+ / (1/4)$</td> <td>$cu / (1/4)$</td> </tr> <tr> <td>♀</td> <td></td> <td>$cu^+ / (1/4)$</td> <td>$cu^+ // cu [cu^+] (1/4)$</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>$cu / (1/4)$</td> <td>$cu // cu [cu] (1/4)$</td> </tr> </table> <p>- تفسير نتائج التزاوج الثاني:</p> <p>أعطى تزاوج ذبابتين بمظهر خارجي سائد $[sb^+]$ جيلا غير متجانس مما يدل على أن الأبوين مختلفا الاقتران: $sb^+//sb$.</p> <p>المظاهر المحصل عليها هي $[sb^+]$ بنسبة 2/3 و $[sb]$ بنسبة 1/3 إذن الخليل sb^+ مبيت في حالة تشابه الإقتران.</p>		♂	$cu^+ / (1/4)$	$cu / (1/4)$	♀		$cu^+ / (1/4)$	$cu^+ // cu [cu^+] (1/4)$			$cu / (1/4)$	$cu // cu [cu] (1/4)$	1
	♂	$cu^+ / (1/4)$	$cu / (1/4)$											
♀		$cu^+ / (1/4)$	$cu^+ // cu [cu^+] (1/4)$											
		$cu / (1/4)$	$cu // cu [cu] (1/4)$											

الصفحة	NR36	الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - الدورة العادية 2011 - عناصر الإجابة - مادة: علوم الحياة والأرض - شعبة العلوم الرياضية (أ)																													
3																															
3																															
النقطة		السؤال																													
0.25 ن		<p>اعتماد جدول تطبيقي لحساب الثوابت الإحصائية ل P₂:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>(xi-X)²</th> <th>xi*f(P₂)</th> <th>f(P₂)</th> <th>xi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>200</td> <td>40</td> <td>2</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>525</td> <td>525</td> <td>21</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>1620</td> <td>54</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>525</td> <td>735</td> <td>21</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>200</td> <td>80</td> <td>2</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>1450</td> <td>3000</td> <td>المجموع</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>حساب صحيح للثوابت الإحصائية</p> <p>- المنوال: 30 رطل - الوسط الحسابي بالرطل:</p> $\bar{x} = \frac{\sum fi \cdot xi}{\sum fi} = \frac{3000}{100} = 30$ <p>- الانحراف المعياري δ : 3,80 (لا تسلم النقطة في حالة إعطاء قيم الثوابت دون اعتماد الجدول التطبيقي)</p>		(xi-X) ²	xi*f(P ₂)	f(P ₂)	xi	200	40	2	20	525	525	21	25	0	1620	54	30	525	735	21	35	200	80	2	40	1450	3000	المجموع	
(xi-X) ²	xi*f(P ₂)	f(P ₂)	xi																												
200	40	2	20																												
525	525	21	25																												
0	1620	54	30																												
525	735	21	35																												
200	80	2	40																												
1450	3000	المجموع																													
0.5 ن																															
0.75 ن																															
1.5 ن		<p>3</p> <p>- مقارنة على مستوى التمثيل البياني: المجموعة P₁ أكثر تشتتًا من المجموعة P₂ - مقارنة على مستوى الثوابت: يلاحظ أن للمجموعتين نفس المنوال ونفس الوسط الحسابي. تختلف المجموعتان P₁ و P₂ بثباتة التبدد (الانحراف المعياري) حيث أنها أصغر عند المجموعة P₂ إذن المجموعة P₂ أكثر تجانسًا من المجموعة P₁</p>																													
0.5 ن		<p>4</p> <p>يلاحظ أن للمجموعتين نفس المعدل الحسابي الذي هو حصيد قسمة قيم زيادة الوزن على مجموع الأفراد أي متوسط زيادة الوزن عند كل فرد، وعليه فللمجموعتين نفس المرودية.</p>																													
التمرين الرابع (5 نقط)																															
النقطة		السؤال																													
1.25 ن		<p>1</p> <p>تردد الأنماط الوراثية وتردد الحليلات:</p> $f(aa)=q^2=256/1600=0.16$ $f(a)=q=\sqrt{0.16}=0.4$ $f(A)=p=1-q=1-0.4=0.6$ $f(AA)=p^2=(0.6)^2=0.36$ $f(Aa)=2pq=2 \cdot (0.4) \cdot (0.6)=0.48$																													
0.75 ن		<p>2</p> <p>المجموعة 1 متشابهة الاقتران، تقابل الأفراد AA ، وتقابل المجموعة 3 المتشابهة الاقتران الأفراد aa . بينما تقابل المجموعة 2، التي تتضمن حليلين مختلفين، الأفراد المختلفي الاقتران Aa.....</p> <p>الترددات الحليلية انطلاقًا من نتائج الهجرة الكهربائية:</p> $f(A) = p = (AA + \frac{1}{2}Aa)/N = (38 + 47/2)/100 = 61.5/100 = 0.615 \quad p = 0.615$ $f(a) = q = (aa + \frac{1}{2}Aa)/N = (15 + 47/2)/100 = 38.5/100 = 0.385 \quad q = 0.385$																													
1.5 ن		<p>3</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>الأعداد المنتظرة</th> <th>النسب المنتظرة</th> <th>الأعداد الملاحظة</th> <th>الأنماط الوراثية</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>n₁=p²N=37.8</td> <td>p²=(0.615)²=0.378</td> <td>38</td> <td>AA</td> </tr> <tr> <td>n₂=2pqN=47.4</td> <td>2pq=2x0.615x0.385=0.474</td> <td>47</td> <td>Aa</td> </tr> <tr> <td>n₃=q²N=14.8</td> <td>q²=(0.385)²=0.148</td> <td>15</td> <td>aa</td> </tr> </tbody> </table>		الأعداد المنتظرة	النسب المنتظرة	الأعداد الملاحظة	الأنماط الوراثية	n ₁ =p ² N=37.8	p ² =(0.615) ² =0.378	38	AA	n ₂ =2pqN=47.4	2pq=2x0.615x0.385=0.474	47	Aa	n ₃ =q ² N=14.8	q ² =(0.385) ² =0.148	15	aa												
الأعداد المنتظرة	النسب المنتظرة	الأعداد الملاحظة	الأنماط الوراثية																												
n ₁ =p ² N=37.8	p ² =(0.615) ² =0.378	38	AA																												
n ₂ =2pqN=47.4	2pq=2x0.615x0.385=0.474	47	Aa																												
n ₃ =q ² N=14.8	q ² =(0.385) ² =0.148	15	aa																												
0.5 ن		<p>ب</p> <p>- إن النتائج النظرية مطابقة للنتائج الملاحظة، فالساكنة متوازنة.....</p>																													