


الصفحة	1	5	♦♦♦	♣	الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا الدورة الاستدراكية 2019 - عناصر الإجابة -	I. XBAE I MEVOEΘ I. C. L. O. F I. SOXCE. d. e. C. O. A. SOE I H X. X. X. R. E. J. A. I. S. O. R. E. A. d. e. R. R. A. I. S. O. X. X. I. C. e. C. O. d.	 المملكة المغربية وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي
المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه						RR36	


2	مدة الانجاز	علوم الحياة والأرض	المادة
3	المعامل	شعبة العلوم الرياضية : مسلك العلوم الرياضية (أ)	الشعبة أو المسلك

المكوّن الأول: استرداد المعارف (5 نقط)

رقم السؤال	عناصر الإجابة	سلم التنقيط
I	قبول كل تعريف صحيح من قبيل: 1- الانتقاء الاصطناعي:.....(0.5 ن) - إجراء يقتضي تزاوجا مقصودا لكائنات تتوفر على خصائص نرغب في الحفاظ عليها. - إجراء يهدف إلى انتقاء سلالات نقية ضمن جماعة غير متجانسة. - السلالة النقية:.....(0.5 ن) - مجموعة أفراد لهم نفس النمط الوراثي المتشابه الاقتران بالنسبة لصفة وراثية (أو أكثر)، كمية أو نوعية. - جماعة يكون فيها الانتقاء غير فعال.	1 ن
II	2- ذكر أهميتين للانتقاء الاصطناعي من قبيل: - انتقاء سلالات نقية حيوانية أو نباتية. - تحسين الإنتاجية الكمية والكيفية عند الحيوانات والنباتات. - ابتكار سلالات متنوعة ومفيدة في مجالات مختلفة انطلاقا من أنواع متوحشة.... (2x0.5 ن)	2 ن
III	أ- خطأ، ب- صحيح، ج - خطأ، د- خطأ.....(4x0.25 ن)	1 ن

المكوّن الثاني: الاستدلال العلمي والتواصل الكتابي والبياني (15 نقطة)


التمرين الأول: (7 نقط)

رقم السؤال	عناصر الإجابة	سلم التنقيط
1- أ	- الصيغة الصبغية للنبات البوغي الخيطي: نبات ثنائي الصيغة الصبغية (2n)،.....(0.25 ن) - الصيغة الصبغية لنباتات طور <i>Halicystis</i> (ذكرية أو أنثوية): أحادية (n).....(0.25 ن)	0.5 ن
1- ب	دورة نمو طحلب <i>Derbestia</i> : (0.5 ن) المرحلة هي: كيس بوغي (C أو H).....(0.25 ن)	0.75 ن



الدورة الصبغية لطحلب *Derbesia*:

نبات مشيجي



0.75 ن

2

..... (0.5 ن)
نمطها: دورة أحادية - ثنائية الصيغة الصبغية..... (0.25 ن)

0.75 ن

3

- الجيل F_1 متجانس، تحقق القانون الأول لماندل. (0.25 ن)
- بالنسبة لشكل التويج، أفراد الجيل الأول F_1 يتميزون بمظهر خارجي يشبه المظهر الخارجي لأحد الأبوين، التحليل المسؤول عن الشكل العادي سائد نرمل له بـ N والتحليل المسؤول عن الشكل غير العادي متنح نرمل له بـ n (0.25 ن)
- بالنسبة للون التويج، أفراد الجيل الأول F_1 تتميز بمظهر خارجي وسيط بين المظهرين الخارجيين للأبوين، التحليلان المسؤولان عن لون التويج متساويا السيادة. نرمل للتحليل المسؤول عن اللون الأبيض بـ B ونرمل للتحليل المسؤول عن اللون الأحمر بـ R (0.25 ن)

- التفسير الصبغي للتزاوج الأول:

P_1 × P_2
[N, R] [n, B]

الأبوان
المظاهر الخارجية:

$\frac{N}{N} \frac{R}{R}$ $\frac{n}{n} \frac{B}{B}$
 $\frac{N}{N} \frac{R}{R}$ $\frac{n}{n} \frac{B}{B}$
 $\frac{N}{N} \frac{R}{R}$ $\frac{n}{n} \frac{B}{B}$
100% 100%

الأنماط الوراثية: (0.25 ن)

الأمشاج: (0.25 ن)

الإخصاب

$\frac{N}{N} \frac{R}{R}$
 $\frac{n}{n} \frac{B}{B}$
[N, RB] 100%

أفراد الجيل الأول F_1 : (0.25 ن)



- التفسير الصبغي للتزاوج الثاني:

الأبوان F_1 $[N, RB]$ × F_1 $[N, RB]$ المظاهر الخارجية
الأنماط الوراثية: (0.25 ن) $\frac{N}{n} \frac{R}{B}$
الأمشاج: (0.5 ن) $\frac{NR}{25\%}$; $\frac{NB}{25\%}$; $\frac{nR}{25\%}$; $\frac{nB}{25\%}$

شبكة التزاوج:
(1 ن)

$\frac{Y}{Y} F_1$	$\frac{1}{4} \frac{N}{N} \frac{R}{R}$	$\frac{1}{4} \frac{N}{N} \frac{B}{B}$	$\frac{1}{4} \frac{n}{n} \frac{R}{R}$	$\frac{1}{4} \frac{n}{n} \frac{B}{B}$
$\frac{N}{N} \frac{R}{R}$	$\frac{1}{16} \frac{N}{N} \frac{R}{R}$ [N,R]	$\frac{1}{16} \frac{N}{N} \frac{R}{B}$ [N,RB]	$\frac{1}{16} \frac{N}{N} \frac{R}{R}$ [N,R]	$\frac{1}{16} \frac{N}{N} \frac{R}{B}$ [N,RB]
$\frac{N}{N} \frac{B}{B}$	$\frac{1}{16} \frac{N}{N} \frac{R}{B}$ [N,RB]	$\frac{1}{16} \frac{N}{N} \frac{B}{B}$ [N,B]	$\frac{1}{16} \frac{n}{n} \frac{R}{R}$ [n,RB]	$\frac{1}{16} \frac{n}{n} \frac{B}{B}$ [n,B]
$\frac{n}{n} \frac{R}{R}$	$\frac{1}{16} \frac{N}{n} \frac{R}{R}$ [n,R]	$\frac{1}{16} \frac{N}{n} \frac{R}{B}$ [n,RB]	$\frac{1}{16} \frac{n}{n} \frac{R}{R}$ [n,R]	$\frac{1}{16} \frac{n}{n} \frac{R}{B}$ [n,RB]
$\frac{n}{n} \frac{B}{B}$	$\frac{1}{16} \frac{N}{n} \frac{R}{B}$ [n,RB]	$\frac{1}{16} \frac{N}{n} \frac{B}{B}$ [n,B]	$\frac{1}{16} \frac{n}{n} \frac{R}{B}$ [n,RB]	$\frac{1}{16} \frac{n}{n} \frac{B}{B}$ [n,B]

3.5 ن

4

النتائج النظرية لأفراد الجيل الثاني F_2 :

[N, RB] 6/16 ; [N, B] 3/16 ; [N, R] 3/16 ; [n, RB] 2/16 ; [n, B] 1/16 ; [n, R] 1/16
(0.25 ن) النتائج التجريبية لأفراد الجيل الثاني F_2 : (0.5 ن).....

$$[N, RB] = 370/997 = 0.37 \approx 6/16$$

$$[N, B] = 187/997 = 0.19 \approx 3/16$$

$$[N, R] = 189/997 = 0.19 \approx 3/16$$

$$[n, RB] = 126/997 = 0.13 \approx 2/16$$

$$[n, B] = 62/997 = 0.06 \approx 1/16$$

$$[n, R] = 63/997 = 0.06 \approx 1/16$$

النتائج النظرية توافق النتائج التجريبية، اقترح المتعلمين والمتعلمات صحيح..... (0.25 ن)

التزاوج الثالث:

- الزهرة ذات تويج شكله غير عاد ولونه أحمر متشابهة الاقتران بالنسبة لكل مورثة، فهي تنتج نوعا واحدا من الأمشاج ($\frac{nR}{100\%}$) بنسبة 100%..... (0.25 ن)
- الزهرة مختلفة الاقتران بالنسبة للمورثة المسؤولة عن شكل التويج، تنتج نوعين من الأمشاج: ($\frac{NB}{50\%}$) بنسبة 50% و ($\frac{nB}{50\%}$) بنسبة 50%..... (0.25 ن)

0.75 ن

شبكة التزاوج:

F_2	$\frac{NB}{1/2}$	$\frac{nB}{1/2}$
$\frac{nR}{1/1}$	$\frac{N}{n} \frac{B}{R}$ [N, RB] 1/2	$\frac{n}{n} \frac{B}{R}$ [n, RB] 1/2

الخلف: [N, RB] 50% ; [n, RB] 50%..... (0.25 ن)

5

التمرين الثاني: (3 نقط)

رقم السؤال	عناصر الإجابة	سلم التقييم									
1	- الأبوان I_1 و I_2 سليمان أنجبا طفلا مصابا (II_3)، التحليل المسؤول عن المرض متنح.	0.5 ن									
2	- I_2 : امرأة سليمة أنجبت طفلا مصابا (0.25 ن) - II_1 : $X_N X_N$ أو $X_N X_m$ (ناقلة للمرض) أمها مختلفة الاقتران $X_N X_m$ وأبوها سليم (0.5 ن) - $X_N Y$ شبكة التزاوج: (0.5 ن)	0.75 ن									
3	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">X_m 1/2</td> <td style="text-align: center;">X_N 1/2</td> <td style="text-align: center;">I_2 الأم I_1 الأب</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">$X_N X_m$ [N] 1/4</td> <td style="text-align: center;">$X_N X_N$ [N] 1/4</td> <td style="text-align: center;">X_N 1/2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">$X_m Y$ [m] 1/4</td> <td style="text-align: center;">$X_N Y$ [N] 1/4</td> <td style="text-align: center;">Y 1/2</td> </tr> </table> <p>احتمال أن يكون أحد أطفال الأبوين I_1 و I_2 مصابا بالمرض هو $1/4$ (0.25 ن)</p>	X_m 1/2	X_N 1/2	I_2 الأم I_1 الأب	$X_N X_m$ [N] 1/4	$X_N X_N$ [N] 1/4	X_N 1/2	$X_m Y$ [m] 1/4	$X_N Y$ [N] 1/4	Y 1/2	0.75 ن
X_m 1/2	X_N 1/2	I_2 الأم I_1 الأب									
$X_N X_m$ [N] 1/4	$X_N X_N$ [N] 1/4	X_N 1/2									
$X_m Y$ [m] 1/4	$X_N Y$ [N] 1/4	Y 1/2									
4	- تواجد قطعتين ذاتي قد يساوي على التوالي $1,8$ kb و $1,3$ kb عند المولود المرتقب II_4 يدل على وجود حليلي المورثة..... (0.5 ن) - المورثة مرتبطة بالصبغي الجنسي X، إذن المولود المرتقب بنت حاملة للمرض نمطها الوراثي $X_N X_m$ لكن مظهرها الخارجي سليم (0.5 ن)	1 ن									

التمرين الثالث (5 نقط)

رقم السؤال	عناصر الإجابة	سلم التقييم
1	أ- في منطقة العُلاق عدد الحلزونات ذات قواقع بأشرطة داكنة يفوق بحوالي 3 مرات عدد الحلزونات ذات قواقع بأشرطة فاتحة..... (0.25 ن) - في منطقة الشاطئ عدد الحلزونات ذات قواقع بأشرطة فاتحة يفوق 9 مرات عدد الحلزونات ذات قواقع بأشرطة داكنة..... (0.25 ن)	0.5 ن
0.5 ن	ب- أدت تهية الكثيب إلى شاطئ إلى ارتفاع عدد الحلزونات ذات قواقع بأشرطة فاتحة وانخفاض عدد الحلزونات ذات قواقع بأشرطة داكنة.	0.5 ن
1 ن	- في منطقة العُلاق، تُستهلك الحلزونات بقواقع ذات أشرطة فاتحة بعدد أكبر لأنها سهلة الرصد من طرف طائر السمنا الشاطئي (الحلزونات بقواقع ذات أشرطة داكنة لها أفضلية العيش)..... (0.5 ن) - في منطقة الشاطئ (حيث يوجد الشنذاب الرملي والكرنب البحري والرجلة) تُستهلك الحلزونات بقواقع ذات أشرطة داكنة التي يسهل رصدها من طرف طائر السمنا (الحلزونات بقواقع ذات أشرطة فاتحة لها أفضلية العيش)..... (0.5 ن)	1 ن
3	- الشكل أ: في منطقة العُلاق، ينخفض تردد الحليل B تدريجيا إلى أن يصبح نادرا في الجيل العاشر (تقريبا 0.1)، بينما في منطقة الشاطئ يرتفع تردد الحليل B تدريجيا إلى أن يصبح مسيطرا في الجيل العاشر (تقريبا 0.94)..... (0.5 ن) - الشكل ب: في منطقة العُلاق، يرتفع تردد الحليل N تدريجيا إلى أن يصبح مسيطرا في الجيل العاشر (تقريبا 0.92)، بينما في منطقة الشاطئ ينخفض تردد الحليل N تدريجيا إلى أن يصبح نادرا في الجيل العاشر (تقريبا 0.1)..... (0.5 ن)	1 ن



2 ن	<p>في منطقة العلاق:</p> <p>- الحليل B نادر والحليل N مسيطر في ساكنة الحلزونيات..... (0.25 ن)</p> <p>- السبب : طيور السمنة تستهلك الأفراد بقواقع ذات أشرطة فاتحة التي يسهل رصدها.. (0.25 ن)</p> <p>- عامل التغير: انتقاء لصالح الأفراد ذوي قواقع بأشرطة داكنة لأنها تستطيع التخفي ومن ثم العيش و التوالد ما بينها..... (0.25 ن)</p> <p>- النتيجة: انتشار تفاضلي للحليل N مع تعاقب الأجيال، ما يؤدي إلى ارتفاع تردد المظهر الخارجي [N]..... (0.25 ن)</p> <p>في منطقة الشاطي:</p> <p>- الحليل B مسيطر والحليل N نادر في ساكنة الحلزونيات..... (0.25 ن)</p> <p>- السبب : طيور السمنة تستهلك الأفراد بقواقع ذات أشرطة داكنة التي يسهل رصدها. (0.25 ن)</p> <p>- عامل التغير: انتقاء لصالح الأفراد ذوي قواقع بأشرطة فاتحة لأنها تستطيع التخفي ومن ثم العيش و التوالد ما بينها..... (0.25 ن)</p> <p>- النتيجة: انتشار تفاضلي للحليل B مع تعاقب الأجيال، ما يؤدي إلى ارتفاع تردد المظهر الخارجي [B]..... (0.25 ن)</p>	4
-----	--	---