

مدة الإنجاز: 2 h

### المكون الأول: استرجاع المعارف ( 4 ن )

#### التمرين الأول:

نظرا لصعوبة التغيرات الوراثية عبر الأجيال، يتم تتبع الخاصيات الوراثية بالنسبة لساكنة متوازنة وذلك بتطبيق قانون H-W .

بواسطة نص منظم :

- عرف مفهوم الساكنة ومفهوم المحتوى الجيني للساكنة .


- باعتبار زوج من الحليلات A و a لمورثة مرتبطة بالصبغي الجنسي X في حالة السيادة، بين كيف يتم تطبيق هذا القانون عند الذكور و الإناث في تتبع البنية الوراثية لساكنة متوازنة .

### المكون الثاني: توظيف المعارف واستثمار المعطيات : ( 16 ن )


#### التمرين الثاني : ( 5 ن )

لتوضيح أهمية الإنقسام الإختزالي والإخصاب في الدورة الجنسية عند الكائن الحي، تم تتبع مختلف مراحل دورة النمو عند طحلب Zygnéma ( الشكل 1 الوثيقة 1 ) وهو طحلب يعيش في المياه العذبة.

خلال فترة التوالد تظهر بين خلايا الخييطين المتجاورين a و b روابط ( الشكل 2 الوثيقة 1 ) تشكل فيما بعد قناطر التزاوج ( أنابيب اقتران )، يمر عبرها محتوى خلايا الخييط a إلى خلايا الخييط الآخر b ( الشكل 3 الوثيقة 1 ) فينتج عن ذلك خلايا c تحاط بغشاء سميك ( الشكل 4 ) . داخل كل خلية c تلتحم النواتان، فنحصل على الخلية d ( الشكل 5 ) . عندما تصبح الظروف ملائمة تخضع الخلية d لانقسامين متتاليين ويمثل شكل الوثيقة 2 إحدى مراحل هذين الإنقسامين . ينتج عن هذا الإنقسام أربع نوى ثلاثة منها تتلاشى، فنحصل على الخلية e ( الشكل 6 الوثيقة 1 ) التي تنبت لتعطي طحلب Zygnéma جديد.



الوثيقة 1



الوثيقة 2

باستغلالك للمعطيات السابقة :

- 1 - أنجز الدورة الصبغية للطحلب المدروس. (2,5)
- 2- حدد نمطها معلا جوابك. (1ن)
- 3- باعتبار  $2n = 4$ , مثل بواسطة رسم تخطيطي بمفتاحه المرحلة الممثلة بالشكل 2. (1,5 ن)

### التمرين الثالث: (5 ن)

قصد دراسة كيفية انتقال بعض الصفات الوراثية عند ذبابة الخل, نقترح التزاوجات الآتية:

التزاوج الأول: تم بين سلالتين نقيتين: إناث ذات أهداب قصيرة  $[c^+]$  وزباني عادية  $[n^+]$  وذكور ذات أهداب مشبوكة  $[c]$  وزباني ضامرة  $[n]$ . أعطى هذا التزاوج جيلا  $F_1$  يتكون من ذباب بأهداب قصيرة وزباني عادية.

**التزاوج الثاني :** تم بين سلالتين نقيتين : إناث ذات أهداب مشبوكة وزباني ضامرة وذكور ذات أهداب قصيرة وزباني عادية. فتم الحصول على جيل  $F_1$  يتكون من :

- 50 % إناث بأهداب قصيرة وزباني عادية.

- 50 % ذكور بأهداب مشبوكة وزباني ضامرة.

1- ماذا تستنتج من تحليل نتائج التزاوجين الأول والثاني. ( 2,25 ن )

**التزاوج الثالث :**

تم بين أفراد الجيل  $F_1$  للتزاوج الأول، فتم الحصول على جيل  $F_2$  يتكون من :

- 410 ذبابة أنثى ذات أهداب قصيرة وزباني عادية.

- 200 ذبابة ذكر ذات أهداب مشبوكة وزباني ضامرة.

- 187 ذبابة ذكر ذات أهداب قصيرة وزباني عادية .

- 12 ذبابة ذكر ذات أهداب قصيرة وزباني ضامرة .

- 10 ذبابة ذكر ذات أهداب مشبوكة وزباني عادية .


2- فسر نتائج التزاوج الثالث مستعينا بشبكة التزاوج. ( 2,75 ن )

**التمرين الرابع : ( 6 ن )**

قصد الحصول على أزهار بسويقات طويلة ( شمراخ طويل ) وسهلة التسويق ، قام مزارع بتطبيق تقنية الإنتقاء الإصطناعي. نقدم فيما يلي مرحلتي هذه التقنية:

**- المرحلة الأولى :**

زرعت بذور نوع معين من النباتات المزهرة فتم الحصول على جماعة أولى  $G_1$ . يمثل مبيان الوثيقة 1 نتائج القياس الإحيائي لطول سويقات أزهار هذه الجماعة .



الوثيقة 1

- المرحلة الثانية :

نظرا لكون أغلب الازهار المحصل عليها في الجماعة الأولى  $G_1$  يصعب تسويقها لقصر سويقاتها، قام المزارع بانتقاء نباتات القسم [70 cm - 75 cm] وأخضعها للإخصاب الذاتي فحصل على جماعة ثانية  $G_2$ . يعطي جدول الوثيقة 2 النتائج المحصل عليها .

73	68	63	58	53	48	طول السويقات ب cm (وسط الأقسام)
55	88	150	88	68	40	عدد الازهار (التردد)

الوثيقة 2

1 - حدد المنوال واحسب المعدل الحسابي والانحراف النمطي المعياري ومجال الثقة. موضحا طريقة الحساب بواسطة جدول إجمالي لحساب الثابتات. (2,5 ن)

$$\delta = \sqrt{\frac{\sum fi(x_i - \bar{x})^2}{n}}$$

نعطي صيغة الانحراف المعياري :

2- مثل نتائج هذا الإنتقاء بواسطة مضعل الترددات ثم ضع عليه كلا من المعدل الحسابي والانحراف النمطي المعياري ومجال الثقة. (1,5 ن)

3- بين من خلال مقارنة الثابتات عند الجماعتين  $G_1$  و  $G_2$  أن الإنتقاء فعال. (2 ن)