

EXERCICES ET PROBLÈMES

Exercice 1:

1) Simplifier les expressions suivantes.

$$A = (e^x + e^{-x})^2 - (e^x - e^{-x})^2$$

$$B = (e^x - e^{-x})^2 (e^{2x} + e^x + 1)$$

2) Montre que pour tout x de \mathbf{IR} on a :

$$\bullet \frac{e^{-x} - 1}{e^{-x} + 1} = \frac{1 - e^x}{e^x + 1}$$

$$\bullet \frac{1}{e^x + 1} = \frac{e^{-x}}{e^{-x} + 1}$$

Exercice 2:

Résoudre dans \mathbf{IR} les équations suivantes.

1) $e^{2x} + e^x - 2 = 0$

2) $e^{2x+1} + e^{x+1} - 2e = 0$

3) $e^x - 2e^{-x} + 1 = 0$

Exercice 3:

Résolvez dans \mathbf{IR} les inéquations suivantes.

1) $e^{2x} + e^x - 2 < 0$

2) $e^{2x} + 2e^x - 3 \geq 0$ 3) $\frac{e^x - 1}{e^x - 2} > 0$

Exercice 4: calculer les limites suivantes.

$$A = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{x}$$

$$B = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2e^x}{x^2 + x}$$

$$C = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x \cdot e^{-x}$$

$$D = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 - e^x$$

$$E = \lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2 - x)e^x$$

$$F = \lim_{x \rightarrow +\infty} (2 - x)e^{-x}$$

$$G = \lim_{x \rightarrow +\infty} x(e^{\frac{1}{x}} - 1)$$

$$H = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x + x^2}{x + 1}$$

Exercice 5:

Démontrer que la fonction f est dérivable sur \mathbf{IR} , puis calculer $f'(x)$ dans chacun des cas suivants.

1) $f(x) = x \cdot e^{\sqrt{x}}$ 2) $f(x) = e^{-x} \cdot \ln x$

3) $f(x) = \frac{e^x}{1 + e^{2x}}$ 4) $f(x) = \ln(e^x + e^{-x})$

Exercice 6 :

Déterminer une primitive F de la fonction f sur I .

1) $f(x) = e^{-x+1}$; $I = \mathbf{IR}$.

2) $f(x) = \frac{1}{e^{-x} + 1}$; $I = \mathbf{IR}$.

3) $f(x) = \frac{e^x}{e^{2x} + 1}$; $I = \mathbf{IR}$

4) $f(x) = \frac{e^x}{(e^x + 1)^2}$; $I = \mathbf{IR}$

5) $f(x) = \frac{e^x}{x^2}$; $I = \mathbf{IR}$

6) $f(x) = \frac{e^{2x} + e^x - 1}{e^x - 1}$; $I = \mathbf{IR}$

Exercice 7 :

Soit la fonction f définie pour tout nombre réel x par :

$$f(x) = (2x^2 - 7x + 5)e^x$$

1) Déterminer la dérivée seconde de la fonction f .

2) Vérifier que :

$$(\forall x \in \mathbf{IR}); f(x) = 4e^x + 2f'(x) - f''(x)$$

3) Déterminer une primitive de la fonction f .

Exercice 8:

Soit la fonction f définie pour tout nombre réel x par :

$$f(x) = x + \frac{4}{1+e^x}$$

représentative dans un repère orthonormé (O, \vec{i}, \vec{j}) .

1) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

2) a) Montrer que: $(\forall x \in \mathbf{IR}); f'(x) = \left(\frac{1-e^x}{1+e^x} \right)^2$

b) Dresser le tableau de variation de f sur \mathbf{IR} .

c) En déduire que $I(0; 2)$ est un point d'inflexion.

3) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - x$ et interpréter

graphiquement le résultat trouvé.

4) Montrer que la droite (D) d'équation $y = x + 4$ est une asymptote oblique à (C_f) au voisinage de $-\infty$

5) Etudier la position relative de (C_f) et (D) .

6) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une solution unique α dans \mathbf{IR} , et que $-4 < \alpha < -3$.

7) En déduire que : $e^\alpha = -1 - \frac{4}{\alpha}$.

8) Tracer la courbe (C_f) dans le repère (O, \vec{i}, \vec{j}) .

Exercice 9:

Soit f la fonction définie sur \mathbf{IR} par :

$$f(x) = (e^{-x} - 1)^2$$

On désigne par (C_f) sa courbe représentative dans

un repère orthonormé (O, \vec{i}, \vec{j}) . (unité: 2cm)

1) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, et interpréter graphiquement le résultat.

2) Montrer que l'axe des ordonnées est une direction asymptotique de (C_f) au voisinage de $-\infty$.

3) a) Montrer que :

$$(\forall x \in \mathbf{IR}); f'(x) = 2e^{-x} (1 - e^{-2x})$$

b) Dresser le tableau de variation de f .

4) Montrer que (C_f) admet un point d'inflexion.

5) Soit g la restriction de la fonction f sur $[0; +\infty[$

a) Montrer que g admet une fonction réciproque g^{-1}

b) Montrer que: $(\forall x \in \mathbb{R}^+): g^{-1}(x) = -\ln(1 - \sqrt{x})$

6) Tracer (C_f) et $(C_{g^{-1}})$ dans le même repère.

Exercice 10 : (Sujet 2019 Rattrapage)

Première partie: Soit f la fonction définie sur \mathbf{IR}^* par :

$$f(x) = 2 + 8 \left(\frac{x-2}{x} \right) e^{x-4}$$

On désigne par (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé (O, \vec{i}, \vec{j}) . (L'unité: 1cm)

- 1) a) Vérifier que $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 2$, et interpréter graphiquement le résultat.
 b) Vérifier que $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = +\infty$, et interpréter graphiquement le résultat.
- 2) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
 b) Montrer que l'axe des ordonnées est une direction asymptotique de (C_f) au voisinage de $+\infty$.
- 3) a) Montrer que pour tout x de \mathbf{IR}^* on a :

$$f'(x) = \frac{8(x-2)(x^2-2x+4)e^{x-4}}{x^3}$$

 b) Vérifier que $(\forall x \in \mathbf{IR}^*); x^2 - 2x + 4 > 0$
 c) Montrer que f est strictement décroissante sur l'intervalle $]0; 2]$, et strictement croissante sur les intervalles $]-\infty; 0[$ et $[2; +\infty[$.
 d) Dresser le tableau de variation de f sur \mathbf{IR}^* .
- 4) Tracer (C_f) dans le repère (O, \vec{i}, \vec{j}) .
- 5) a) Vérifier que la fonction $\mathbf{H} : x \mapsto \frac{1}{x} e^{x-4}$ est une primitive de la fonction $\mathbf{h} : x \mapsto \frac{x-1}{x^2} e^{x-4}$ sur l'intervalle $[2; 4]$.
 b) Vérifier que

$$(\forall x \in \mathbf{IR}^*); f(x) = 2 + 8e^{x-4} - 32 \frac{(x-1)}{x^2} e^{x-4}$$

 c) Calculer l'intégrale $\int_2^4 e^{x-4} dx$.
 d) Calculer en cm^2 l'aire du domaine plan limité par (C_f) et l'axe des abscisse et les droites d'équations $x = 2$ et $x = 4$.

Deuxième partie :

- 1) Soit g la fonction définie sur $[2; 4]$ par :

$$g(x) = 8(x-2)e^{x-4} - x^2$$

 a) Calculer $g(4)$.
 b) Vérifier que pour tout x de $[2; 4]$,

$$g(x) = -(x-4)^2 e^{x-4} + x^2 (e^{x-4} - 1)$$

 c) Vérifier que pour tout x de $[2; 4]$: $e^{x-4} - 1 \leq 0$
 puis en déduire que pour tout x de $[2; 4]$: $g(x) \leq 0$.
- 2) a) Vérifier que pour tout x de $[2; 4]$:

$$f(x) - x = \left(\frac{x-2}{x^2} \right) g(x)$$

- b) En déduire que pour tout x de $[2; 4]$: $f(x) \leq x$.
- 3) On considère la suite (u_n) définie par :

$$u_0 = 3 \text{ et } u_{n+1} = f(u_n) \text{ pour tout } n \text{ de } \mathbf{IN}.$$

 a) Montrer que pour tout n de \mathbf{IN} on a: $2 \leq u_n \leq 4$.
 b) Déterminer la monotonie de la suite (u_n) , puis en déduire quelle est convergente.
 c) Calculer la limite de (u_n) .

Exercice 11 :

Partie A : On considère la fonction g définie par :

$$g(x) = 1 - (1+x)e^x$$

- 1) Dresser le tableau de variation de g .
 - 2) Calculer $g(0)$. Puis en déduire le signe de $g(x)$.
- Partie B :** Soit f la fonction définie sur \mathbf{IR} par :
 $f(x) = x(1 - e^x)$. On désigne par (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé (O, \vec{i}, \vec{j}) .

- 1) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.
- 2) Montrer que la droite $(D) : y = x$ est une asymptote oblique à (C_f) au voisinage de $-\infty$.
 Et préciser la position relative de (D) et (C_f) .
- 3) Montrer que (C_f) admet au voisinage de $+\infty$ une branche parabolique de direction asymptotique l'axe des ordonnées.
- 4) a) Montrer que pour tout réel x , on a: $f'(x) = g(x)$
 b) Dresser le tableau de variation de f .
- 5) Montrer que (C_f) admet un point d'inflexion I dont on déterminera ses coordonnées.
- 6) Construire (D) et (C_f) .

Partie C :

On considère la suite (u_n) définie par :

$$u_0 = -1 \text{ et } u_{n+1} = f(u_n) \text{ pour tout } n \text{ de } \mathbf{IN}.$$

- a) Montrer que pour tout n de \mathbf{IN} on a: $-1 \leq u_n \leq 0$
- b) Déterminer la monotonie de la suite (u_n) , puis en déduire quelle est convergente.
- c) Calculer la limite de la suite (u_n) .