

الأعداد العقدية

1. تقديم و تعاريف :

- ❖ توجد مجموعة يرمز لها ب \mathbb{C} و تسمى مجموعة الأعداد العقدية و تحقق $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$ و هي تحتوي على عدد نرمز له ب i حيث $i^2 = -1$
- ❖ كل عدد z من \mathbb{C} يمكن كتابة على شكل $z = a + ib$ مع $(a, b) \in \mathbb{R}^2$
- ❖ العدد a يسمى الجزء الحقيقي و نرمز له ب $\operatorname{Re}(z)$
- ❖ العدد b يسمى الجزء التخييلي و نرمز له ب $\operatorname{Im}(z)$
- ❖ الكتابة $z = a + ib$ مع $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ تسمى الشكل الجبري للعدد العقدي
- ❖ إذا كان $z = ib$ حيث $b \in \mathbb{R}$ نقول أن z تخييلي صرف و نكتب $z \in i\mathbb{R}$

2. خصائص :

ليكن $(z, z') \in \mathbb{C}^2$ لدينا :

$$z \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \operatorname{Im}(z) = 0 \quad \bullet$$

$$z \in i\mathbb{R} \Leftrightarrow \operatorname{Re}(z) = 0 \quad \bullet$$

$$z = z' \Leftrightarrow \begin{cases} \operatorname{Re}(z) = \operatorname{Re}(z') \\ \operatorname{Im}(z) = \operatorname{Im}(z') \end{cases} \quad \bullet$$

$$z = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \operatorname{Re}(z) = 0 \\ \operatorname{Im}(z) = 0 \end{cases} \quad \bullet$$

العمليات في \mathbb{C} ليكن $z' = a' + ib'$ و $z = a + ib$

$$z + z' = (a + a') + i(b + b') \quad \bullet$$

$$z \times z' = (aa' - bb') + i(ab' + a'b) \quad \bullet$$

$$-z = -a - ib \quad \bullet$$

$$\frac{1}{z} = \frac{a - ib}{a^2 + b^2} \quad \bullet$$

جميع خصائص الجداء و الجمع في \mathbb{R} تبقى صالحة في \mathbb{C} •

$$(a + ib)^2 = a^2 - b^2 + 2abi \quad \bullet$$

$$(a - ib)^2 = a^2 - b^2 - 2abi \quad \bullet$$

$$(a - ib)(a + ib) = a^2 + b^2 \quad \bullet$$

3. مرافق عدد عقدي

تعريف :

مرافق العدد العقدي $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ هو العدد العقدي $z = a + ib$ مع $\bar{z} = a - ib$ خصائص المرافقليكن z_1 و z_2 عددين عقديين

$$\overline{z_1 + z_2} = \overline{z_1} + \overline{z_2} \quad \checkmark$$

$$\overline{z_1 \times z_2} = \overline{z_1} \times \overline{z_2} \quad \checkmark$$

$$(z_1 \neq 0) \quad \overline{\frac{1}{z_1}} = \frac{1}{\overline{z_1}} \quad \checkmark$$

$$\overline{\left(\frac{z_1}{z_2} \right)} = \frac{\overline{z_1}}{\overline{z_2}} \quad \checkmark$$

$$z \in \mathbb{C} \text{ و } n \in \mathbb{Z} \text{ حيث } \overline{z^n} = \overline{z}^n \quad \checkmark$$

نتائج :

$$\begin{aligned} z + \bar{z} &= 2 \operatorname{Re}(z) & \bullet \\ z - \bar{z} &= 2i \operatorname{Im}(z) & \bullet \\ z \in \mathbb{R} \Leftrightarrow z &= \bar{z} & \bullet \\ z \in i\mathbb{R} \Leftrightarrow z &= -\bar{z} & \bullet \end{aligned}$$

4. معيار عدد عقدي :

معيار العدد العقدي $z = a + ib$ مع $a, b \in \mathbb{R}^2$ هو العدد الحقيقي الموجب الذي نرمز له بـ $|z|$ و هو معرف بما يلي :

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

خاصيات :

ليكن z و z' عددين عقديين

$$\begin{aligned} |z| &= \sqrt{z \cdot \bar{z}} & \checkmark \\ |z \times z'| &= |z| \times |z'| & \checkmark \\ (z \neq 0) \quad \left| \frac{1}{z} \right| &= \frac{1}{|z|} & \checkmark \\ (z' \neq 0) \quad \left| \frac{z}{z'} \right| &= \frac{|z|}{|z'|} & \checkmark \\ n \in \mathbb{Z} \text{ حيث } |z^n| &= |z|^n & \checkmark \\ |z + z'| &\leq |z| + |z'| & \checkmark \end{aligned}$$

5. الشكل المثلثي لعدد عقدي غير منعدم :أ. عمدة عدد عقدي غير منعدم :ليكن $z \in \mathbb{C}^*$ حيث x و y من \mathbb{R}

$$(k \in \mathbb{Z}) \quad \arg(z) = \theta + 2k\pi \quad \text{و نكتب :} \quad \begin{cases} \cos \theta = \frac{x}{|z|} \\ \sin \theta = \frac{y}{|z|} \end{cases} \quad \text{كل عدد حقيقي } \theta \text{ بحيث :} \quad (k \in \mathbb{Z}) \quad \arg(z) \equiv \theta [2\pi] \quad \text{أو}$$

ب. خصائص العددة:

ليكن z_1 و z_2 عددين عقديين غير منعدمين

$$\begin{aligned}\arg(\overline{z_1}) &\equiv -\arg(z_1)[2\pi] \quad \checkmark \\ \arg(z_1 \times z_2) &\equiv \arg(z_1) + \arg(z_2)[2\pi] \quad \checkmark \\ \arg\left(\frac{1}{z_1}\right) &\equiv -\arg(z_1)[2\pi] \quad \checkmark \\ \arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right) &\equiv \arg(z_1) - \arg(z_2)[2\pi] \quad \checkmark \\ n \in \mathbb{Z} \text{ حيث } \arg(z_1^n) &\equiv n \arg(z_1)[2\pi] \quad \checkmark\end{aligned}$$



6. الشكل المثلثي لعدد عقدي غير منعدم :

تعريف:


كل عدد عقدي z غير منعدم يكتب على شكل $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$
 $\arg(z) \equiv \theta [2\pi]$ و $|z| = r$ حيث

خصائص الشكل المثلثي :


$$\begin{aligned}\overline{r(\cos(\theta) + i \sin(\theta))} &= r(\cos(-\theta) + i \sin(-\theta)) \quad \bullet \\ r(\cos \theta + i \sin \theta) \times r'(\cos \theta' + i \sin \theta') &= rr'(\cos(\theta + \theta') + i \sin(\theta + \theta')) \quad \bullet \\ \frac{1}{r(\cos \theta + i \sin \theta)} &= \frac{1}{r}(\cos(-\theta) + i \sin(-\theta)) \quad \bullet \\ \frac{r(\cos \theta + i \sin \theta)}{r'(\cos \theta' + i \sin \theta')} &= \frac{r}{r'}(\cos(\theta - \theta') + i \sin(\theta - \theta')) \quad \bullet \\ (r(\cos \theta + i \sin \theta))^n \text{ حيث } n \in \mathbb{Z} \text{ (علاقة موافر)} &= r^n (\cos(n\theta) + i \sin(n\theta)) \quad \bullet\end{aligned}$$

7. تأويلات هندسية للأعداد العقدية :تعاريف:في المستوى (P) المنسوب إلى معلم متعمد مننظم $\left(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2\right)$ لتكن النقطة $M(a,b)$ العدد العقدي $(a,b) \in \mathbb{R}^2$ يسمى لحق النقطة M (النقطة $(a,b) \in \mathbb{R}^2$ تسمى صورة العدد $z = a+ib$ حيث• مرافق $\bar{z} = a - ib$ هو $z = a + ib$ • لدينا كذلك $U(a,b)$ هو لحق المتجهة $z = a+ib$ المستوى (P) يسمى المستوى العقدي (O, \vec{e}_1) يسمى المحور الحقيقي (O, \vec{e}_2) يسمى المحور التخييلي $aff(M) = a+ib$ أو $z_M = a+ib$ و نكتب $\overrightarrow{OM} = a\vec{e}_1 + b\vec{e}_2$

❖ ليكن $z = a + ib$ لحق النقطة M من المستوى العقدي لدينا :

$$\arg(z) \equiv \left(\overrightarrow{e_1}, \overrightarrow{OM} \right) [2\pi]$$


❖ المسافة $OM = \sqrt{a^2 + b^2} = |z|$:



❖ المسافة AB :
لتكن A و B نقطتان لحقاهما على التوالي z_A و z_B
 $AB = |z_B - z_A|$:

خصائص :

لتكن A و B نقطتان لحقاهما على التوالي z_A و z_B و \bar{u} و \bar{v} متجهتان من المستوى العقدي (P) :

- لحق المتجهة \overline{AB} هو $z_B - z_A$

- لحق المتجهة $\bar{u} + \bar{v}$ هو $z_{\bar{u}+\bar{v}} = z_{\bar{u}} + z_{\bar{v}}$

- لحق النقطة I منتصف القطعة $[AB]$ هو $z_I = \frac{z_A + z_B}{2}$

- $\bar{u} = \bar{v} \Leftrightarrow z_{\bar{u}} = z_{\bar{v}}$

- نقطة لدينا M

$$\overline{OM} = \overline{OA} + \overline{OB} \Leftrightarrow z_M = z_A + z_B$$

$$\overline{OM} = \alpha \overline{OA} \Leftrightarrow z_M = \alpha z_A$$

• لتكن $D(z_D)$ و $C(z_C)$ و $B(z_B)$ و $A(z_A)$ نقط مختلفة متشي مثلثي

$$\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} \in \mathbb{R} \Leftrightarrow C \text{ و } B \text{ و } A \text{ مستقيمية}$$

$$\frac{z_D - z_C}{z_B - z_A} \in \mathbb{R} \Leftrightarrow (AB) \parallel (DC)$$

$$\arg\left(\frac{z_D - z_C}{z_B - z_A}\right) \equiv 0[\pi] \Leftrightarrow$$

$$\frac{z_D - z_C}{z_B - z_A} \in i\mathbb{R} \Leftrightarrow (AB) \perp (DC)$$

$$\arg\left(\frac{z_D - z_C}{z_B - z_A}\right) \equiv \frac{\pi}{2}[\pi] \Leftrightarrow$$

$$\frac{z_D - z_A}{z_B - z_A} \times \frac{z_B - z_C}{z_D - z_C} \in \mathbb{R} \Leftrightarrow A \text{ و } B \text{ و } C \text{ و } D \text{ متداورة}$$

قياس الزوايا :

لتكن $D(z_D)$ و $C(z_C)$ و $B(z_B)$ و $A(z_A)$ نقط مختلفة متشي مثلثي حيث $O \neq A$ حيث $(\overrightarrow{e_1}, \overline{OA}) \equiv \arg(z_A)[2\pi]$

حيث $A \neq B$ حيث $(\overrightarrow{e_1}, \overline{AB}) \equiv \arg(z_B - z_A)[2\pi]$

حيث $A \neq C$ و $A \neq B$ حيث $(\overline{AB}, \overline{AC}) \equiv \arg\left(\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right)[2\pi]$

$$\left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{DC} \right) \equiv \arg \left(\frac{z_C - z_D}{z_B - z_A} \right) [2\pi] \quad \bullet$$

حيث $C \neq D$ و $A \neq B$

8. الشكل الأسني لعدد عقدي :تعريف :

كل عدد عقدي غير منعدم يكتب على شكله الأسني بـ:

$$\arg(z) \equiv \theta [2\pi] \quad \text{حيث } |z| = r$$

خصائص :

$$\begin{aligned} e^{i\theta} &= \cos \theta + i \sin \theta & \checkmark \\ \overline{e^{i\theta}} &= e^{-i\theta} & \checkmark \\ \frac{1}{e^{i\theta}} &= e^{-i\theta} & \checkmark \\ e^{i\theta} \times e^{i\theta'} &= e^{i(\theta+\theta')} & \checkmark \\ \frac{e^{i\theta}}{e^{i\theta'}} &= e^{i(\theta-\theta')} & \checkmark \\ (e^{i\theta})^n &= e^{in\theta} & \checkmark \end{aligned}$$

صيغ أولين

$$\begin{aligned} \cos \theta &= \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \\ \sin \theta &= \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i} \end{aligned}$$


٩. المعدلات في \mathbb{C}

أ. المعادلة $(a \in \mathbb{R}^*) \quad z^2 = a$

إذا كان $a \in \mathbb{R}_*$ لدينا $z = i\sqrt{-a}$ و $z = -i\sqrt{-a}$

إذا كان $a \in \mathbb{R}_+^*$ لدينا $z = \sqrt{a}$ و $z = -\sqrt{a}$

ب. المعادلة $az^2 + bz + c = 0$ حيث $a, b, c \in \mathbb{R}$ مع $a \neq 0$



١٠. التحويلات الاعتيادية:

خاصية :

نعتبر تحويلا في المستوى يربط كل نقطة (z') بالنقطة $M(z)$

❖ الكتابة العقدية للإزاحة T ذات المتجهة \bar{u} هي : $z' = z + z_{\bar{u}}$

❖ الكتابة العقدية للتحاكي الذي مركزه (ω) ونسبة k هي : $z' - \omega = k(z - \omega)$

❖ الكتابة العقدية للدوران الذي مركزه (ω) وزاويته θ هي : $z' - \omega = e^{i\theta}(z - \omega)$