

ذ. محمد الكبار

الأعداد العقدية

مجموعة الأعداد العقدية هي: $\{z = a + ib \mid (a; b) \in \mathbb{R}^2 \text{ و } i^2 = -1\}$

← الكثافة الديهية لعدد عقدي:

ليكن $z = a + ib$ عدداً عقدياً حيث: $(a; b) \in \mathbb{R}^2$

$a + ib$ تسمى الكتابة الجبرية للعدد العقدي z

العدد a يسمى الجزء الحقيقي للعدد z ويرمز له بالرمز: $\text{Re}(z)$

العدد b يسمى الجزء التخييلي للعدد z ويرمز له بالرمز: $\text{Im}(z)$

- إذا كان: $\text{Im}(z) = 0$ فإن z هو عدد حقيقي

- إذا كان: $\text{Re}(z) = 0$ فإن z يسمى عدداً تخيليّاً صرفاً

الثان خاصتان:


← نساوي عددين عقديين:

ليكن z و z' عددين عقديين

$$z = z' \Leftrightarrow \text{Re}(z) = \text{Re}(z') \text{ و } \text{Im}(z) = \text{Im}(z')$$

← النمثيل اطباني لعدد عقدي:

ليكن المستوى العقدي منسوباً إلى معلم متعامد منظم $(o, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$




ليكن $z = a + ib$ عدداً عقدياً حيث: $(a; b) \in \mathbb{R}^2$

نربط العدد العقدي z بالنقطة $M(a, b)$

العدد z يسمى لحق النقطة M و النقطة M تسمى صورة العدد z و نكتب: $M(z)$

العدد z يسمى كذلك لحق المتجهة \overrightarrow{OM} و نكتب: $z = \text{Aff}(\overrightarrow{OM})$ أو $\overrightarrow{OM}(z)$



← مرافق عدد عقدي:

ليكن $z = a + ib$ عدداً عقدياً حيث: $(a; b) \in \mathbb{R}^2$

مرافق العدد z هو العدد العقدي: $\bar{z} = a - ib$

و $M'(\bar{z})$ متماثلان بالنسبة للمحور الحقيقي

$z \leftrightarrow \bar{z} = z$ عدد حقيقي

$z \leftrightarrow \bar{z} = -z$ عدد تخيلي صرفي

$$z + \bar{z} = 2 \text{Re}(z)$$

$$z - \bar{z} = 2i \text{Im}(z)$$

$$z\bar{z} = [\text{Re}(z)]^2 + [\text{Im}(z)]^2$$


$$\frac{\bar{z} + z'}{\bar{z} \times z'} = \bar{z} + \bar{z}'$$

$$(n \in \mathbb{N}^*) \quad \bar{z^n} = \bar{z}^n$$

$$\left(\frac{1}{z'} \right) = \frac{1}{\bar{z}'} \quad (z' \neq 0)$$

$$\left(\frac{z}{z'} \right) = \frac{\bar{z}}{\bar{z}'} \quad (z' \neq 0)$$

← معنار عدد عقدي:




ليكن $z = a + ib$ عدداً عقدياً حيث: $(a; b) \in \mathbb{R}^2$

معنار العدد العقدي z هو العدد الحقيقي الموجب: $|z| = \sqrt{z\bar{z}} = \sqrt{a^2 + b^2}$

$ z \times z' = z \times z' $	$ z^n = z ^n \quad (n \in \mathbb{N}^*)$
$ \bar{z} = z $	$ -z = z $
$\left \frac{1}{z'} \right = \frac{1}{ z' }$	$\left \frac{z}{z'} \right = \frac{ z }{ z' } \quad (z' \neq 0)$

← الشكل الذهلي و الكثانية الأساسية لعدد عقدي غير منعدم:



حالات خاصة:

الكتابة المثلثية لعدد حقيقي a غير منعدم

$a < 0$	$a > 0$
$a = [-a, \pi]$	$a = [a, 0]$
$ai = \left[-a, -\frac{\pi}{2}\right]$	$ai = \left[a, +\frac{\pi}{2}\right]$

ليكن z عدداً عقدياً غير منعدم

نضع $|z| = r$ و $\arg z = \theta [2\pi]$

- الشكل المثلثي للعدد العقدي z هو:

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta) = [r, \theta]$$

- الكتابة الأساسية للعدد العقدي z هي:

$re^{i\theta} \times r'e^{i\theta'} = rr'e^{i(\theta+\theta')}$ • $\overline{re^{i\theta}} = re^{-i\theta}$ • $-re^{i\theta} = re^{i(\pi+\theta)}$ • $(re^{i\theta})^n = r^n e^{in\theta}$ • $\frac{1}{r'e^{i\theta'}} = \frac{1}{r'} e^{-i\theta'}$ • $\frac{re^{i\theta}}{r'e^{i\theta'}} = \frac{r}{r'} e^{i(\theta-\theta')}$ •	$[r, \theta] \times [r', \theta'] = [rr'; \theta + \theta']$ • $\overline{[r, \theta]} = [r, -\theta]$ • $-[r, \theta] = [r, \pi + \theta]$ • $[r, \theta]^n = [r^n; n\theta]$ • $\frac{1}{[r', \theta']} = \left[\frac{1}{r'}, -\theta'\right]$ • $\frac{[r, \theta]}{[r', \theta']} = \left[\frac{r}{r'}, \theta - \theta'\right]$ •	$\arg(zz') \equiv (\arg z + \arg z')[2\pi]$ • $\arg \bar{z} \equiv -\arg z [2\pi]$ • $-\arg z \equiv (\pi + \arg z)[2\pi]$ • $\arg z^n \equiv n \arg z [2\pi]$ • $\arg \frac{1}{z} \equiv -\arg z [2\pi]$ • $\arg \frac{z}{z'} \equiv (\arg z - \arg z')[2\pi]$ •
$z \text{ عدد حقيقي } \Leftrightarrow \arg z = k\pi$ • $(k \in \mathbb{Z})$ $z \text{ عدد تخيلي صرف } \Leftrightarrow \arg z = \frac{\pi}{2} + k\pi$ •		$\forall k \in \mathbb{Z} \quad [r, \theta + 2k\pi] = [r, \theta]$

← صيغنا أولى:

$$\forall \theta \in \mathbb{R} \quad \cos \theta = \frac{1}{2}(e^{i\theta} + e^{-i\theta})$$

$$\sin \theta = \frac{1}{2i}(e^{i\theta} - e^{-i\theta})$$

$$\forall n \in \mathbb{N}$$

$$(\cos \theta + i \sin n\theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$$

← حل المعادلة $z^2 = a$ حيث $z \in \mathbb{C}$

المعادلة:	مجموع حلول المعادلة:		
$a > 0$	$S = \{-\sqrt{a}; \sqrt{a}\}$		
$a = 0$	$S = \{0\}$		
$a < 0$	$S = \{-i\sqrt{-a}; i\sqrt{-a}\}$		$z \in \mathbb{C} \quad z^2 = a$

حل المعادلة: $az^2 + bz + c = 0$ حيث $a \neq 0$ و $a, b, c \in \mathbb{C}$ و $z \in \mathbb{C}$

المعادلة:	مجموعة حلول المعادلة:
$z \in \mathbb{C} \quad az^2 + bz + c = 0$ $(\Delta = b^2 - 4ac)$	$S = \left\{ \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}; \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \right\}$ $\Delta > 0$
$z \in \mathbb{C} \quad az^2 + bz + c = 0$ $(\Delta = b^2 - 4ac)$	$S = \left\{ \frac{-b}{2a} \right\}$ $\Delta = 0$
$z \in \mathbb{C} \quad az^2 + bz + c = 0$ $(\Delta = b^2 - 4ac)$	$S = \left\{ \frac{-b - i\sqrt{-\Delta}}{2a}; \frac{-b + i\sqrt{-\Delta}}{2a} \right\}$ $\Delta < 0$

مفاهيم هندسية و مصطلحات الأعداد العقدية:

العلاقة العقدية	المفهوم الهندسي
$AB = z_B - z_A $	المسافة AB
$z_I = \frac{z_A + z_B}{2}$	منتصف القطعة I
$(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}) \equiv \arg\left(\frac{z_c - z_A}{z_B - z_A}\right)[2\pi]$	قياس الزاوية $(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC})$
$\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} \in \mathbb{R}$	نقط مستقيمية A, B و C
$\frac{z_D - z_A}{z_B - z_C} \times \frac{z_D - z_C}{z_B - z_A} \in \mathbb{R}$ أو $\frac{z_D - z_A}{z_B - z_A} \times \frac{z_B - z_C}{z_D - z_C} \in \mathbb{R}$	نقط متداورة A, B, C و D

المفهوم الهندسي	العلاقة العقدية
$AM = r$ ● تنتمي إلى الدائرة التي مركزها A وشعاعها r ●	$ z - z_A = r$ $(r > 0)$
$AM = BM$ ● تنتمي إلى واسط M ●	$ z - z_A = z - z_B $
مثلث قائم الزاوية في A ABC	$\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = \left[r; \pm \frac{\pi}{2} \right]$
مثلث متساوي الساقين في A ABC	$\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = [1; \theta]$
مثلث متساوي الساقين و قائم الزاوية في A ABC	$\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = \left[1; \pm \frac{\pi}{2} \right]$
مثلث متساوي الأضلاع ABC	$\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = \left[1; \pm \frac{\pi}{3} \right]$

متناهٰيات عقدية لبعض النحويات الاعتيادية:

التحول	تمثيله العقدي هو:
الإزاحة t ذات المتجهة \vec{u}	حيث b لحق المتجهة \vec{u} $z' = z + b$
التحاكي h الذي مركزه Ω و نسبته k	حيث ω لحق النقطة Ω $z' - \omega = k(z - \omega)$
الدوران r الذي مركزه Ω و زاويته θ	حيث ω لحق النقطة Ω $z' - \omega = e^{i\theta}(z - \omega)$