

ملخصى وقواعدي في الرياضيات لمستوى الثانية باك علوم فيزيائية وعلوم الحياة والأرض
من انجاز : الأستاذ نجيب عثمانى أستاذ مادة الرياضيات في الثانوى تاهيلي

درس الأعداد العقدية الجزء 2:

للمعادلة حلا حقيقيا مزدوجا هو: $z = -\frac{b}{2a} = 1$ إذن: $S = \{1\}$

نتيجة: ليكن z_1 و z_2 حلي المعادلة $(a \neq 0)az^2 + bz + c = 0$ في المجموعة \mathbb{C} , لدينا: $az^2 + bz + c = a(z - z_1)(z - z_2)$

لكل z من \mathbb{C} $z_1 + z_2 = -\frac{b}{a}$ و $z_1 \times z_2 = \frac{c}{a}$

II. الترميز الأسى لعدد عقدي غير منعدم

تعريف: كل عدد عقدي z غير منعدم, معياره r و θ عمدة له يكتب على الشكل $re^{i\theta}$ هذه الكتابة تسمى ترميزا أسيا للعدد العقدي z

مثال: ليكن: $z = \sqrt{2} + i\sqrt{2}$, لدينا: $|z| = 2$ و $\arg z \equiv \frac{\pi}{4} [2\pi]$

إذن $z = 2e^{i\frac{\pi}{4}}$ هي ترميز أسى للعدد العقدي z

خصائص: ليكن r و r' عددين حقيقيين موجبين قطعا و θ و θ' عددين حقيقيين:

$$(1) re^{i\theta} \times r'e^{i\theta'} = rr'e^{i(\theta+\theta')} \quad (2) re^{i\theta} = re^{-i\theta} \quad (3) re^{i\theta} = re^{i(\theta+\pi)}$$

$$(4) \frac{1}{re^{i\theta}} = \frac{1}{r}e^{-i\theta} \quad (5) \frac{r'e^{i\theta'}}{re^{i\theta}} = \frac{r'}{r}e^{i(\theta'-\theta)} \quad (6) (re^{i\theta})^n = r^n re^{in\theta}$$

III. صيغتا أولير: ليكن θ عددا حقيقيا, لدينا:

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i \sin\theta \quad \text{و} \quad e^{-i\theta} = \cos\theta - i \sin\theta$$

$$\cos\theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \quad \text{و} \quad \sin\theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$$

ولكل n من \mathbb{N} و θ من \mathbb{R} لدينا:

$$e^{in\theta} - e^{-in\theta} = 2i \sin(n\theta) \quad \text{و} \quad e^{in\theta} + e^{-in\theta} = 2 \cos(n\theta)$$

مثال: بين أن: $\cos^3 \theta = \frac{1}{4} \cos 3\theta + \frac{3}{4} \cos \theta$ لكل θ من \mathbb{R}

أو سؤال بطريقة أخرى: قم باخطا: $\cos^3 \theta$

الجواب: ليكن $\theta \in \mathbb{R}$ لدينا: $\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$

اذن $\cos^3 \theta = \left(\frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}\right)^3 = \frac{e^{in\theta} + e^{-in\theta}}{2}$ و منه:

$$\cos^3 \theta = \frac{1}{8} \left((e^{i\theta})^3 + 3(e^{i\theta})^2 \cdot e^{-i\theta} + 3e^{i\theta} \cdot (e^{-i\theta})^2 + (e^{-i\theta})^3 \right)$$

$$\cos^3 \theta = \frac{1}{8} \left(e^{i3\theta} + 3e^{i2\theta} \cdot e^{-i\theta} + 3e^{i\theta} \cdot e^{-i2\theta} + e^{-i3\theta} \right)$$

$$= \frac{1}{8} (2 \cos 3\theta + 3 \times 2 \cos \theta) = \frac{1}{4} \cos 3\theta + \frac{3}{4} \cos \theta$$

IV. صيغة موافر

ليكن θ عددا حقيقيا و n عنصرا من \mathbb{N} , لدينا:

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$$

هذه المتساوية تسمى صيغة موافر, و تكتب أيضا: $(e^{i\theta})^n = e^{in\theta}$

I. المعادلات من الدرجة الثانية بمجهول واحد في المجموعة \mathbb{C}

(1) ليكن a عددا حقيقيا غير منعدم حلا المعادلة: $z^2 = a$ في المجموعة \mathbb{C} هما:

▪ \sqrt{a} و $-\sqrt{a}$ إذا كان $a > 0$

▪ $i\sqrt{-a}$ و $-i\sqrt{-a}$ إذا كان $a < 0$

مثال 1: حل في المجموعة \mathbb{C} المعادلة التالية: $z^2 = 5$

$z^2 = 5$ يعني: $z = \sqrt{5}$ و $z = -\sqrt{5}$

ومنه: $S = \{-\sqrt{5}; \sqrt{5}\}$

مثال 2: حل في المجموعة \mathbb{C} المعادلة التالية: $z^2 = -3$

$z^2 = -3$ يعني $z^2 = (\sqrt{3}i)^2$ $z = \sqrt{3}i$ و $z = -\sqrt{3}i$

ومنه: $S = \{-\sqrt{3}i; \sqrt{3}i\}$

(2) حل في المجموعة \mathbb{C} المعادلة:

$az^2 + bz + c = 0$ حيث a و b و c أعداد حقيقية و a غير منعدم

نحسب العدد الحقيقي $\Delta = b^2 - 4ac$ مميز المعادلة

$az^2 + bz + c = 0$

▪ إذا كان $\Delta > 0$ فان المعادلة تقبل حلين حقيقيين هما:

$$z' = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \quad \text{و} \quad z = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$$

▪ إذا كان $\Delta = 0$ فان المعادلة تقبل حلا حقيقيا مزدوجا هو: $z = -\frac{b}{2a}$

▪ إذا كان $\Delta < 0$ فان المعادلة تقبل حلين عقديين مترافقين و مختلفين

هما: $z' = \frac{-b + i\sqrt{\Delta}}{2a}$ و $z = \frac{-b - i\sqrt{\Delta}}{2a}$

مثال 1: لنحل في المجموعة \mathbb{C} المعادلة: $(E): z^2 - z + 2 = 0$

مميز المعادلة (E) هو: .

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-1)^2 - 4(2) = -7 = (i\sqrt{7})^2$$

حلا المعادلة (E) هما: $z_1 = \frac{1 + i\sqrt{7}}{2} = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{7}}{2}$ و $z_2 = \frac{1 - i\sqrt{7}}{2} = \frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{7}}{2}$

إذن: $S = \left\{ \frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{7}}{2}; \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{7}}{2} \right\}$

مثال 2: لنحل في المجموعة \mathbb{C} المعادلة: $(E): z^2 - z - 2 = 0$

مميز المعادلة (E) هو:

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-1)^2 - 4(-2) = 9 = (3)^2$$

حلا المعادلة (E) هما: $z_1 = \frac{1-3}{2} = -1$ و $z_2 = \frac{1+3}{2} = 2$

إذن: $S = \{-1; 2\}$

مثال 3: لنحل في المجموعة \mathbb{C} المعادلة: $(E): z^2 - 2z + 1 = 0$

الجواب: مميز المعادلة (E) هو: $\Delta = b^2 - 4ac = 0$