



سلسلة رقم

الأستاذ: بنموسى محمد ثانوية: عمر بن عبد العزيز المستوى: 2 علوم فيزياء + 2 ع. ح. أ



الصفحة

تمارين : الدوال الأسية

.01

بسط التعبيرات التالية: $a = e^{3\ln(x)}$ و $b = \frac{(e^{5x})^4 \times e^{-8x}}{e^{3x}}$ و $c = \sqrt{e^{2x} + 2e^x + 1}$

.02

حل في \mathbb{R} المعادلات التالية: $e^{7x} - 2 = 0$ و $e^{3x} + 3 = 0$ و $(e^x - 2)(e^{2x} + 6) = 0$

.03

حل في \mathbb{R} المتراجحات التالية: $e^{3x+1} > e^{7x+2}$ و $e^{2x+3} + 9 \leq 0$ و $e^x(e^x - 1) < 0$

.04

حدد مجموعة تعريف الدالة f في الحالات التالية:

▪ $f(x) = 2e^x + 1$ و $f(x) = (4 - e^x)\ln(e^x - 3)$ و $f(x) = \frac{e^x + 5}{e^x}$ و $f(x) = \frac{3e^x}{e^x - 2}$ و $f(x) = \frac{3}{e^x \times \ln(x)}$

.05

أحسب $f'(x)$ في الحالات التالية:

▪ $f(x) = 7x^4 - e^{2x}$ و $f(x) = \ln(e^x - 2)$ و $f(x) = \frac{e^x + 5}{e^x}$ و $f(x) = e^{\frac{3x-5}{x-2}}$ و $f(x) = \sqrt{e^{2x} - e^x}$

.06

أحسب النهايات التالية:

▪ $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{e^{3x+2} - e^5}{x-1}$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2e^x - 1}{5e^x - 3}$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2e^x - 1}{5e^x - 3}$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 \times e^x$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} 3x - 2 - e^x$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} xe^{-2x}$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x}{x+2} e^{-2x}$

حدد الدوال الأصلية للدالة f حيث: $f(x) = e^x - 2e^{3x}$ و $f(x) = \frac{3}{3x+2} + e^{3x}$ و $f(x) = \frac{e^{2x}}{e^{2x} - 5}$ و $f(x) = 3x^2 + e^x \times (e^x + 2)^4$

.07 باك 2015 الدورة العادية

1. لتكن f الدالة العددية للمتغير الحقيقي x المعرفة على \mathbb{R} ب: $g(x) = e^x - 2x$ (0.75 ن)

.01 أحسب: $g'(x)$ لكل x من \mathbb{R} ثم استنتج أن g تناقصية على $]-\infty, \ln 2]$ و تزايدية على $[\ln 2, +\infty[$.

.02 تحقق أن: $g(\ln 2) = 2(1 - \ln 2)$ ثم حدد إشارة $g(\ln 2)$ (0.5 ن)



سلسلة رقم

الأستاذ: بنموسى محمد ثانوية: عمر بن عبد العزيز المستوى: 2 علوم فيزياء + 2 ع. ح. أ



الصفحة

تمارين : الدوال الأسية

03. استنتج أن $g(x) > 0$ لكل x من \mathbb{R} (0.5 ن)II. نعتبر الدالة العددية f المعرفة على \mathbb{R} بما يلي $f(x) = \frac{x}{e^x - 2x}$.ليكن (C_f) منحنى الدالة f في معلم متعامد ممنظم $(O.; \vec{i}; \vec{j})$ (الوحدة 1 cm) .

... 01

أ- بين أن : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\frac{1}{2}$ (لاحظ أن $e^x - 2x = x \left(\frac{e^x}{x} - 2 \right)$ لكل x من \mathbb{R}^*) (1 ن)

ب- أول هندسيا كل نتيجة من النتيجتين السابقتين) (0.5 ن)

... 02

أ- بين أن : $f'(x) = \frac{(1-x)e^x}{(e^x - 2x)^2}$ لكل x من \mathbb{R}^* (0.75 ن)ب- أدرس إشارة $f'(x)$ على \mathbb{R} ثم أعط جدول تغيرات الدالة f على \mathbb{R} (0.75 ن)ج- بين أن : $y = x$ هي معادلة للمستقيم (T) المماس للمنحنى (C_f) في النقطة O أصل المعلم (0.25 ن)03. أنشئ في نفس المعلم $(O.; \vec{i}; \vec{j})$ ، المستقيم (T) ، والمنحنى (C_f) (ناخذ $\frac{1}{e-2} \approx 1,4$ و نقبل أن للمنحنى (C_f) نقطتي انعطافأفصول إحداهما ينتمي إلى المجال $]0,1[$ و أفصول الأخرى أكبر من $\frac{3}{2}$ (1 ن)

... 04

أ- بين أن : $\frac{1}{e-2} \leq \frac{x}{e^x - 2x} \leq xe^{-x}$ لكل x من المجال $[0, +\infty[$ (0.75 ن)ب- باستعمال الكاملة بالأجزاء ، بين أن : $\int_0^1 xe^{-x} dx = 1 - \frac{2}{e}$ (0.75 ن)ج- لتكن ، ب cm^2 ، مساحة حيز المستوى المحصور بين المنحنى (C_f) و محور الأفاصيل و المستقيمين اللذينمعادلتاهما $x=0$ و $x=1$. بين أن : $\frac{1}{e-2} \leq A(E) \leq 1 - \frac{2}{e}$ (0.5 ن)III. لتكن h الدالة العددية المعرفة على المجال $]-\infty, 0]$ بما يلي : $h(x) = f(x)$.01. بين أن : الدالة h تقبل دالة عكسية h^{-1} معرفة على المجال J يتم تحديده .02. أنشئ في نفس المعلم $(O.; \vec{i}; \vec{j})$ ، المنحنى $(C_{h^{-1}})$ الممثل للدالة h^{-1} .IV. لتكن (u_n) المتتالية العددية المعرفة بما يلي $u_0 = 2$ و $u_{n+1} = h(u_n)$ لكل n من \mathbb{N} .01. بين بالترجع أن : $u_n \leq 0$ لكل n من \mathbb{N} (0.5 ن)02. بين أن : المتتالية (u_n) تزايدية (يمكنك ملاحظة ، مبيانيا ، أن $h(x) \geq x$ لكل x من المجال $]-\infty, 0]$) (0.75 ن)03. استنتج أن : المتتالية (u_n) متقاربة و حدد نهايتها (0.75 ن)



I

نعتبر الدالة العددية g المعرفة على $[0; +\infty[$ بما يلي : $g(x) = (x+1)^2 e^{-x} - x$.

01. ...أ- بين أن : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2} = +\infty$ (يمكنك أن تضع $x = 2t$) . **ب-** بين أن : $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty$

...02

أ- بين أن : $g'(x) = -x^2 e^{-x} + e^{-x} - 1$. **ب-** بين أن : $e^{-x} \leq 1$; $\forall x \in]0; +\infty[$.
ج- استنتج إشارة : $g'(x)$ على $[0; +\infty[$ ؛ ثم ضع جدول تغيرات للدالة $g(x)$ على $[0; +\infty[$.

د- بين أنه يوجد عدد حقيقي وحيد α من المجال $\left]1, \frac{3}{2}\right[$ حيث $g(\alpha) = 0$.

II. لتكن f الدالة العددية للمتغير الحقيقي x المعرفة على \mathbb{R} ب: $f(x) = (x+1)^2 e^{-x}$.

ليكن (C_f) منحنى الدالة f في معلم متعامد ممنظم $(O; \vec{i}; \vec{j})$ (الوحدة 2 cm) .

01. أحسب : $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ و أول النتيجة هندسيا . $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

02. بين أن : $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$ و أول النتيجة هندسيا .

03. **أ-** أحسب $f'(x)$ على \mathbb{R} . **ب-** أدرس إشارة : $f'(x)$. ثم أعط جدول تغيرات f . **ج-** استنتج رتبة f على $\left]1; \frac{3}{2}\right[$.

د- بين أنه يوجد عدد حقيقي وحيد α من المجال $\left]1; \frac{3}{2}\right[$ حيث $f(\alpha) = \alpha$.

04. حدد تقاطع المنحنى (C_f) مع المحورين .

05. بين أن : المماس (T) ل (C_f) في النقطة التي أفصولها $x_0 = 0$ موازي للمستقيم (Δ) الذي معادلته $y = x$: (Δ) .

06. أنشئ (C_f) و المستقيم (Δ) (نأخذ $e \approx 2,718$) .

07. **أ-** بين أن g قصور f على $I = [-1; 1]$ تقابل من I إلى J يتم تحده . **ب-** أنشئ $(C_{g^{-1}})$ منحنى الدالة g في نفس المعلم .

III. لنعتبر المتتالية العددية $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ المعرفة بما يلي : $u_0 = \frac{3}{2}$ و $u_{n+1} = f(u_n)$ لكل n من \mathbb{N} .

01. باستعمال ما سبق ؛ بين بالترجع أن : $\forall n \in \mathbb{N} ; 1 \leq u_n \leq \frac{3}{2}$.

02. نقبل النتيجة التالية : $\forall n \in \mathbb{N} ; |u_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{2} |u_n - \alpha|$.

أ- بين ن : $\forall n \in \mathbb{N} ; |u_{n+1} - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}$. **ب-** حدد نهاية المتتالية (u_n) .