

## المتتاليات العددية

### 1. تذكير:

#### أ. المتتاليات الحسابية:

##### تعريف:

$$(u_n) \text{ حسابية } (r) \Leftrightarrow u_{n+1} - u_n = r \text{ أساس } (u_n)$$

كتابة  $(u_n)$  بدلالة  $n$ :

$$u_n = u_p + (n - p)r$$

$$u_n = u_p + (n - p)r$$

$$u_n = u_1 + (n - 1)r$$

##### حساب المجموع:

$$u_p + u_{p+1} + \dots + u_m = (m - p + 1) \cdot \left( \frac{u_p + u_m}{2} \right)$$

#### ب. المتتاليات الهندسية:

##### تعريف:

$$(v_n) \text{ هندسية } (q) \Leftrightarrow v_{n+1} = qv_n \text{ أساس } (v_n)$$

كتابة  $v_n$  بدلالة  $n$ :

$$v_n = v_p \cdot q^{n-p}$$

$$v_n = v_0 \cdot q^n$$

$$v_n = v_1 \cdot q^{n-1}$$

حساب المجموع :

$$v_p + v_{p+1} + \dots + v_m = v_p \cdot \frac{1 - q^{m-p+1}}{1 - q}$$

ج. رتبة متتالية :

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n \geq 0 &\Leftrightarrow \text{تزايدية } (u_n) \\ u_{n+1} - u_n \leq 0 &\Leftrightarrow \text{تناقصية } (u_n) \\ u_{n+1} = u_n &\Leftrightarrow \text{ثابتة } (u_n) \end{aligned}$$

د. متتالية مصغرة - مكبورة - محدودة

$$\begin{aligned} m \leq u_n &\Leftrightarrow \text{مصغرة بالعدد } m \text{ } (u_n) \\ u_n \leq M &\Leftrightarrow \text{مكبورة بالعدد } M \text{ } (u_n) \\ m \leq u_n \leq M &\Leftrightarrow \text{محدودة } (u_n) \end{aligned}$$

2. نهاية متتالية :

أ. تعريف :

نقول أن نهاية المتتالية  $(u_n)$  هي العدد الحقيقي  $l$  إذا كان كل مجال مفتوح مركزه  $l$  يحتوي على جميع الحدود  $u_n$  ابتداء من رتبة معينة ونكتب :  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = l$  أو  $\lim u_n = l$

ب. أمثلة اعتيادية :

$$(p \in \mathbb{N}^*) \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} n^p = +\infty \quad (1)$$

$$(p \in \mathbb{N}^*) \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^p} = 0 \quad (2)$$

ج. خاصية :

إذا كانت  $(u_n)$  تقبل نهاية فإن هذه النهاية تكون وحيدة .

د. تعريف ومصطلحات :

➤ نقول إن  $(u_n)$  متقاربة إذا كانت تقبل نهاية منتهية  
➤ نقول إن  $(u_n)$  متباعدة إذا كانت تقبل نهاية لا منتهية أو لا تقبل نهاية

3. العمليات على النهايات :

خاصيات :

لتكن  $(u_n)$  و  $(v_n)$  متتاليتان متقاربتان لدينا :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n + v_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n) + \lim_{n \rightarrow +\infty} (v_n) \quad \bullet$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n \times v_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n) \times \lim_{n \rightarrow +\infty} (v_n) \quad \bullet$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left( \frac{1}{u_n} \right) = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n)} \quad \left( \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n \neq 0 \right) \quad \bullet$$

• ملاحظة : الخاصيات بالنسبة للعمليات على النهايات غير المنتهية هي نفسها على الدوال العددية

4. النهايات و الترتيب :

خاصيات

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = l \Leftrightarrow \begin{cases} v_n \leq u_n \leq w_n \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} w_n = l \end{cases} \quad (1)$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \alpha \Leftrightarrow \begin{cases} |u_n - \alpha| \leq v_n \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0 \end{cases} \quad (2)$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty \Leftrightarrow \begin{cases} u_n \leq v_n \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty \end{cases} \quad (3)$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty \Leftrightarrow \begin{cases} u_n \leq v_n \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = -\infty \end{cases} \quad (4)$$

5. نهاية المتتالية  $(q^n)$  :

خاصية :

$$q \leq -1 : (q^n) \text{ لا تقبل نهاية}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0 : -1 < q < 1$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 1 : q = 1$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = +\infty : q > 1$$

خاصية :

- كل متتالية تزايدية و مكبورة فهي متقاربة
- كل متتالية تناقصية و مصغرة فهي متقاربة

6. نهاية المتتالية  $(n^r)$   $(r \in \mathbb{Q}^*)$

خاصية :

$$\text{إذا كان } r > 0 \text{ فإن } \lim_{n \rightarrow +\infty} n^r = +\infty$$

$$\text{إذا كان } r < 0 \text{ فإن } \lim_{n \rightarrow +\infty} n^r = 0$$

7. نهاية متتالية من نوع  $v_n = f(u_n)$  :

خاصية :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = f(l) \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = l \text{ و } f \text{ متصلة في } l$$

8. نهاية متتالية من نوع  $u_{n+1} = f(u_n)$

خاصية:

$$\begin{cases} u_0 \in I \\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$$

إذا كانت  $f$  متصلة على  $I$  و  $f(I) \subset I$  و  $(u_n)$  متقاربة  
فإن نهاية  $(u_n)$  هي حل للمعادلة  $f(x) = x$

ملاحظة:

❖ إذا كانت  $(u_n)$  تناقصية فإن  $u_n \leq u_0$

❖ إذا كانت  $(u_n)$  تزايدية فإن  $u_0 \leq u_n$