





سلسلة 2	دراسة الدوال حلول مقترحة	السنة 2 بكالوريا علوم تجريبية																
		<p><b>تمرين 1:</b></p> $\begin{cases} f(x) = x^2 - 4x + 5 ; x \geq 2 \\ f(x) = x^3 - 12x + 17 ; x < 2 \end{cases}$																
	<p>لدينا : <math>f(2) = 1</math> و <math>\lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x &gt; 2}} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x &gt; 2}} x^2 - 4x + 5 = 4 - 8 + 5 = 1</math></p> <p>و <math>\lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x &lt; 2}} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x &lt; 2}} x^3 - 12x + 17 = 8 - 24 + 17 = 1</math></p> <p>إذن : <math>\lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x &gt; 2}} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x &lt; 2}} f(x) = f(2) = 1</math> ، بالتالي : <math>f</math> متصلة في 2</p>	1																
	$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 - 12x + 17 = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 = -\infty$ $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 - 4x + 5 = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty$	2																
	<p>عند حساب النهاية جوار <math>+\infty</math> يجب استعمال التعبير <math>x^2 - 4x + 5</math> لكونه تم تعريفه في المجال <math>[2, +\infty[</math> و في <math>-\infty</math> يجب استعمال التعبير <math>x^3 - 12x + 17</math> لكونه تم تعريفه في المجال <math>]-\infty, 2[</math></p>																	
	<p>نعلم أن : <math>\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty</math> ولدينا : <math>\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - 4x + 5}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty</math></p> <p>وأن : <math>\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty</math> ولدينا : <math>\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3 - 12x + 17}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = +\infty</math></p> <p>إذن <math>Cf</math> يقبل فرعا شلجيميا باتجاه محور الأرتايب جوار <math>+\infty</math> و <math>-\infty</math></p>	3																
	<p>لدينا : <math>\lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x &gt; 2}} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x &gt; 2}} \frac{x^2 - 4x + 5 - 1}{x - 2} = \lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x &gt; 2}} \frac{x^2 - 4x + 4}{x - 2} = \lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x &gt; 2}} \frac{(x - 2)^2}{x - 2} = \lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x &gt; 2}} x - 2 = 0</math></p> <p>و : <math>\lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x &lt; 2}} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x &lt; 2}} \frac{x^3 - 12x + 17 - 1}{x - 2} = \lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x &lt; 2}} \frac{x^3 - 12x + 16}{x - 2}</math></p> <p>و : <math>\lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x &lt; 2}} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x &lt; 2}} \frac{(x - 2)(x^2 + 2x - 8)}{x - 2} = \lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x &lt; 2}} x^2 + 2x - 8 = 0</math></p> <p>بما أن : <math>\lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x &gt; 2}} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x &lt; 2}} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = 0 = f'(2)</math> فإن <math>f</math> تقبل الاشتقاق في 2 ولدينا : <math>f'(2) = 0</math></p>	4																
	<p>يجب دائما استعمال التعريف لدراسة قابلية اشتقاق دالة في نقطة تمثل طرف مجال.</p> <p>في الاشتقاق على اليسار قمنا بتعميل <math>x^3 - 12x + 16</math> وذلك بعد قسمتها على <math>x - 2</math> مستعملين القسمة الاقليدية</p>																	
	<p>لدينا : <math>\forall x \in ]2; +\infty[ f'(x) = (x^2 - 4x + 5)' = 2x - 4 = 2(x - 2)</math></p> <p>و : <math>\forall x \in ]-\infty; 2[ f'(x) = (x^3 - 12x + 17)' = 3x^2 - 12 = 3(x^2 - 4) = 3(x - 2)(x + 2)</math></p>	5																
	<table border="1" data-bbox="239 1657 1332 2004"> <tr> <td><math>x - 2</math></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td><math>(x - 2)(x + 2)</math></td> <td>+</td> <td>-</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td><math>f'(x)</math></td> <td>+</td> <td>-</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td><math>f(x)</math></td> <td colspan="3">  </td> </tr> </table>	$x - 2$	-	-	+	$(x - 2)(x + 2)$	+	-	+	$f'(x)$	+	-	+	$f(x)$				6
$x - 2$	-	-	+															
$(x - 2)(x + 2)$	+	-	+															
$f'(x)$	+	-	+															
$f(x)$																		



7

**تمرين 2 :**

$$\begin{cases} f(x) = -1 + \sqrt{x+1} ; x \geq 0 \\ f(x) = x - 1 + \frac{1}{x+1} ; x < 0 \end{cases}$$

لدينا :  $Df = \{x \geq 0 / x+1 \geq 0\} = [0, +\infty[$  ( لأن  $x \geq 0 \Rightarrow x+1 \geq 1 \geq 0$  )  
 على المجال :  $] -\infty, 0[$  ، لدينا :  $Df = \{x < 0 / x+1 \neq 0\} = \{x < 0 / x \neq -1\} = ] -\infty, -1[ \cup ] -1, 0[$   
 بالتالي :  $Df = [0, +\infty[ \cup ] -\infty, -1[ \cup ] -1, 0[ = ] -\infty, -1[ \cup ] -1, +\infty[$

1

لدينا :  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} x - 1 + \frac{1}{x+1} = -1 + 1 = 0$  و  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} -1 + \sqrt{x+1} = -1 + 1 = 0$   
 إذن :  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} f(x) = f(0) = 0$  ، بالتالي :  $f$  متصلة في 0

2

$$\lim_{\substack{x \rightarrow -\infty \\ x < -1}} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow -\infty \\ x < -1}} x - 1 + \frac{1}{x+1} = -\infty \quad (-\infty + 0 \rightarrow -\infty)$$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ x > -1}} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ x > -1}} -1 + \sqrt{x+1} = +\infty$$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow -1 \\ x > -1}} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow -1 \\ x > -1}} x - 1 + \frac{1}{x+1} = +\infty \quad (-2 + (+\infty) \rightarrow +\infty)$$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow -1 \\ x < -1}} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow -1 \\ x < -1}} x - 1 + \frac{1}{x+1} = -\infty \quad (-2 + (-\infty) \rightarrow -\infty)$$

3

👉 لاحظ أننا استعملنا التعبير  $x - 1 + \frac{1}{x+1}$  في كلا النهايتين و ذلك لكون  $-1 \in ] -\infty, 0[$

لدينا:

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{\sqrt{x+1} - 1}{x} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{(\sqrt{x+1} - 1)(\sqrt{x+1} + 1)}{x(\sqrt{x+1} + 1)} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{x+1-1}{x(\sqrt{x+1} + 1)} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{1}{\sqrt{x+1} + 1} = \frac{1}{2}$$

4

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} \frac{x - 1 + \frac{1}{x+1}}{x} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} \frac{x^2 - 1 + 1}{x(x+1)} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} \frac{x^2}{x(x+1)} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} \frac{x}{x+1} = 0$$

و بما أن  $\lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x > 2}} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \neq \lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x < 2}} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$  فإن  $f$  لا تقبل الاشتقاق في الصفر

لدينا:  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{1}{2}$  إذن  $Cf$  يقبل نصف مماس يمين الصفر معادلته:

$$\begin{cases} y = \frac{1}{2}x \\ x \geq 0 \end{cases} \text{ أي } \begin{cases} y = f'_d(0)(x - 0) + f(0) \\ x \geq 0 \end{cases}$$

لدينا:  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = 0$  إذن  $Cf$  يقبل نصف مماس أفقي يسار الصفر (معادلته)

لدينا:  $\forall x > 0 \quad f'(x) = (-1 + \sqrt{x+1})' = \frac{(x+1)'}{2\sqrt{x+1}} = \frac{1}{2\sqrt{x+1}} > 0$

و  $\forall x < 0 \quad f'(x) = \left(x - 1 + \frac{1}{x+1}\right)' = 1 - \frac{(x+1)'}{(x+1)^2} = 1 - \frac{1}{(x+1)^2} = \frac{(x+1)^2 - 1}{(x+1)^2} = \frac{x^2 + 2x}{(x+1)^2} = \frac{x(x+2)}{(x+1)^2}$

منه:

$x$	$-\infty$	$-1$	$0$	$+\infty$
$\frac{1}{2\sqrt{x+1}}$				+
$x(x+2)$	+	-		+
$f'(x)$	+	-		+
$f(x)$	$-\infty$		$0$	$+\infty$

5

نعلم أن:  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

و لدينا:  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-1 + \sqrt{x+1}}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-1}{x} + \frac{\sqrt{x+1}}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-1}{x} + \sqrt{\frac{x+1}{x^2}} = 0 + \sqrt{0} = 0$

إذن  $Cf$  يقبل فرعاً شلجيمياً باتجاه محور الأفاصيل جوار  $+\infty$

6

ونعلم أن:  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$  و لدينا:  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x - 1 + \frac{1}{x+1}}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{x+1} = 1$

منه:  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) - x = -1 + \frac{1}{x+1} = -1$


إذن  $Cf$  يقبل مقارباً مائلاً جوار  $-\infty$  معادلته:  $(\Delta): y = x - 1$

لدراسة الوضع النسبي لـ  $Cf$  و مقاربه المائل جوار  $-\infty$  ندرس إشارة الفرق  $f(x) - (x - 1)$  على المجال  $]-\infty, -1[ \cup ]-1, 0[$

على هذا المجال لدينا:  $f(x) - (x - 1) = \frac{1}{x+1}$  إذن:

$x$	$-\infty$	$-1$	$0$	$+\infty$
$x+1$		-	+	
		$Cf$ تحت المقارب	$Cf$ فوق المقارب	

7



رياضيات النجّاح أذ سمير لخريسي