




في جميع الفقرات من هذا الدرس f دالة عدديّة للمتغير الحقيقي x و (C_f) منحناها في (م . م . م) معلم متعمد منظم (j, i, O) .

I. الدالة المشتقّة الثانية وتطبيقاتها:

(A) الوضع النسبي للمنحنى (C_f) والمماس L في نقطة x_0

1. خاصية :

| | | | | | |
|-------------|-----------|----|----|---|-----------|
| x | $-\infty$ | -5 | -1 | 2 | $+\infty$ |
| $f''(x)$ | - | 0 | + | - | 0 |
| تقر (C_f) | و | و | و | و | و |



- f قابلة للاشتاقاق مرتين على مجال مفتوح I و x_0 من I .
- إذا كان $0 \leq f''(x_0) \geq 0$ فإن المنحنى (C_f) يوجد فوق المماس L (C_f) في النقطة التي أقصولها x_0 .
- إذا كان $0 \leq f''(x_0) \leq 0$ فإن المنحنى (C_f) يوجد تحت المماس L (C_f) في النقطة التي أقصولها x_0 .


2. مثال: لنعتبر الدالة: $f(x) = x^3$

1 أحسب: $f''(x)$ ثم أعط إشارتها.

2 أنشئ بعض المماسات على المجال $[0, +\infty]$ ثم على $[-\infty, 0]$.

(B) تقر منحنى (C_f) - نقطة انعطاف :

1. تعريف:



أداة قابلة للاشتاقاق على مجال I . (C_f) منحنى f في معلم منحنى f محدب (convexe) على I إذا كان (C_f) يوجد فوق جميع مماساته على I . ونرمز له بـ منحنى f مقعر (concave) على I إذا كان (C_f) يوجد تحت جميع مماساته على I . ونرمز له بـ (C_f) نقطة من M_0 (T). المماس L (C_f) في M_0 (x_0, y_0) أو النقطة x_0 هي نقطة انعطاف L (C_f) في M_0 يعني أن المماس (T) يخترق (أو يقطع) (C_f) في x_0 .

2. خاصية :

f دالة قابلة للاشتاقاق مرتين على مجال I .

إذا كان : $\forall x \in I / f''(x) \geq 0$ فإن (C_f) محدب (convexe) على I (أو أيضا (C_f) له تقر موجه نحو الأراتيب الموجبة).

إذا كان : $\forall x \in I / f''(x) \leq 0$ فإن (C_f) مقعر (concave) على I (أو أيضا (C_f) له تقر موجه نحو الأراتيب السالبة).

الدالة المشتقّة الثانية f'' تندم في x_0 من I وتغير إشارتها بجوار x_0 النقطة التي أقصولها x_0 هي نقطة انعطاف للمنحنى (C_f) أو للدالة f .

3. مثال: (أنظر ورقة الأنشطة المثال 2)

لنعتبر الدالة f حيث إشارة دالتها المشتقّة الثانية f''

هي بواسطة الجدول التالي:


أعط تقر (C_f) منحنى الدالة f



(C) نقط انعطاف:


1. تعريف:

. M_0 نقطة انعطاف لـ (C_f) يعني أن المماس (T) يخترق (أو يقطع) المنحنى f في معلم x_0 .

2. مثال: لنعتبر الدالة $f(x) = x^4 - 6x^2$
 $A(-5, -5)$ و $B\left(\frac{-1}{5}, \frac{1}{5}\right)$ نقطتي انعطاف لـ (C_f)

3. خاصية:

f دالة قابلة للاشتاقاق مرتين على مجال I . x_0 من I .
الدالة المشتقة الثانية " f'' تendum في x_0 من I وتتغير إشارتها بجوار x_0 النقطة التي أقصولها x_0 هي نقطة انعطاف للمنحنى (C_f) (أو للدالة f).




4. مثال 1:

1. هل الدالة f تقبل نقط انعطاف حددتها؟2. أنشئ نقط انعطاف (C_f) . إذا كان ممكناً.II. الفروع الlanهائية لمنحنى دالة f :

(A) فرع lanهائي :

1. تعريف:

منحنى دالة عدديّة f في معلم. إذا آلت إحدى إحداثياتي نقطة M من (C_f) إلى ما لا نهاية فإن (C_f) يقبل فرع lanهائي.

2. نشاط:

1) حدد الفروع lanهائية لـ (C_f) .

2) أعط تعريف لكل نوع من هذه الفروع lanهائية.




(B) مقارب أفقي - HORIZONTAL ASYMPTOTE

تعريف:

دالة عدديّة معرفة على $[a, +\infty)$ (أو $(-\infty, a]$).

إذا كان $b = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ (أو $c = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$) فإن المستقيم ذي المعادلة $y = b$ (أو $y = c$) مقارب أفقي ل (C_f) بجوار $+\infty$ (أو بجوار $-\infty$).

2. مثال: $f(x) = \frac{x-1}{x+1}$ لدينا $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 1$ إذن المستقيم ذي المعادلةمقابل أفقي ل (C_f) بجوار $+\infty$.

(C) مقارب عمودي - VERTICAL ASYMPTOTE

تعريف:

دالة عدديّة معرفة على $D \setminus \{x_0\}$ (أي f غير معرفة في x_0)

إذا كان $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \infty$ (أو $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \infty$) فإن المستقيم ذي المعادلة $x = x_0$ مقارب عمودي ل (C_f) عند x_0 على اليمين (أو على اليسار).

2. مثال: $f(x) = \frac{x-1}{x+1}$ لدينا $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = +\infty$ إذن المستقيم ذي المعادلة $x = -1$ مقارب عمودي ل (C_f) .

(D) مقارب مائل - OBLIQUE ASYMPTOTE

تعريف:

دالة عدديّة معرفة على $[a, +\infty)$ (أو $(-\infty, a]$). f منحنى دالة عدديّة في معلم. المستقيم ذي المعادلة $y = ax + b$ (أو $y = a'x + b'$) هو مقابل مائل ل (C_f) بجوار $+\infty$ (أو بجوار $-\infty$) يعني:

$$\left(\begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty \\ \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) - (ax + b) = 0 \end{array} \right) \text{ أو } \left(\begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) - (ax + b) = 0 \end{array} \right)$$

مثال: لنعتبر الدالة f المعرفة بـ $f(x) = x - 2 + \frac{1}{x-1}$

بين أن: $\lim_{|x| \rightarrow +\infty} f(x) - (x - 2) = \lim_{|x| \rightarrow +\infty} \frac{1}{x-1} = 0$. نحسب $\lim_{|x| \rightarrow +\infty} f(x) - (x - 2) = 0$.

المستقيم ذي المعادلة $y = x - 2$ يسمى مقابل مائل بجوار $+\infty$ ل (C_f) .







• ملاحظات:

- ❖ إذا كان $0 < f(x) - (ax + b) \leq C_f$ فإن $y = ax + b$ يكون فوق المقارب المائل الذي معدلته $f(x)$.
- ❖ إذا كان $0 > f(x) - (ax + b) \geq C_f$ فإن $y = ax + b$ يكون تحت المقارب المائل الذي معدلته $f(x)$.
- ❖ إذا كان $0 = f(x) - (ax + b) = C_f$ يقطع المقارب المائل الذي معدلته $y = ax + b$ فإن $f(x)$.

▪ تحديد a و b :▪ تحديد a و b مع الحالات الخاصة:

$$\text{لتحديد } a \text{ نحسب: } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = a$$

- إذا كان $a = 0$ نقول أن $f(x)$ يقبل فرع شلجمي في اتجاه محور الأفاصيل. (أنظر الرسم ١).
- إذا كان $a = \infty$ نقول أن $f(x)$ يقبل فرع شلجمي في اتجاه محور الأراتيب. (أنظر الرسم ٢)
- لتحديد b نحسب: $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) - ax = b$ (أي $a \in \mathbb{R}^*$ و $a \neq 0$). بشرط $(a \neq \infty \text{ و } a \neq 0)$.
- هذه الحالة نقول أن $f(x)$ يقبل فرع شلجمي في اتجاه المستقيم ذي المعادلة $y = ax$ بجوار ∞ . أو أيضاً: $b = \infty$
- اتجاه مقارب في اتجاه المستقيم ذي المعادلة $y = ax$ بجوار $-\infty$. (أنظر الرسم ٣)
- (حتى $b = 0$) في هذه الحالة نقول أن $f(x)$ يقبل مقارب مائل معادله $y = ax + b$. (أنظر الرسم ٤)



▪ ملحوظة:

إذا كان $c = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) - (ax + b)$ فإن $f(x)$ يقبل مقارب مائل الذي معادله $y = ax + b + c$ بجوار ∞ .

$$\text{مثال: } f(x) = x + 3 - \frac{(x+2)}{(x-1)}$$

$$\text{لدينا: } -1 = \lim_{|x| \rightarrow +\infty} f(x) - (x+3) = \lim_{|x| \rightarrow +\infty} -\frac{(x+2)}{(x-1)}$$



III. محور تماثل – مركز تماثل منحنى .

(A) مركز تماثل منحنى :

• خاصية:

f دالة عدديّة معرفة f . (C_f) منحنها على D_f في معلم $I(a,b)$ نقطة من المستوى (P) .

النقطة $I(a,b)$ هي مركز تماثل لـ (C_f) يكافيء : $\begin{cases} \forall x \in D_f ; 2a-x \in D_f \\ \forall x \in D_f ; f(2a-x)+f(x)=2b \end{cases}$

• مثل: $f(x) = \frac{2x-3}{x+1}$. بين أن النقطة $(-1;2)$ مركز تماثل لـ (C_f) منحنى الدالة f .

(B) محور تماثل لـ (C_f) :

• خاصية:

f دالة عدديّة معرفة f . (C_f) منحنها على D_f في معلم M . $D: x=a$ مستقيم من المستوى (P) .

المستقيم الذي معادلته $D: x=a$ هو محور تماثل لـ (C_f) يكافيء : $\begin{cases} \forall x \in D_f ; 2a-x \in D_f \\ \forall x \in D_f ; f(2a-x)=f(x) \end{cases}$

• مثل: $f(x) = (x-1)^2 + 1$ حدد محور تماثل (C_f) بين أن المستقيم الذي معادلته $x=1$: محور تماثل لـ (D) .

IV. مجموعة دراسة دالة عدديّة :

1. تعاريف:

f دالة عدديّة معرفة على I' حيث I و I' متماثلين بالنسبة لـ 0 مع I يحتوي على الأعداد السالبة.

إذا كانت f زوجية أو فردية يكفي دراسة على المجموعة $D_E = I \cap \mathbb{R}^+$ أو $D_E = I$.

أ- تغيرات f على I' هي نفس تغيرات f على I إذا كانت f فردية.

ب- تغيرات f على I' هي عكس تغيرات f على I إذا كانت f زوجية.

إذا كانت f دورية ودورها T يكفي دراسة على J مجال طوله T . $D_E = D_f \cap J$ مع $a \in \mathbb{R}$ $D_E = D_f \cap [a, a+T]$.

2. مثال:

: $f(x) = \sin(x)$ هي معرفة على \mathbb{R} ودورها 2π أي دراستها على مجال طوله $T = 2\pi$

..... $D_E = \mathbb{R} \cap [-\pi, \pi] = [-\pi, \pi]$ أو $D_E = \mathbb{R} \cap [0, 2\pi] = [0, 2\pi]$ أو $D_E = \mathbb{R} \cap [0, 2\pi] = [0, 2\pi]$

3. ملاحظة:

إذا كانت f دورية ودورها T و زوجية (أو فردية) على D_f يكفي دراستها على مجال طوله $\frac{T}{2}$ أي $D_E = D_f \cap \left[0, \frac{T}{2}\right]$ أو

$D_E = \mathbb{R} \cap \left[-\frac{T}{4}, \frac{T}{4}\right]$

4. مثال:

مثال 1 : $f(x) = \sin(x)$ هي معرفة ودورية و فردية على \mathbb{R} ودورها $T = 2\pi$. ندرس الدالة f على مجال طوله π .



الأستاذ: بنموسى محمد ثانوية: عمر بن عبد العزيز المستوى: ٢ علوم فيزياء + ع. ح. أ.

درس : دراسة دالة عدديّة و تمثيلها المباني

- خلاصة: مجموعة دراسة الدالة هي $D_E = \mathbb{R} \cap [0, \pi] = [0, \pi]$ أي $D_E = [0, \pi]$.
- مثال ٢ : $f(x) = \cos(x)$ هي معرفة على \mathbb{R} . دورية ودورها 2π و زوجية. ندرسها على مجال طوله π .
- خلاصة: مجموعة دراسة الدالة هي $D_E = \mathbb{R} \cap [0, \pi] = [0, \pi]$ أي $D_E = [0, \pi]$.

V. تصميم دراسة دالة عدديّة :

| | | | |
|----|---|---|---|
| ٨ | $D_f : f$ | مجموعة تعريف الدالة | ١ |
| ٩ | دراسة زوجية f أو دورية f (إذا كان ذلك ممكناً) | دراسة دالة عدديّة | ٢ |
| ١٠ | $D_f : f$ | استنتاج مجموعة دراسة f | ٣ |
| ١١ | D_E عند حدات D_f أو | نهايات f عند حدات D_f أو | ٤ |
| ١٢ | f | استنتاج الفروع اللاحنائية لـ f | ٥ |
| ١٣ | D_f من D_E (إذا كان ذلك ممكناً) | دراسة الوضع النسبي للمنحنى f و المقارب المائل | ٦ |
| ١٤ | D_E أو | حساب الدالة المشتقّة f' لـ f على D_f أو | ٧ |

VI. مثال:

نعتبر الدالة العدديّة f للمتغير الحقيقي x المعرفة بـ: $f(x) = \frac{x^2 - x + 1}{x - 1}$. ولتكن (C_f) منحنى f في معلم متعمد منظم (O, i, j) .

(١) حدد D_f مجموعة تعريف الدالة f .

(٢) أحسب النهايات عند حدات D_f .

(٣) حدد a ; b ; c من $\forall x \in D_f; f(x) = ax + b + \frac{c}{x-1}$: \mathbb{R} .

(٤) أدرس الفروع اللاحنائية للمنحنى (C_f) .

(٥) أدرس الوضعيّة النسبيّة للمنحنى (C_f) بالنسبة لمقاربته المائل.

(٦) أحسب $(f'(x))$ لكل x من D_E .

(٧) أدرس إشارة f' على D_f ثم أعط جدول تغيرات f .

(٨) أدرس تغير المنحنى (C_f) على D_f .

(٩) بين أن النقطة $(1, 1)$ مركز تماثل المنحنى (C_f) .