

### التمرين الأول

$$\begin{cases} f(x) = \frac{x^2 - x - 2}{x^2 - 1} & ; \quad x < -1 \\ f(x) = \frac{\sqrt{x+5}}{x+a} & ; \quad x \geq -1 \end{cases}$$

ليكن  $a$  عددا يخلف  $-1$ . نعتبر الدالة  $f$  المعرفة بما يلي :

(1) أحسب النهاية  $\lim_{\substack{x \rightarrow -1 \\ x < -1}} f(x)$

(2) حدد قيمة العدد  $a$  كي تكون الدالة  $f$  متصلة في النقطة  $-1$

(3) أحسب النهاية  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$  و بين أن  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$

### التمرين الثاني

لتكن  $f$  الدالة العددية المعرفة على  $\mathbb{R}^+$  بما يلي :  $x \neq 4$  ;  $f(x) = \frac{\sqrt{x-2}}{\sqrt[3]{2x-2}}$  و  $f(4) = \frac{3}{2}$

(1) بين أن الدالة  $f$  متصلة في النقطة  $4$

(2) بين أن  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

(3) أدرس بعناية اتصال الدالة  $f$  على  $\mathbb{R}^+$

### التمرين الثالث

أحسب و بسط مشتقة كل من الدالتين :  $U(x) = (x+1)\sqrt{x-2} + \sqrt{3}$  و  $V(x) = \frac{\sqrt{x+1}}{x+2}$

### التمرين الرابع

نعتبر الدالة  $f$  المعرفة بما يلي :  $f(x) = 2x - \sqrt{x+2}$

(1) حدد  $D_f$  مجموعة تعريف الدالة  $f$  ثم بين أن  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

(2) أدرس قابلية اشتقاق الدالة  $f$  على يمين النقطة  $-2$

(3) بين أن الدالة  $f$  قابلة للاشتقاق على  $D_f - \{-2\}$  ثم أن

$$(\forall x \in D_f - \{-2\}) \quad f'(x) = \frac{16x + 31}{2(4\sqrt{x+2} + 1)\sqrt{x+2}}$$

(4) لتكن  $g$  الدالة المعرفة على المجال  $[-1, 2]$  بما يلي :  $g(x) = f(x)$

(أ) بين أن  $g$  تقبل دالة عكسية  $g^{-1}$  معرفة على مجال  $I$  يتم تحديده

(ب) بين أن الدالة  $g^{-1}$  قابلة للاشتقاق في النقطة  $b = -3$  محدد العدد المشتق  $(g^{-1})'(-3)$