

## 2 ب ع ت فرض مراقب رقم 2 ذ: الرشيد

$$\arctan \theta = \sqrt{b^2 - 4ac} \quad \sum_{i=1}^n X_i \quad \overrightarrow{AB} \cos^{-1} \theta \quad e^{i\theta} C_n^p \sqrt{a^2 + b^2} \quad \int_b^a f(x) dx \quad \sqrt{x}$$

الثلاثاء : 01 نوفمبر 2011

1

$$\begin{cases} f(x) = (x^2 - 1)^{\frac{3}{2}} & ; x \leq 1 \\ f(x) = x - 1 - \sqrt{x-1} & ; x > 1 \end{cases}$$

نعتبر الدالة  $f$  المعرفة على  $\mathbb{R}$  بمالي:

-1 احسب  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$  و  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

-2 ا بين أن الدالة  $f$  قابلية اشتقاق في العدد  $x_0 = 5$

بـ اعط معادلة المماس لمنحنى الدالة  $f$  في النقطة  $A(5; f(5))$

جـ أدرس قابلية اشتقاق الدالة  $f$  على يمين وعلى يسار العدد  $x_1 = 1$  ثم أعط تأويلا هندسيا لكل نتيجة.

دـ أعط إنشاء تقربيا لمنحنى الدالة بجوار النقطة  $(1; f(1))$

1,5

1 ن

1 ن

2 ن

1 ن

2

1 ن

احسب بسط مشتقة كل من الدالتين التاليتين :

$$f(x) = x \sqrt[4]{2x+1}$$

$$g(x) = \cos(x - 3\sqrt[3]{x})$$

1 ن

3

نعتبر الدالة  $f$  المعرفة بمالي:

-1 حدد  $D_f$  مجموعة تعريف الدالة

-2 أحسب النهايتين التاليتين :

$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$  و  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

-3 أدرس قابلية اشتقاق الدالة  $f$  على يسار العدد  $-2$  وعلى يمين العدد  $1$  ثم أعط تأويلا هندسيا للنتيجة المحصل عليها.

-4 ا بين أن  $f$  قابلة للاشتقاق على كل من المجالين  $[-\infty; -2]$  و  $[1; +\infty)$

$$f'(x) = \frac{\sqrt{x^2+x-2} - (2x-1)}{\sqrt{x^2+x-2}}$$

بـ بين أن :

جـ بين أن  $0 < f'(x) < 0$  و  $0 < f''(x) < 0$  (لكل  $x$  من  $[-\infty; +\infty)$ )

دـ أعط جدول تغيرات الدالة  $f$

5- لتكن  $g$  قصور الدالة  $f$  على المجال  $[1; +\infty)$

اـ بين أن المعادلة  $g(x) = 0$  تقبل حل وحيدا  $\alpha$  وأن  $1 < \alpha < 2$

بـ بين أن  $g$  تقبل دالة عكسية محددا مجموعه تعريفها.

جـ بين أن  $g^{-1}$  قابلة للاشتقاق في الصفر ثم أحسب بدلالة  $\alpha$  العدد  $(g^{-1}(0))'$

$$(g^{-1})'(0) = \frac{-\alpha}{3+2\alpha}$$

1 ن

0,5 ن

1 ن

1 ن