

الفرض المنزلي

.01

الجزء الأول:

لتعتبر الدالة العددية f المعرفة بـ $f(x) = 5\ln(x+3) - x$. (c_f) منحنى f في معلم متعامد ممنظم (O, \vec{i}, \vec{j}) .

.01 حدد D_f مجموعة تعريف الدالة f .

.02 أ تحقق أن لكل x من $]0; +\infty[$ أن : $f(x) = x \left(5 \frac{\ln x}{x} - 1 \right) + 5 \ln \left(1 + \frac{3}{x} \right)$. ب- أحسب : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -3^+} f(x)$.

...03


أ- أحسب $f'(x)$ لكل x من D_f .ب- أدرس إشارة $f'(x)$ ثم ضع جدول تغيرات للدالة f . ثم استنتج عدد حدود المعادلة $f(x) = 0$ / $x \in D_f$.ج- بين أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حل وحيد α على $]0; +\infty[$. أعطي تأطير ل α سعته 10^{-1} .د- بين أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حل وحيد β على $] -3; 2]$.هـ- استنتج إشارة $f(x)$ على D_f ..04 أنشئ (c_f) منحنى f في معلم متعامد ممنظم (O, \vec{i}, \vec{j}) .

الجزء الثاني:

لتعتبر الدالة العددية g المعرفة على $]0; +\infty[$ بما يلي : $g(x) = 5\ln(x+3)$.

لتعتبر المتتالية العددية (u_n) المعرفة بما يلي : $u_0 = 4$ و $u_{n+1} = 5\ln(u_n + 3)$ لكل n من \mathbb{N} .

الشكل المرفق (1) التالي يمثل (c_g) منحنى الدالة g في معلم متعامد ممنظم والمستقيم (Δ) الذي معادلته $y = x$: (Δ)

.01 ضع جدول لتغيرات الدالة g على $]0; +\infty[$..02 أنشئ على محور الأفاصل الحدود u_0 و u_1 و u_2 و u_3 مستعملا المستقيم (Δ) و المنحنى (c_g) و ذلك على الشكل المرفق (1)

موضحا طريقة الإنشاء و بدون حساب الحدود .

.03 ما هو التظنن الذي نحصل عليه ؟

الجزء الثالث:

.01 تحقق أن : $g(\alpha) = \alpha$..02 بين بالترجع أن : $0 \leq u_n \leq \alpha$ لكل n من \mathbb{N} ..03 بين أن المتتالية (u_n) تناقصية ..04 استنتج أن المتتالية (u_n) متقاربة و حدد نهايتها .

الشكل المرفق (1) ←