


## الرشيدي: فرض مراقب بـ 2

$$\arctan \theta \quad \sqrt{b^2 - 4ac} \quad \sum_{i=1}^n X_i \quad \overrightarrow{AB} \quad \cos^{-1} \theta \quad e^{i\theta} \quad C_n^p \quad \sqrt{a^2 + b^2} \quad \int_b^a f(x)dx \quad \sqrt{x}$$

الخميس: 12-05-2011



يحتوي صندوق على  
أربع كرات بيضاء مرقمة كالتالي:

2 - 2 - 1 - 0

وثلاث كرات سوداء مرقمة كالتالي :

2 - 1 - 1

وكرتين حمراوين مرقمتين كالتالي

1 - 0

### الجزء الأول

سحب عشوائيا وفي ان واحد ثلاثة كرات من الصندوق.

1- أحسب احتمال الأحداث التالية : A " سحب كرة من كل رقم "

B " سحب كرة بيضاء واحدة على الأقل "

C " سحب كرتين سوداويين وكرة بيضاء "

ن 3

2- أحسب احتمال الحدفين :  $A \cup C$  و  $A \cap C$

هل الحدثان A و C مستقلان؟

3- علما أنت سحبنا كرة من كل رقم ، ما هو احتمال سحب كرتين سوداويين وكرة بيضاء؟

4- نعيد هذه التجربة 6 مرات متتابعة.

ما هو احتمال الحصول على كرة من كل لون مرتين بالضبط؟

ن 2,5

ن 0,5

ن 1,5

ن 1

### الجزء الثاني

سحب من الصندوق الآن 3 كرات بالتتابع وبدون إحلال.

1- أحسب احتمال الحدث D " جداء أرقام الكرات المسحوبة منعدم "

2- ليكن  $X$  المتغير العشوائي الذي يساوي عدد الكرات البيضاء المسحوبة من الصندوق .

ت- حدد  $X(\Omega)$ .

ث- حدد قانون احتمال  $X$ .

3- علما أنه توجد كرتان بيضاوان فقط من بين الكرات المسحوبة ، ما هو احتمال أن يكون جداء أرقامها منعدم؟

ن 1

ن 0,5

ن 2,5

ن 1,5

### الجزء الثالث

نعتبر الآن نردا وجوهه مرقمة كالتالي : 3 - 2 - 2 - 2 - 2 - 3 :

نرمي هذا النرد مرة واحدة في الهواء .

إذا عين النرد الرقم 2 نسحب كرتين في آن واحد من الصندوق

وإذا عين النرد الرقم 3 نسحب ثلاثة كرات في آن واحد من الصندوق .

أحسب احتمال كل من الحدفين :

E " توجد كرة بيضاء فقط من بين الكرات المسحوبة "

F " سحب كرة سوداء و كرتين بيضاوين "

ن 1,5

ن 1,5

### الجزء الرابع :

نسحب الان من الصندوق الكرة تلو الأخرى و لا نتوقف حتى نحصل على كرتين بيضاوين .

أحسب احتمال الحدفين : G " نحصل على كرتين بيضاوين في السحبة الرابعة "

H " نحصل على كرتين بيضاوين في السحبة الثالثة على الأقل "

ن 1,5

ن 1,5