

التمرین الأول

نعتبر في الفضاء المنسوب إلى معلم متعمد منظم و مباشر $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ النقط :

$$C(1,1,-1) \text{ و } A(-1,1,1)$$

أـ احسب $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$ ثم استنتج أن ABC مثلث و احسب مساحته .

بـ تحقق أن معادلة ديكارتية للمستوى (ABC) هي : $x + y + z - 1 = 0$

2) حدد تمثيلا براميتريا للمستقيم (D) المار من النقطة $D\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$ والعمودي على (ABC)

3) لتكن Ω نقطة من المستقيم (D) و (S) فلكة مركزها Ω و شعاعها $A\Omega$

أـ بين أن المستوى (ABC) يقطع (S) وفق الدائرة التي مركزها D و شعاعها $\sqrt{\frac{8}{3}}$

بـ حدد معادلة ديكارتية للفلكة (S) علما أنها تمر من النقطة O

التمرین الثاني

المستوى العقدي منسوب إلى معلم متعمد منظم مباشر $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$ و z عدد عقدي يخالف 3 و 5 .

لتكن M و M' نقطتان من المستوى العقدي لحقهما على التوالي z و $z' = \frac{z-5}{z-3}$

1) احسب العدد العقدي z علما أن النقطتين M و M' منطبقتان

2) نضع $i = \sqrt{-1}$ ولتكن النقطة U صورتها . بين أن : $\frac{z'-u}{z'-u} = i \frac{z-u}{z-u}$ هو ممرافق u

3) نفترض في هذا السؤال أن z عدد حقيقي . بين أن : $\arg\left(\frac{z'-u}{z-u}\right) \equiv \frac{\pi}{4} [\pi]$

4) نأخذ : $z = 3 + \sqrt{2}$. بين أن M' هي صورة النقطة M بالدوران الذي مركزه U وقياس زاويته $\frac{5\pi}{4}$

التمرین الثالث

يحتوي كيس على 11 كرة . 6 كرات تحمل الرقم 1 و 4 كرات تحمل الرقم 0 و كرة واحدة تحمل الرقم -1 . جميع كرات الكيس لا يمكن التمييز بينها باللمس)
نسحب تانيا 3 كرات من الكيس ونعتبر الحدثين التاليين :

ـ A " الكرات الثلاث المسحوبة تحمل الرقم 0 "

ـ B " الكرات الثلاث المسحوبة تحمل أرقاما مختلفة مثنى مثنى "

1) أحسب احتمال A وبين أن احتمال B هو $p(B) = \frac{8}{55}$

2) ليكن X المتغير العشوائي الذي يساوي جداء الأعداد التي تحملها الكرات الثلاث المسحوبة

أـ بين ان القيم التي يأخذها X هي -1 ; 0 أو 1

بـ بين أن $p(x=0) = \frac{26}{33}$

جـ حدد قانون احتمال X ثم أحسب الأمل الرياضي $E(X)$

التمرین الرابع

لتکن f الدالة العددية المعرفة على $[0, +\infty]$ بما يلي :

$$f(x) = 2x - \frac{x^2}{4} + \left(\frac{x^2}{2} - x \right) \ln x ; \quad x > 0 \quad f(0) = 0$$

ولیکن (C) منحنى الدالة f في مستوى منسوب إلى معلم متعمد ممنظم $\left(O, \vec{i}, \vec{j} \right)$

1) أ. بين أن الدالة f متصلة على المجال $[0, +\infty]$

بـ احسب $f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$ ثم أول مبيانا النتيجة

2) أـ ادرس قابلية اشتتقاق الدالة f على يمين الصفر .

بـ بين أن الدالة f قابلة للاشتتقاق على المجال $[0, +\infty]$ وأن : $f'(x) = \frac{x-1}{x} \ln x$ $\forall x \in]0, +\infty[$; $f'(1) = 0$

جـ بين أن الدالة f تزايدية قطعا على المجال $[0, +\infty]$ وضع جدول تغيراتها .

3) بين أن الدالة f تقبل دالة عكسية g معرفة على $[0, +\infty]$

$$(4) \quad \text{أـ بين أن : } f'(x) = \frac{x-1}{x} + \ln x \quad \forall x \in]0, +\infty[$$

بـ أثبت أن $I \left(\frac{7}{4}, 1 \right)$ نقطة انعطاف للمنحنى (C)

جـ حدد معادلة ديكارتية للمستقيم (D) المماس للمنحنى (C) في النقطة I

دـ أنشئ (C) و (Γ) منحنى الدالة g

5) أثبت أن $x=0$ هو الحل الوحيد للمعادلة $f(x)=x$ في المجال $[0, 1]$

$$(6) \quad \text{نعتبر الدالة } F(x) = -\frac{5}{36}x^3 + \frac{5}{4}x^2 + \left(\frac{x^3}{6} - \frac{x^2}{2} \right) \ln x ; \quad F(0) = 0 \quad \text{و } 0 < x < 1$$

أـ بين أن F دالة أصلية للدالة f على المجال $[0, +\infty]$

بـ احسب مساحة الحيز المحصور بين المنحنى (C) ، محوري المعلم والمستقيم ذي المعادلة : $x=1$

$$(7) \quad \text{نعتبر المتتالية العددية } (u_n) \text{ المعرفة بما يلي : } u_0 = \frac{7}{4} \text{ و } u_n = g(u_{n-1}) \quad \forall n \in IN$$

أـ بين أن $u_n > 0$ $\forall n \in IN$

بـ بين أن المتتالية (u_n) تناقصية وأنها متقاربة .

جـ احسب : $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$

انتهى الموضوع

حظ سعيد