

تصحيح التمارين الأول

(1) لدينا : $\vec{u} = (1, 1, -1)$ متجهة منتظمة لل المستوى (P)

إذن معادلة ديكارتية لل المستوى (P) تكتب على شكل : $(1)x + (1)y + (-1)z + d = 0$
و بما أن $d = -3$ فإن $A(2, 1, 0) \in (P)$ أي : $x + y - z - 3 = 0$ هي معادلة لل المستوى (P)

طريقة 1:

بما أن (S) هي مجموعة النقط M من الفضاء التي تحقق العلاقة $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$

فإن $[AB]$ هي الفلكة التي أحد أقطارها

$$\left\{ \begin{array}{l} x_{\Omega} = \frac{(2) + (-4)}{2} = -1 \\ y_{\Omega} = \frac{1+1}{2} = 1 \quad \text{أي : } [AB] \text{ هو منتصف القطعة} \\ z_{\Omega} = \frac{0+0}{2} = 0 \end{array} \right.$$

و منه Ω مركز الفلكة (S) هو مركز $[AB]$

. أي $\Omega(-1, 1, 0)$ هي مركز الفلكة (S)

$$R = \frac{AB}{2} = \frac{\sqrt{(-4-2)^2 + (1-1)^2 + (0-0)^2}}{2} = \frac{\sqrt{36}}{2} = \frac{6}{2} = 3$$

و شعاعها R هو :

طريقة 2:

لتكن $M(x, y, z)$ نقطة من الفضاء

لدينا : $\overrightarrow{MB}(-4-x, 1-y, -z)$ و $\overrightarrow{MA}(2-x, 1-y, -z)$

$$\begin{aligned} M(x, y, z) \in (S) &\Leftrightarrow \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0 \\ &\Leftrightarrow (2-x)(-4-x) + (1-y)(1-y) + (-z)(-z) = 0 \\ &\Leftrightarrow x^2 + 2x + y^2 - 2y + 1 + z^2 = 8 \\ &\Leftrightarrow (x+1)^2 + (y-1)^2 + z^2 = 9 \\ &\Leftrightarrow (x-(-1))^2 + (y-(1))^2 + (z-(0))^2 = (3)^2 \end{aligned}$$

و منه (S) هي الفلكة التي مركزها النقطة $\Omega(-1, 1, 0)$ و شعاعها 3

$$d(\Omega, (P)) = \frac{|(-1) + (1) - (0) - 3|}{\sqrt{(1)^2 + (1)^2 + (-1)^2}} = \frac{3}{\sqrt{3}} = \sqrt{3} \quad (3)$$

بما أن $R < d(\Omega, (P))$ يقطع (S) وفق دائرة

بـ- H مركز الدائرة (C) هي المسقط العمودي للنقطة Ω على المستوى (P) أي هي نقطة تقاطع المستقيم (Δ) المار من Ω و العمودي على المستوى (P)

لدينا : $(\Delta) \perp (P)$ و $(\Delta) \perp (\Omega)$ متوجهة منظمية للمستوى (P) و

إذن $\Omega(-1,1,0) \in (\Delta)$ هي متوجهة موجهة للمستقيم (Δ) و لدينا

$$\begin{cases} x = (-1) + t(1) = -1 + t \\ y = (1) + t(1) = 1 + t \quad (t \in \mathbb{R}) \\ z = (0) + t(-1) = -t \end{cases}$$

إذن تمثيل باراميترى للمستقيم (Δ) هو :

$$\begin{cases} x = -1 + t \\ y = 1 + t \\ z = -t \\ x + y - z - 3 = 0 \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$

و بالتالى مثُلُّث إحداثيات H هو حل للنظامة :

$$\begin{cases} x = -1 + 1 = 0 \\ y = 1 + 1 = 2 \\ z = -1 \\ t = 1 \end{cases} \quad \text{أي :}$$

(4)

لدينا $\overrightarrow{OB}(-4,1,0)$ و $\overrightarrow{OH}(0,2,-1)$ ✓

$$\overrightarrow{OH} \wedge \overrightarrow{OB} = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} 0 & -4 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} 0 & -4 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} \vec{k} = \vec{i} + 4\vec{j} + 8\vec{k}$$

: OHB مساحة المثلث ✓

$$S_{(OHB)} = \frac{1}{2} \left\| \overrightarrow{OH} \wedge \overrightarrow{OB} \right\| = \frac{1}{2} \times \sqrt{(1)^2 + (4)^2 + (8)^2} = \frac{\sqrt{81}}{2} = \frac{9}{2}$$

تصحيح التمارين الثاني

I

(1)

$$\begin{aligned}
 |a| &= \sqrt{(2+\sqrt{2})^2 + (\sqrt{2})^2} \\
 &= \sqrt{4+4\sqrt{2}+2+2} \\
 &= \sqrt{8+4\sqrt{2}} \\
 &= \sqrt{4(2+\sqrt{2})} \\
 &= 2\sqrt{2+\sqrt{2}}
 \end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}
 a &= 2+\sqrt{2}+i\sqrt{2} \\
 a &= 2\left(1+\frac{\sqrt{2}}{2}\right) + 2i\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \\
 a &= 2\left(1+\cos\left(\frac{\pi}{4}\right)\right) + 2i\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)
 \end{aligned}$$

 $\theta \in \mathbb{R}$ - أـ لـيـكـنـ (3)

$$\begin{aligned}
 \cos^2(\theta) &= \left(\frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}\right)^2 \\
 &= \frac{e^{2i\theta} + 2e^{i\theta}e^{-i\theta} + e^{-2i\theta}}{4} \\
 &= \frac{1}{2}\left(\frac{e^{2i\theta} + 1 + e^{-2i\theta}}{2}\right) \\
 &= \frac{1}{2}\left(\frac{e^{2i\theta} + e^{-2i\theta}}{2} + 1\right) = \frac{1}{2}(\cos(2\theta) + 1) \\
 \text{و منه : } \mathbb{R} \quad 1 + \cos(2\theta) &= 2\cos^2(\theta)
 \end{aligned}$$

-بـ

$$\begin{aligned}
 a &= 2\left(1 + \cos\left(\frac{\pi}{4}\right)\right) + i \cdot 2 \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \\
 &= 2\left(1 + \cos\left(2 \cdot \frac{\pi}{8}\right)\right) + i \cdot 2 \sin\left(2 \cdot \frac{\pi}{8}\right) \\
 &= 2 \times 2 \cos^2\left(\frac{\pi}{8}\right) + i \cdot 2 \times 2 \cos\left(\frac{\pi}{8}\right) \sin\left(\frac{\pi}{8}\right) \\
 &= 4 \cos^2\left(\frac{\pi}{8}\right) + i \cdot 4 \cos\left(\frac{\pi}{8}\right) \sin\left(\frac{\pi}{8}\right)
 \end{aligned}$$

-2

✓ بما أن الشكل المثلثي للعدد a هو :

$$\begin{aligned}
 a &= 4 \cos\left(\frac{\pi}{8}\right) \cdot \left(\cos\left(\frac{\pi}{8}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{8}\right) \right) \\
 a &= |a| \cdot \left(\cos\left(\frac{\pi}{8}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{8}\right) \right) : \text{ لدينا} \quad \checkmark \\
 a &= 2\sqrt{2+\sqrt{2}} \cdot \left(\cos\left(\frac{\pi}{8}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{8}\right) \right) : \text{إذن}
 \end{aligned}$$

حسب علاقة موافق :

$$\begin{aligned}
 a^4 &= \left(2\sqrt{2+\sqrt{2}} \cdot \left(\cos\left(\frac{\pi}{8}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{8}\right) \right) \right)^4 = \left(2\sqrt{2+\sqrt{2}} \right)^4 \cdot \left(\cos\left(4 \cdot \frac{\pi}{8}\right) + i \sin\left(4 \cdot \frac{\pi}{8}\right) \right) \\
 a^4 &= \left(2\sqrt{2+\sqrt{2}} \right)^4 \cdot \left(\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) \right) : \text{إذن} \\
 a^4 &= \left(2\sqrt{2+\sqrt{2}} \right)^4 i : \text{و منه} \\
 (\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) &= 1 \quad \text{و} \quad \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0) \quad \text{لأن}
 \end{aligned}$$

.II

(1) لدينا $B(b)$ صورة $A(a)$ بالدوران R الذي ي مركزه $\Omega(\omega)$ و زاويته $\frac{\pi}{2}$

$$b - \omega = e^{i \frac{\pi}{2}} (a - \omega) : \text{إذن}$$

$$b - \sqrt{2} = i \cdot (2 + \sqrt{2} + i \sqrt{2} - \sqrt{2}) : \text{إذن}$$

$$b - \sqrt{2} = i \cdot (2 + i \sqrt{2}) : \text{إذن}$$

$$\begin{aligned}
 b - \sqrt{2} &= 2i - \sqrt{2} \\
 b &= 2i \\
 \text{إذن : } |z - 2i| &= 2 \quad \text{لنحدد مجموعة النقط ذات اللحق } z \text{ بحيث } 2 \\
 |z - 2i| = 2 &\Leftrightarrow |z - b| = 2 \\
 &\Leftrightarrow BM = 2 \quad \text{لدينا :}
 \end{aligned}$$

إذن مجموعة النقط M هي الدائرة التي مركزها B وشعاعها 2

تصحيح التمرين الثالث

I

" التجربة " سحب في آن واحد ثلاثة كرات من الصندوق U_1

ليكن Ω_1 كون إمكانيات هذه التجربة

$$\text{لدينا : } \text{card } \Omega_1 = C_7^3 = 35$$

الحدث : " الحصول على كرة حمراء واحدة وكرتين خضراءين " ✓

$$\text{لدينا : } \text{card } A = C_4^1 \times C_3^2 = 4 \times 3 = 12$$

$$\text{إذن : } p(A) = \frac{\text{card } A}{\text{card } \Omega_1} = \frac{12}{35}$$

الحدث : " الحصول على ثلاثة كرات من نفس اللون " ✓

$$\text{لدينا : } \text{card } B = C_4^3 + C_3^3 = 4 + 1 = 5$$

$$\text{إذن : } p(B) = \frac{\text{card } B}{\text{card } \Omega_1} = \frac{5}{35} = \frac{1}{7}$$

II

" التجربة " نسحب عشوائيا و في آن واحد كرتين من U_1 ثم نسحب عشوائيا كرة واحدة من U_2

ليكن Ω كون إمكانيات هذه التجربة

$$\text{لدينا : } \text{card } \Omega = C_7^2 \times 5 = 21 \times 5 = 105$$

الحدث : " الحصول على ثلاثة كرات حمراء " . ✓

$$\text{لدينا : } \text{card } C = C_4^2 \times 3 = 6 \times 3 = 18$$

$$\text{إذن : } p(C) = \frac{\text{card } C}{\text{card } \Omega} = \frac{18}{105} = \frac{6}{35}$$

تصحيح المسألة

(1 .I)

$$\begin{aligned}
 D_f &= \{x \in \mathbb{R} / x (1 - \ln x) \neq 0, x > 0\} \\
 D_f &= \{x \in \mathbb{R} / x \neq 0, (1 - \ln x) \neq 0, x > 0\} \\
 D_f &= \{x \in \mathbb{R} / x \neq 0, \ln x \neq 1, x > 0\} \\
 D_f &= \{x \in \mathbb{R} / x \neq e, x > 0\} \\
 &=]0, e[\cup]e, +\infty[
 \end{aligned}$$

-أ (2)

x	0	e	+∞
1 - ln x	+	0	-

$$\lim_{\substack{x \rightarrow e \\ x > e}} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow e \\ x > e}} \frac{1}{x (1 - \ln x)} = -\infty \quad \text{لدينا : } \checkmark$$

$$\begin{cases} \lim_{\substack{x \rightarrow e \\ x > e}} x = e \\ \lim_{\substack{x \rightarrow e \\ x > e}} 1 - \ln x = 0^- \end{cases} \quad \text{لأن : }$$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow e \\ x < e}} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow e \\ x < e}} \frac{1}{x (1 - \ln x)} = +\infty \quad \text{لدينا : } \checkmark$$

$$\begin{cases} \lim_{\substack{x \rightarrow e \\ x < e}} x = e \\ \lim_{\substack{x \rightarrow e \\ x < e}} 1 - \ln x = 0^+ \end{cases} \quad \text{لأن : }$$

التأويل الهندسي :

$$x = e \quad \text{يقبل مقارب عمودي معادله } C_f \quad \text{إذن :} \quad \begin{cases} \lim_{\substack{x \rightarrow e \\ x < e}} f(x) = +\infty \\ \lim_{\substack{x \rightarrow e \\ x > e}} f(x) = -\infty \end{cases} \quad \text{لدينا : }$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x (1 - \ln x)} = 0 \quad \text{لدينا :}$$

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} 1 - \ln x = -\infty \end{cases} \quad \text{لأن : }$$

بما أن : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ فإن C_f يقبل مقارب أفقى معادله $y = 0$ بجوار $+\infty$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x(1 - \ln x)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x - x \ln x} = +\infty \quad \text{لدينا :}$$

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0^+} x = 0^+ \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} -x \ln x = 0^+ \end{cases} \quad \text{لأن :}$$

التأويل الهندسي :

$$\text{بما أن : } \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty \quad \text{يقبل مقارب عمودي معادله } x = 0 \quad (3)$$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left(\frac{1}{x(1 - \ln x)} \right)' \\ f'(x) &= \frac{-(x(1 - \ln x))'}{(x(1 - \ln x))^2} \\ f'(x) &= \frac{-((x)'(1 - \ln x) + x(1 - \ln x)')}{x^2(1 - \ln x)^2} \end{aligned}$$

$$f'(x) = \frac{-(1 - \ln x - 1)}{x^2(1 - \ln x)^2}$$

$$f'(x) = \frac{\ln x}{x^2(1 - \ln x)^2}$$

$$D_f \quad \text{لذن : } f'(x) = \frac{\ln x}{x^2(1 - \ln x)^2}$$

ب- ليكن $x \in D_f$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \ln x = 0 \Leftrightarrow x = 1$$

لدينا : $0 < x^2(1 - \ln x)^2$ إذن إشارة $f'(x)$ هي إشاره

✓ على المجال $\ln x \leq 0 :]0, 1]$ إذن $f'(x) \leq 0$ و منه f تناقصية

✓ على المجالين $\ln x \geq 0 :]e, +\infty[$ و منه f تزايدية

ج- جدول تغيرات f :

x	0	1	e	$+\infty$
$f'(x)$		-0	+	+
$f(x)$	$+\infty$	1	$+\infty$	$-\infty$

1) أ- مبيانيا عدد حلول المعادلة (E) هو حلين لأن عدد نقط تقاطع (C_f) مع محور الأفاصيل هو نقطتين .

ب-

$$[2,2;2,3] \quad \checkmark$$

$$\begin{cases} g(2,2) = -0,02 \\ g(2,3) = 0,12 \end{cases} \Rightarrow g(2,2) \times g(2,3) < 0 \quad \checkmark$$

إذن حسب مبرهنة القيم الوسيطية : المعادلة (E) تقبل حل α بحيث :

أ- ليكن $x \in D_f$:

$$\begin{aligned} f(x) - x &= \frac{1}{x(1 - \ln x)} - x \\ &= \frac{1 - x^2(1 - \ln x)}{x(1 - \ln x)} \\ &= \frac{g(x)}{x(1 - \ln x)} \end{aligned}$$

$$\text{إذن : } D_f \text{ لـكل } x \text{ من } f(x) - x = \frac{g(x)}{x(1 - \ln x)}$$

ب-

$$\begin{aligned} f(x) = x &\Leftrightarrow f(x) - x = 0 \\ &\Leftrightarrow g(x) = 0 \\ &\Leftrightarrow x = 1 \text{ أو } x = \alpha \end{aligned}$$

إذن (Δ) يقطع (C_f) في نقطتين اللتين أقصولاهما 1 أو α

ج-

على المجال $[1, \alpha]$:


لدينا (C_g) يوجد تحت محور الأفاصيل إذن $0 \leq g(x) \leq 0$ لكل x من المجال

✓

x	1	α
$g(x)$	0	– 0
$x(1-\ln(x))$		+
$f(x)-x$	0	– 0

[1, α] لكل x من المجال $f(x) - x \leq 0$ إذن :

(3)



- أ (4)

$$\begin{aligned}
 \int_1^{\sqrt{e}} \frac{1}{x(1-\ln x)} dx &= \int_1^{\sqrt{e}} \frac{1}{\frac{x}{1-\ln x}} dx \\
 &= - \int_1^{\sqrt{e}} \frac{(1-\ln x)'}{1-\ln x} dx \\
 &= - \left[\ln |1-\ln(x)| \right]_1^{\sqrt{e}} \\
 &= - \left(\ln \left(\frac{1}{2} \right) - 0 \right) \\
 &= \ln 2
 \end{aligned}$$

-بـ

$$\begin{aligned}
 A &= \int_1^{\sqrt{e}} |f(x) - x| dx \times \|\vec{i}\| \times \|\vec{j}\| \\
 &= \int_1^{\sqrt{e}} (x - f(x)) dx \times 2cm \times 2cm \\
 &= \int_1^{\sqrt{e}} \frac{-g(x)}{x(1-\ln x)} dx \times 4cm^2 \\
 &= \int_1^{\sqrt{e}} \frac{x^2(1-\ln x) - 1}{x(1-\ln x)} dx \times 4cm^2 \\
 &= \int_1^{\sqrt{e}} \left(x - \frac{1}{x(1-\ln x)} dx \right) \times 4cm^2 \\
 &= \left(\int_1^{\sqrt{e}} x dx - \int_1^{\sqrt{e}} \frac{1}{x(1-\ln x)} dx \right) \times 4cm^2 \\
 &= \left(\left[\frac{x^2}{2} \right]_1^{\sqrt{e}} - \ln 2 \right) \times 4cm^2 \\
 &= \left(\frac{e-1}{2} - \ln 2 \right) \times 4cm^2 \\
 &= (2e - 2 - 4\ln 2) cm^2
 \end{aligned}$$

(1 .III
 : $n = 0$ من أجل ✓
 لدينا : $u_0 = 2$
 إذن $1 \leq u_0 \leq \alpha$

$n \in \mathbb{N}$ ✓ ليكن

• نفترض أن $u_n \leq \alpha$

• و نبين أن $u_{n+1} \leq \alpha$

لدينا حسب الإفتراض $\alpha \leq u_n$

و لدينا الدالة f تزايدية على المجال $[1, \alpha]$

إذن : $f(1) \leq f(u_n) \leq f(\alpha)$

و منه : $1 \leq u_{n+1} \leq \alpha$

✓ نستنتج أن $1 \leq u_n \leq \alpha$ لكل n من N

(2) حسب نتيجة السؤال (II) ج- لدينا : $f(x) - x \leq 0$ لكل x من $[1, \alpha]$

و بما أن $1 \leq u_n \leq \alpha$ لكل n من N

فإن : $f(u_n) - u_n \leq 0$ لكل n من N

إذن : $u_{n+1} - u_n \leq 0$ لكل n من N

و بالتالي المتالية (u_n) تنقصصية

(3)

✓ بما أن (u_n) تنقصصية و مصغرورة فإن (u_n) متقاربة

$$\begin{cases} u_0 = 2 \in [1, \alpha] \\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases} \quad \text{لدينا : } \checkmark$$

• الدالة f متصلة على المجال $[1, \alpha]$

• $f([1, \alpha]) = [f(1), f(\alpha)] = [1, \alpha]$

• (u_n) متقاربة

إذن نهاية المتالية (u_n) هي حل للمعادلة

لدينا : $f(x) = x \Leftrightarrow x = 1 \Rightarrow x = \alpha$

و بما أن (u_n) تنقصصية فإن $u_0 \leq u_n$ لكل n من N

إذن $2 \leq u_n$ لكل n من N

و منه $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n \leq 2$

و بالتالي $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$

づづく